
ANTHROPOLOGY
BOTANY
Library
of
FIELD MUSEUM
OF
NATURAL HISTORY
FOUNDED 1893
GEOLOGY
ZOOLOGY

Digitized by the Internet Archive
in 2011 with funding from
The Field Museum's Africa Council

http://www.archive.org/details/listeprovisoired00allu

Liste provisoire

des

Coléoptères

de la

région "malgache"

par MM.

Charles Alluaud (Paris)

René Oberthür (Rennes)



Madagascar
Nossi Bé
Ste Marie
= Nossi Boraha
II Comores
gde Comore
= Angazyia
Anjouan = Johanna.
Mohély
Mayotte
III Mascareignes
Réunion = Bourbon
Maurice
Rodriguez
IV Seychelles
Mahé

Les amirantes - l'île Plate, Coëtivi Aldabra, et les îles Cosmoledo
St Pierre, Providence et le groupe des Farquhar; Agalega; les îles Glorieuses
Tromelin et les Cargados Garajos.
les îles Juan Nova, Bassas da India et Europa (Canal de Mozambique)

Liste des coléopt. Hémipt. et Dipt. de Madagr.
annexe 4 du voyage du Dr A. Vinson à Madagr 1864. (900 espèces)
Deyrolle - Liste des coléopt. propres à l'île de la Réunion
annexe 11 des notes sur l'île de la Réunion par Maillard
Jaurmane coléopt. des Comores ann. soc. ent. bel. 1893.

2-4-63 Ant Junk Zool.

+ = coll. Oberthür

QL
593
.M2
A56

CICINDELIDAE

Manticorini

Eurymorpha Hope.

cyanipes Hope Col. Man. 1838, II, 160. — Madag.?

Cicindelini

Peridexia Chaudoir.

+ fulvipes Dej. Sp. V 1831, 264. —
W. Horn D.E.Z. 1893, 329. —

= mirabilis Cast. Et. Ent. I. 1835, 140. —
Brullé Arch. Mus. I. 1838, 119, t. 7, f. 1. —
Künck Hist. Mad. Col. t 24 f 14. —

+ hilaris Fairm. Le Nat. II, 1883, 364. —
Fairm. St. E.Z. 1884, 129. —
Fleutiaux Ann. Fr. 1894 Bull. CCLXXXI

ambanurensis Brancsik (Megalomma)
Jahr Brancsik 1893. 210. t. 11. f. 5.
nom. Be!

*

Sp. incertae sedis:

+ frontalis Brul. Arch. Mus. I, 1838, 124, t. 7 f. 10. —
Fairm. An. Fr. 1871, 30. —
Künck. Hist. mad. Col. t. 25 f. 10. —
W. Horn D.E.Z. 1893, 329. —

Grandidieri Künck. Hist. Mad. Col. t 25 f 7. —

1° Cicindela
2° Peridexia
3° Megalomma
4° Megacephala

macropus Chaud. Cat. Coll. 1865, 19. —

? ? ?

marginata Fairm. An. Fr. 1871, 33.
Künck. Hist. mad. Col. t. 25, f. 9. —
W. Horn D.E.Z. 1893, 331. —

230186

2-4-63 Ant. Junk

Zool.

Cicindela Linné

abbreviata Klug, Ins. Mad. 1832, 121, t. 1, f. 2.
Brullé, Arch. Mus. I 1838, 136, t. 9, f. 4.
Künck. Hist. Mad. Col. t. 24, f. 7.
(1) Brancsik Jahr. Brencsin 1893 t. 10 f. 8a.
aberrans Fairm. An. Fr. 1871, 29.
= occulta Bates
Künck. Hist. Mad. Col. t. 25, f. 3.
dongalensis Klug. Symb. phys. III 1829, 6, t. 21, f. 6. [Madag?
W. Horn, Mon. pal. Cic. 156, t. 6, f. 5.
= fimbriata Dej. Sp. V 1831, 240.
Chaud. R. M. Z. 1876, ...
Künck. Hist. Mad. Col. 1887 t. 24, f. 12.
=? ruficondylata Sturm Cat. 1843, 3.
Dumolini Dej. Sp. V, 1831, 233 — Sénégal, Madag.
Künck Hist. Mad. col. t. 24 f. 5.
equestris Dej. Sp. II, 1826, 416.
Dohrn St. E. Z. 1885, 383.
Künck. Hist. Mad. Col. t. 24, f. 10.
= soa Künck. l. c. f. 11. Hist. mad. col. t. 24.
madagascariensis Chaud. Bul. Mosc. 1843, IV, 693
Künck Hist. Mad. Col. t. 25, f. 2.
maheva Künck l. c. t. 24, f. 3–4.
oculata Chaud. Bul. Mosc. 1843, IV, 695.
= minuta Brul. Arch. Mus. I, 1838, 126, t. 8, f. 2. —
Künck. Hist. Mad. Col. 1887, t. 24, f. 1.
= occulta Bates Cist. Ent. II, 1878, 322.
= breviformis Dup. Dej. Cat. 3e éd, 1837, 6. —
owas Bates Cist. Ent. II 1878, 331. —
= hova Künck. Hist. Mad. Col., t. 25, f. 5.
perplexa Dej. Sp. I 1825, 96.
Künck. Hist. Mad. Col. t. 24, f. 9.
Pierroni Fairm. Le Nat. 1880, 236. Nossi-bé
id. An. Fr. 1880, 321.
quadraticollis Chaud. An. Fr. 1835, 436.
= madagascariensis Mann. Bul. Mosc. 1837, II, 14.
= circumducta Brul. Arch. Mus. I. 1838, 136
vor Künck. Hist. Mad. Col. t. 24, f. 8.

vor circumducta Brancsik (nec Brullé) Jahr. Brencsin. 1893. 210 t. 10 f. 8b Nossi Bé
+ vor. baliensis Brancsik l. c. 210. t. 10 f. 8c Nossi Bé

centropunctata Dej.

dispuncta Dej.

fallax Coq. ann. Soc. ent. Fr. 1852. p. 359 tab. 9. fig 1.

luteo guttata Brancs.

melancholica

obscura D.?
= funesta

Radama Künck Hist. Mad. Col. 1887. t. 25, f. 6.
semipicta Fairm. An. Fr. 1871, 30.
Künck l. c. t. 25, f. 2.
tenuelineata W. Horn. Mon. pal. Cic. 1891, 80.
trilunaris Kl. Ins. Mad. 1832, 120, t. 1, f. 1.
Brullé Arch. Mus. I, 1838, 132, t. 8, f. 9.
Künck. Hist. Mad. Col. t. 24, f. 6.

Camatara Mayotte.

Physodeutera Lacord.

+adonis Cast. Et. Ent. I. 1835, 140.
Brullé Arch. Mus. I 1838, 120, t. 7, f. 6.
Künckel Hist. Mad. Col. t. 24, f. 13
=linearis Chaud. Bul. Mosc. 1843, IV, 684.
-. (V) rufosignata Br. Arch. Mus. I, 1838, 121, t. 7, f. 7.

rufosignata est une espèce très distincte.

bellula Fleut. [Megalomma] C. R. Belg. 1886, 86.
cyanea Br. [Cicindela] Arch. Mus. I, 1838, 122, t. 7, f. 8.—
Künck. Hist. Mad. Col. t. 24, f. 2.

ambanurense Branc

= rapida Gem. Har. Cat. I, 1868, 25.
uniguttata Fairm. [Megalomma] An. Fr. 1871, 31.
viridicyanea Br. [Cicindela] Arch. Mus. I. 1838, 119, t. 7, f. 5.
Künck. Hist. Mad. Col. t. 25, f. 1.—

marginatum Fairm 1871. Ann ou cur Fr. 1871. p. 33.

Megalomma, Westw.

affinis W. Horn, D. E. Z. 1892, 74.
cupreola Westw. A. M. N. H. ( ) 1841, 203. I. Maurice
fulgens W. Horn. D. E. Z. 1892, 73. Réunion
minima W. Horn. l. c. 1893, 197.
obscura F. Ent. Syst. supp. 1798, 62. Maurice
= funesta F. Syst. El. I 1801, 243.
Dej. Sp. I. 1825, 148.

rugicollis Fairm [Peridexia] An. Fr. 1871, 32.
Künck. Hist. Mad. Col. t. ~~24~~ 25, f 8.
Schaumi W. Horn D.E.Z. 1892, 73.
viridula Guens. Schönh. Syn. Ins. I. 1806, 243. [Maurice
Dej. Sp. I. 1825
= vigilans Westw. A.M.N.H ( ) 8, 1841, 204

25

Euryoda Lacord.

madagascariensis W. Horn, D.E.Z. 1892, 71 [Nossi-bé

= luteoguttata Brancsik Jahr. Trencsén. 1893. 209 Horn in.

Ctenostomini

Pogonostoma Klug.

affine W. Horn D.E.Z. 1893. 14
anthracinum Cast. Gor. Icon. I 1837, 9, t 3 f 9. -
Künck. Hist. Mad. Col. t. 23, f. 4.
bidentatum W. Horn, D.E.Z. 1892, 65.
bispinosum W. Horn l. c.
caeruleum Cast. Gor. Icon. I. 1837, 2, t. 2, f. 1.
Chaud. Bul. Mosc. 1860, IV, 271.
Künck. Hist. Mad. Col. t. 23, f 11.
W. Horn D.E.Z. 1893. 13
= gratiosum Künck. l. c. t. 23, f. 10.
chalybeum Klug. Wiegm. Arch. 1835 t. 6, f. 1.
Chaud. Bul. Mosc. 1860, IV, 271.
Künck. l. c. t. 23, f. 5.
W. Horn D.E.Z. 1893, 13.
(v) atrum Cast. Gor. Icon. I. 1837, 4, t. 2, f. 3.
(v.) Goudoti Cast. Gor. l. c. 5, t. 2, f. 4.
Chaud. Bul. Mosc. 1860, IV, 271.

(V) pubescens Cast. Gor. Ic. I. 1837, 6, t.2, f.5.
Chaud. Bul. Mosc. 1860, IV, 271
Künck. Hist. Mad. Col. t.23, f.3.
= rugosum Sup. Dej. Cat 3e éd. 1837, 6.

cyanescens Klug. Wiegm. Arch. 1835, 383.
Chaud. Bul. Mosc. 1860, IV, 271
Künck. Hist. Mad. Col. t. 23 f.12.
W. Horn D.E.Z. 1893. 13

(V) viride Cast. Gor. Icon. I 1837, 3, t2 f.2.
Chaud. Bul. Mosc. 1860. IV, 271.
Künck l.c. t.23, f.1.

elegans Br. Hist. Nat. Col. I 1834, 110, t3, f.3.
Br. Arch. Mus. I. 1838, 142, t.9, f10.
Cast. Gor. Ic. I. 1837, 7, t.3, f.7.
Chaud. Bul. Mosc. 1860, IV, 273.
Künck. l.c. t.23 f.6
= cœrulescens Kl. Wiegm. Arch. 1835, p. ....
= Brullei Cast. Gor. Icon. I. 1837. 7. t3, f8.
= cyaneum Sup. Dej Cat 3e éd. 1837, 6.

Klugi W. Horn D.E.Z. 1893, 14.

Kraatzi W. Horn l.c. 1894, 221. Nossi-bé

nigricans Klug. Wiegm. Arch. 1835, 383.
= brunnipes Cast. Gor. Icon I 1837, 9 t3, f11
Künck. Hist. Mad. Col. t.23 f.2.

ovicolle W. Horn D.E.Z. 1893. 15
id. l.c. 1894, 238 = anthracinum var.

pusillum Cast. Gor. Icon. I. 1837, 10, t.3 f.11.
Künck. l.c. t.23, f.8.

Schaumi W. Horn, D.E.Z. 1893, 16
id. l.c. 1894, 238.

Sikorai W. Horn l.c. 1894, 239.

Sericeum (voir au dos)

Sericeum Klug. Wiegm. Arch. 1835, 383.
Chaud. Bull. Mosc 1848, I, 21
id. l.c. 1860, IV, 273.
Kunck. Hist. Mad. Col. t. 23, f. 9.

Sikorai (v. supra)

Spinipenne Cast. Gor. Icon I. 1837, 6, t. 3, f. 6.
Chaud. Bul. Mosc. 1860, 272.
Künck. l.c. t. 23, f. 7.
W. Horn D.E.Z. 1893. 13.

Srnkai Brancsik l.c. 1893. f. 10.
W. Horn l.c. 1893, 15.

CARABIDAE

~~Carabini~~.

Calosoma ~~Weber 1801~~

Grandidieri Künck. H~~ist~~. M~~ad~~. t. 25, f. 19.

~~Omophronini~~.

Omophron ~~Latreille 1802~~

madagascariensis Chaud. B. M. 1850, ~~II~~, 425. ~~[illegible]~~

— Künck. l. c. t. 26, f. 1.

Scaritini.

Dyscherus Chaudoir 1855.

Chaudoiri Har. St. E. Z. 1879, 329.

costatus Klug. Ins. Mad. 1833, 126 t 1 f 6.

Chaud. Mon. Scarit. 1880, 54.

— Künck. l. c. t. 29, f. 1.

multicostatus Fairm. Le Nat. (2) I, 1887, 56 f 3.

zapax Fairm. Le Nat. II 1883, 364.

Fairm. St. E. Z. 1884, 129 et 274.

Künck. l. c. t. 29, f. 11.

zugulicollis Fairm. Le Nat (2) I, 1887, 70, f. 1.

tricostis Fairm. An. Fr. 1869, ~~180~~ 180 ~~180~~

— Chaud. Mon. Scarit. 1880, 56.

— Künck. l. c. t. 29. f 2

Storthodontus Chaudoir 1855

Aegon Chaud. R. M. Z. 1862, 487.

— Chaud. Mon. Scarit. 1880, 59.

Acteon Chaud. B. M. 1855, I, 27.

Chaud. Mon. Scarit. 1880, 62.

Coquereli Fairm. An. Fr. 1868, 754. (Nossi-bé

(Aepidopterus)

— Chaud. Mon. Scarit. 1880, 58.

— Künck. l. c. t. 29 f 6

depressus Künck. Hist. Mad. t. 29, f. 4.

Nimrod Chaud. B.M. 1855, I, 24.
Chaud. Mon. Scarit. 1880, 61
— Künck. l.c. t. 29 f. 5.

Crepidopterus Chaudoir 1855.

— cribripennis Chaud. B.M. 1843, IV, 723.
— Chaud. Mon. Scarit. 1880, II, 9.
— Künck. l.c. t. 29, f. 7.

V. amputator Dupont in musaeo.
Dohrni Fairm. An. Fr. 1868, 754. = glyptus [illegible] erreur !!

Goudoti Guér. R.M.Z. 1832, cl. 9, t. 5
Chaud. Mon. Scarit. 1880, II, 6.
— Künck. l.c. t. 29, f. 8.
= cephalotes Klug. Ins. Mad. 1833, 126, t. 1, f. 5.

Pipitzi Fairm. St. E. Z. 1884, 274.
— Künck. l.c. t. 29, f. 3.

Raffrayi Fairm. An. Fr. 1884, 226. [illegible]
Künck. l.c. t. 28, f. 1.

venator Chaud. B.M. 1855, I. 29.
Chaud. Mon. Scarit. 1880, II, 8.

Coeniolobus Chaudoir 1855.

convexipennis Fairm. An. Fr. 1868, 755.

[illegible]

Scarites Fabricius 1801.

inaequalis Fairm. An. Belg. 1893, 526. (Comores.
Lantzi Coq. i.l. (An. Fr. 1866, 301) (Réunion.
madagascariensis Dej. Spec. V. 487.
* Coq. An. Fr. 1862. 104. t. 3, f. 2.
Künck. l.c. t. 29, f. 9.
= taciturnus Chaud. B.M. 1855. I. 94
= madagascariensis Klug. Ins. Mad. 1832, 127. 127
mordax Fairm. An. Fr. 1869, 181
Chaud. Mon. Scarit. 1880, II, 125.
Pluto (Künck.) Brancsik, Jahr. Trencsén. 1893, 214.
Künck. l.c. t 29 f 10.

Brachypelus Putzeys 1867.

obesus Putz. An. Belg. 1867, 31

Clivina Latreille 1810.

madagascariensis Putz. Mém. Liège. 1846, 591.

Ozaenini.

Sphaerostylus Chaudoir 1848.

ditomoides Brullé, Hist. nat. 1834, IV, 257 t. 8, f. 5.

Chaud. An. Belg. 1868, 46.

Fairm. An. Fr. 1868, 765

Künck. Hist. Mad. t. 27, f 13.

Goryi Cast. Et. Ent. I, 1834, 145.

Chaud. An. Belg. 1868, 46.

Fairm. An. Fr. 1868, 765.

Künck. l. c. t. 27, f. 14.

longipennis Chaud. B. M. 1854. I, 292.

Chaud. An. Belg. 1868, 48.

Fairm. An. Fr. 1868, 766.

punctatostriatus Chaud. An. Belg. 1868, 47.

Fairm. An. Fr. 1868, 765.

striatus Chaud. An. Belg. 1868, 47.

Fairm. An. Fr. 1868, 765.

Pachyteles Perty 1830.

estriatus Waterh. A. M. N. H. (4) XV. 1875, 403.

Morionini

Morio Latreille 1810.

gracilis Fairm. An. Fr. 1868, 767.

Chaud. B. M. 1880, II, 351 vérifié

= obtusus Chaud. R. M. Z. 1869, 123.

parallelus Klug. Ins. Mad. 1832, 128.
Chaud. B. M. 1880, II, 350.
Künck. Hist. Mad. t. 25, f. 18.

Hemiteles Brullé 1835.

interruptus Brullé, Hist. nat. V, 1835, 44.
Lacord. Gen. Atlas t 7 f 4.
Künck. l. c. t 25 f 16.

Drimostomini

Drimostoma Dejean 1831.

anthracinum Klug. Ins. Mad. 1832, 133 t 1 f 11
Fairm. An. Fr. 1868, 767.
Chaud. An. Belg. 1872, 12.
Künck. l. c. t. 28, f. 6.

Chaudoiri Fairm. An. Fr. 1868, 768.
Chaud. An. Belg. 1872, 11.

— distinctum Brancsik, Jahr. Trencsén 1893, 218 (Nossi-bé

ebeninum Klug. Ins. Mad. 1832, 131 t. 1, f. 10, a/.
Fairm. An. Fr. 1868, 768.
Chaud. An. Belg. 1872, 12.
Künck. l. c. t. 28, f 5.

Klugi Fairm. An. Fr. 1868, 769
Chaud. An. Belg. 1872, 11.
— Brancsik, Jahr. Trencsén. 1893 (Nossi-bé
218.

Bembidiini

celere Dej. Klug Ins Mad. 1833 p. 13 Spec. V p. 157

Bembidion Latreille 1804.

X alsium Coq. An. Fr. 1866, 312 (Réunion

ne paraît pas être un bembidium!

Tachys Schaum 1860.

X bibulus Coq. An. Fr. 1866, 313 (Réunion, St Marie
X drimostomoides Fairm. . . . . . (Mayotte, Zanz.
X tetradymus Fairm. An. Belg. 1893, 526 (id. id.

box 307

= [illegible]
[illegible]

Trechini.

Perileptus Schaum 1860.

humidus Coq. An. Fr. 1866, 312. (Réunion

Licinini.

Badister Clairville 1806.

iridescens Ferté An. Fr. 1851, 286.

Oodini.

Chryptocerus Chaudoir 1878.

nolitus Chaud. B. M. 1878, 76.
Chaud. An. Fr. 1882, 337.
Künck. Hist. Mad. t. 28, f. 9. t. 28

Oodes Borelli 1809.

deplanatus Chaud. An. Fr. 1882, 358 — type [illegible]
Künck. l. c. t 28 f 4.

madagascariensis Chaud. B. M. 1857, III, 33.
Chaud. An. Fr. 1882, 354 — [illegible] senegalensis C. R. obs.

Hoplolenus La Ferté 1851.

agaboides Fairm. An. Fr. 1868, 758.
Chaud. An. Fr. 1882, 554
Brancsik Jahr. Trencsén 1893. 216. Nossibé

anthracinus Brancsik, Jahr. Trencsén. 1893, 216, t. 10 f 15. (Nossi-bé.

atronitens Fairm. An. Fr. 1892 Bul CLXX

Melanodes Chaudoir 1882.

atratus Klug. Ins. Mad. 1833, 132.
Chaud. An. Fr. 1882, 548.
Kunckel [Melanodes] l. c. t 28 f 8. [illegible] = ?
Kunckel [Oodes] l. c. t 30 f 1.
= moerens Chaud. B. M. 1857 II, 37

Chlaeniini.

Chlaenius Borelli 1809.

attenuatus Klug. Ins. Mad. 1833, ~~[illegible]~~ 129
— Künck. l. c. t. 30, f 4.
— Brancsik Jahr. Trencsén 1893. 215. Nossibé
= madagascariensis Cast. Silb. Rev. 1833, I, 32.
Chaud. Mon. Chl. 1876, 109.
var. poricollis Fairm. An. Fr. 1868, 756.
Künck. l. c. t. 30, f 12.

l'attenuatus de [illegible] = [illegible]
alors la description de poricollis [illegible] = attenuatus Klug
[illegible]
~~[illegible]~~

X bisignatus Dej. Spec. II 1826, 303. (Maurice = solitaris Dupont in musæo.
Coq. An. Fr. 1866, 301 (Réunion, Mayotte, Séchelles. = taciturnus Gory in musæo.
Chaud. Mon. Chl. 1876, 53.
Brancsik Jahr Trencsén 1893 215 (nossibé
X Coquereli Fairm. An. Fr. 1868, 756. (Nossi-bé
Chaud. Mon. Chl. 1876, 282
elongatus Klug. Ins. Mad. 1833, 129.
Chaud. Mon. Chl. 1876, 127.
fimbriatus Klug. Ins. Mad. 1833, 129.
Chaud. Mon. Chl. 1876, 122.
- Brancsik Jahr Trencsén 1893 215 = nossibé
hova Künck. Hist. Mad. t. 30, f. 14.
indutus Klug. Ins. Mad. 1833, 130.
Chaud. Mon. Chl. 1876. 142
Künck. l. c. t. 30, f. 5.
= madagascariensis Dupont ann. Fr. 1851. 244.
lunatus Dej. Spec. II, 325. (Réunion Maurice par Madagascar
Coq. An. Fr. 1866, 301
Chaud. Mon. Chl. 1876, 64.
= arcuatus Klug. Ins. Mad. 1833, 130.
Perté ann. Fr. 1851 243
olivaceus Waterh. A. M. N. H (4) XVIII 1876, 105
Waterh. Phil. Tr. R. S. CLXVIII, 1879, 510,
t. 53, f. ... (Rodrigue
pubifer Chaud. Mon Chl. 1876, 59.
|| pubiger Chaud. B. M. 1856, II, 206
pubifer Künck. l. c. t. 30, f. 7.
= Goudoti Perté ann. Fr. 1851. 247
Radama Künck. l. c. t. 30, f. 8.
Ranavalo Künck. l. c. t. 30, f. 13.
rudicollis Fairm. An. Fr. 1892, Bul. CLXIX
subovatus Chaud. Mon. Chl. 1876, 119.
Künck. l. c. t. 30, f. 11.
owas Perté ann. Fr. 1851. 243 !!
unicolor Chaud. B. M. 1856, II, 195.
Chaud. Mon. Chl. 1876, 57.
Künck l. c. t. 28, f. 12, et t. 30, f. 9.
- Brancsik Jahr Trencsén 1893. 215. nossibé
atripennis Reiche in Musæo
ann. Fr. 1851. 247.

*

Espèces dont la provenance malgache est douteuse :

cribricollis Dej. Spec. V, 1831, 644. (Sénégal.
Künck. Hist. Mad. t. 30, f. 6.

lenticulatus Dej. Spec. V, 1831, 639 (Sénégal
= Goudoti Chaud. B. M. 1856, III, 228 (Madag. ? | d'accord
(cf. Chaud. Mon. Chl. 1876, 105).

lugens Chaud. Mon. Chl. 1876, 185 (Nil blanc, Angola.
Künck. l. c. t. 31 f. 11.

rufomarginatus Dej. Spec. V. 1831, 641. (Sénégal
Künck. l. c. t. 30, f. 10.

Espèces citées et non décrites par la Ferté (tableau du G. Chlaenius) An. Fr. 1851, p. 240 et suiv.

~~tripennis (Reiche) (Madag.~~
cincticollis Madagr ? Ferté Ann. Fr. 1851 244. = marginellus Dej Sénégal.
~~Goudoti~~ "
~~madagascariensis~~ "
~~… (Dupont)~~ "

Panagaeini

Eudema Castelnau 1840.

~~aestiva~~ aestivum Klug. Ins. Mad. 1833, 128 t. 1, f. 7.
— Künck. l. c. t. 30, f. 3.
Francik Jahr Neuchâtel 1893 . … . …

Michardi Fairm. Le Nat. I, 1880, 307.

nigrita Künck. l. c. t. 30, f. 2.

Pierroni Fairm. Le Nat. 1880, 236. Microcosmus Chaudoir 1878 (Nossi-bé
Fairm. An. Fr. 1880, 324.

Orthogonini

Microchila Brullé 1834.

picea Brullé Hist. Nat. IV, 1834, 337, t. 13, f. 3.
Lacord. Gen. atl. t. 11, f. 4.
Künck. l. c. t. 28, f. 21.
Francik Jahr Neuchâtel 1893 p. 218

Harpalini.

Cratognathus Dejean 1829.

fulvilabris Fairm. An. Fr. 1868, 772.

Hypolithus Dejean 1829.

aciculatus Dej. Spec. IV. 1829, 173
Cog. an. Fr. 1866, 302 (Ste Marie & Réunion)

holosericeus Dej. Spec. IV. 1829, 171 (Sénégal
Klug. Ins. Mad. 1833, 134.

meticulosus ~~Dej.~~ Cog. An. Fr. 1866, 302
(Réunion, Maurice, Mayotte, Ste Marie

Harpalus Latreille 1804.

brunnipes Dej. Spec. IV, 1829, 265.
Cog. An. Fr. 1866, 303. (Réunion

diffusus Klug. Ins. mad. 1833, ~~XXII~~ 134

Duponti Cog. An. Fr. 1866, 304 (Maurice & Ste Marie.

emarginatus Dej Spec. IV, 1829, 203 (Réunion
Cog. An. Fr. 1866, 304.

madagascariensis Dej. Sp. V, 1831, 841

micans Klug. Ins. Mad. 1833, 134.

nossibianus Brancsik, Jahr. Erencsén. 1893, 217 (Nossi-bé

rufus (Brüggem. an Künck.?) — guère que cela !
Künck. Hist. Mad. t 25 f 17.

sericinus (nov. nom) Gem. Har. Cat. I, 284
‖ sericeus Cog. An. Fr. 1866, 304
(Mauric, Mayotte, Ste Marie

Anisodactylus Dejean 1829.

atrofuscus Fairm. An. Fr. 1869. 183 (Mayotte

atroviridis Fairm. An. Fr. 1869, 182

basicollis Fairm. An. Fr. 1892, Bul CLI (Mayotte, Séchelles.

Bewsheri Waterh. a. m. n. H (5) III, 1879, 361.
Fairm. An. Belg. 1893, 526. (Anjouan.

Platymetopus Dejean

interpunctatus Dej. Spec. IV, 71 (Coromandel.
Klug. Ins. Mad. 1833, 133.
Coq. An. Fr. 1866,
Künck. Hist. Mad. col. t. 28 f. 2. (Diorycha)
= flavipes Chaud. i. l.
nossibianus Brancsik Jahr. Trencsén. 1893, 217. (Nossi-bé

Stenolophus Dejean 1829.

concinnus Dej. Spec. IV. 430. (Maurice
crenulatus Dej. Spec. IV, 432. (Incert. sedis.
Fairm. An. Fr. 1868, 772 (Mayotte, Nossibé, S.te Marie.
Dumainei Coq. An. Fr. 1866, 311. Reunion
dorsiger Fairm. An. Fr. 1868
humeralis Fairm. An. Fr. 1868, 773.
iridescens Klug. Ins. Mad. 1833. 133 / Fairm. An. Fr. 1868, 773 — Nest pas humeralis Dej.
Künck. Hist. Mad. t. 28, f. 22.
irinorufus Fairm. An. Fr. 1868, 773.
irinoviridis Fairm. An. Fr. 1868, 773.
terminalis Chaud. B. M. 1843, IV, 790.
Fairm. An. Fr. 1868, 774.
trivittis Fairm. An. Fr. 1868, 773.

Acupalpus Latreille 1829.

borbonicus Chaud. i. l.

Anoplogenius Chaudoir 1852

fuliginosus Chaud. i. l.
madagascariensis Chaud. i. l.
marginevittatus Chaud. i. l.
timoprosopus Chaud. i. l.

craratus Klug Ins. Mad 1833, 133

[illegible]

Pterostichini

Euleptus Lacordaire 1854.

geniculatus Klug. Ins. Mad. 1833, 131, t. 1, f. 8, a, b.
Künck Hist. Mad. t 28 f 13.

Colpodes Mac Leay 1825

× aereus Coq. An. Fr. 1866, 310. (Ste Marie
× arecarum Coq. An. Fr. 1866, 308. (Réunion
coptoderus Dej [Stenolophus] Spec. IV. 31.
(Maurice
× Fischeri Chaud. B. M. 1850 383
Chaud. An. Fr. 1859, 318
Coq. An. Fr. 1866, 306. (Réunion
madagascariensis Künck. l. c. t 28 f 3.
× salazianus Coq. An. Fr. 1866, 307. (Réunion
× sexpunctatus Dej [Spec. V. 727 + (nec Chaud).
Coq. An. Fr. 1866. 307.

Megalonychus Chaudoir 1843.

madagascariensis Chaud. B. M. 1843, III, 420

Eudromus Klug, 1835.

alternans Klug Wiegm. Arch. 1835, I. 384 (= striaticollis Brullé ?)
t. 6, f 2, c, d.
emarginatus Putz
Bates Ent. M. M. 1879, 185.
laevicolle Brullé Hist. nat. IV, 1834, 365
Bates Ent. M. M. 1879
Künck. l. c. t. 31, f. 7. [Homalosomus]
lucidipennis Bates Ent. M. M. 1879, 251.
minor Har. St. E. Z. 1879, 331.
× opacus Fairm An. Fr. 1892 Bul. CIX
= tricostatus Künck. l. c. t 21 f 10. f 8

striaticollis Brullé Hist. nat IV, 1834, 365
Bates, Ent. M. M. 1879
Künck. Hist. Mad. t. 31, f 8, 9. [Homalosoma]
trisulcatus Bates Ent. M. M. 1879, 184.

Eucamptognathus Chaudoir 1837.

abaciformis Fairm. Le Nat. 1883, 364
Fairm. St. E. Z. 1884, 130.
africanus Cast. Et. Ent. I. 1834, 153.
Chaud. B. M. 1874, 136.
(abax) Kunck. l. c. t. 31, f. 6.
Alluaudi Fairm. An. Belg. 1895, 10.
angustatus Chaud. B. M. 1843. IV, 775.
Boucardi Tschitscherine Hor. S. E. Ross. 1891, 151.
Chevrolati Chaud. B. M. 1837. VII, 28.
Künck. l. c. t. 31, f. 3.
= fulgidipennis Dej. Cat. 3e éd. 1836, 43.
= spectabilis Cast. Et. Ent. 1834, 153.
diversus Chaud. B. M. 1874, 137.
fulgidocinctus Pool, Not. Leyd. M. 1886 VIII, 229.
igneocinctus Fairm. An. Belg. 1895, 9.
|| fulgidocinctus Fairm. Le Nat (2) I 1887 70 f 2.
Lafertei Chevrol. R. M. Z. 1839, 111.
Künck. l. c. t. 31, f. 1.
purpurascens Künck. l. c. t. 31, f. 2.
tenuestriatus Fairm. An. Belg. 1895, 10.

spectabilis Kunck col Mad t. 31 f. 4
spectabilis var d° t. 31 f 5

Oodimorphus Fairm. 1869

Badeni Putz. St. E. Z. 1877. 154

X brevicornis Fairm. An. Fr. 1869, 182. — type chaud

X Chaudoiri Fairm. An. Fr. 1868, 757.

Freyi Brancsik Jahr. Trencsén. 1893, 216, t. 13 f 7 (Nossi-bé

X hoplosternus Fairm. An. Fr. 1869, 182. — type chaud.

Abacetus Dejean 1828.

= Distrigus Dejean 1828.

bipustulatus Brullé Hist. Nat. IV, 1834, 338

Chaud. B. M. 1869. I. 400

Künck. Hist. Mad. t. 28, f. 7. (Distrigus)

corvinus Klug. Ins. Mad. 1833, 131, t. 1, f. 9.

Chaud. B. M. 1869. I, 359.

Fairm. An. Fr. 1868, 769.

Künck. l. c. t. 28, f. 20.

fuscipes Klug. [Argutor] Ins. Mad. 1833, 133.

Chaud. B. M. 1869, I, 392.

X Goudoti Chaud. B. M. 1869, I, 380 (scrip. Gondati)

X viridipennis Fairm. An. Fr. 1868, 770.

Chaud. B. M. 1869. I, 377.

madagascariensis Dej. Spec. V. 1831, 741

Chaud. B. M. 1869. I. 382.

X percosioides Fairm. An. Fr. 1868, 769.

Chaud. B. M. 1869, I, 363. Mayotte

X rufoguttatus Fairm. Le Nat. I. 1880, 308.

Fairm. An. Fr. 1880, 324.

X viridulus Fairm. An. Fr. 1868, 771

Chaud. B. M. 1869, I, 382.

Perigonini

Perigona Castelnau 1834

atriceps Fairm. [Nestra] An. Fr. 1869, 184.
madagascariensis Laud mihi.

Masoreini

Somoplatus Dejean 1829.

Coquereli Fairm. [Perigona] An. Fr. 1868, 766.
pusillus Künck Hist. Mad. t 25, f 15.
suturellus Fairm. [Perigona] An. Fr. 1868, 766.

ne paraît pas être Somoplatus ?

Masoreus Dejean 1828.

castanescens Fairm. An. Belg. 1889, CR III.
Fairm. An. Belg. 1895, 8.
madagascariensis Chaud. B. M. 1850. I. 453.
Chaud. [Aephnidius] B. M. 1876, III, 15.
= æquinoctialis Ferté R. Z. 1853, 374 (Guinée
= anthracinus Schaum B. E. Z. 1863, 78 (Gabon

Lebiini

[sensu lato : Truncatipennae † (pars).]

Tetragonoderus Dejean 1829.

bilunatus Klug. Ins. mad. 1833, ~~47~~ 135.
Chaud. B. M. 1876, III, 36.
Fairm. An. Fr. 1891 Bul XLVI (scrip. bilunulatus) (Seychelles.
obscurus Chaud. B. M. 1876, III, 36.
pallidus ? Künck. l. c. t 25 f 11.

paraît bien être un Tetragonoderus !

sulcipennis Fairm. An. Belg 1889. CR. VI.
Fairm. An. Belg. 1895, 8 (Nossi-bé.
flavosignatus Dup. * (sec. Brancsik Jahr. Trencsén 1893, 213). (Nossi-bé

Lebia Latreille 1804

formosa Künck. l. c. t. 26, f. 17.
fusca Künck. l. c. t. 26, f. 16.
madagascariensis Chaud. B. M. 1850. I. 73.

Somotrichus Seidlitz 1887.

elevatus F. Syst. El. I, 1801, 204.

Chaud. B. M. 1854, I, 133.

= unifasciatus Dej. Spec. V. 389

Coq. An. Fr. 1866, 300.

= massiliensis Fairm. [Coptodera] An. Fr. 1849, 419.

Apristus Chaudoir 1846.

aequatorius Fairm. An. Fr. 1868, 761.

Dromius Bonelli 1809.

nigerrimus Künck. Hist. Mad. t. 26, f. 15.

Demetrias Bonelli 1809.

Klug. Ins. Mad. 1833. 123 t. 1, f. 4.

— dissimilis Künck. Hist. Mad. t. 26, f. 14.

Callida Dejean 1825.

affinis Chaud. B. M. 1837, III, 4. (Cap de Bonne Esp.

Brancsik Jahr. Erencsén 1893, 213 (Nossi-bé

= Coquereli Fairm

— fastuosa Klug. Ins. Mad. 1833. 122 t. 1, f. 3.

Künck. Hist. Mad. t. 26 t. 12

jucunda Künck. l. c. t 26 f 13.

paratecta coquereli Fairm.

Coptodera Dejean 1825.

madagascariensis Gory [Catascopus] An. Fr. 1833, 205.

Chaud. An. Belg. XII, 1869, 165.

Künck. l. c. t. 25, f. 13.

= depressa Chaud. [Catascopus] An. Fr. 1835, 441

= cyanipennis Klug [Beleopterus] Wiegm. arch. 1835. I. 384. t. 6, f. 3.

miltomera Künck. l. c. t. 25, f. 12 t. 28, f. 14.

pustulata Chaud [Belonognatha] B. M. 1843, 385.

Chaud. An. Belg. XII, 1869, 191

Künck. l. c. [Belonognatha] t. 27, f. 1.

Crossoglossa n. sp. C. Robr.

nycteis apud Kunckel

Mon cher collègue

J'avez décrit le genre Rhonotrenia (Scalaris gouy) Deutsch Ent. Zeit. 1880 p. 153. Je viens de recevoir cette soi-disant Scalaris gouy de Sierra Leone mais ça n'est pas du tout la notre pas plus que celle de Westwood dont par le type n'est scalaris gouy.

Le vrai Scalaris j'ai au seul du Sénégal coll. Bonvouleck

celle de Kraatz à l'Oostervoor ceci il procure a vous de Sierra Leone

Par Ekkagonodem salabi
Dueny
Lionychus pellucipennis Schaum
Fai

v. Pherof. Expéditeur Pacer = Kunck qu'était alors que expéditeur
Blanche_ pour ce qu'il en dit.

signatipennis Chaud. An. Belg. XII 1869, 193.
Künck. Hist. Mad. t. 27, f. 2. [Belonognatha]

Nycteis

brevicollis Cast. Et. Ent. 1834, 148
Brullé Hist. Nat. I, 1834, t. 1, f. 2.
— Künck. l.c. t 25 f 14
= signata Klug. [Beleopterus] Wiegm. Arch. I. 1835, 384
semipicea Fairm. Le Nat. (2) I, 1887, 56, f. 1.
Künck. l.c. t. 28, f. 19.

= communimacula Fairm.

Lobodontus Chaudoir 1842
fulvipes Fairm. An. Fr. 1868, 764.

Madecassa Fairmaire 1868.

madagascariensis Chaud. [Glyphodactyla] B. M. 1850. I. 373.
= madagascariensis Motsh. [Apotomus] B.M. 1864 III 195.
= Coquereli Fairm. An. Fr. 1868, 760.
Alluaud, Bul. Nat. Mus, 1895, ... f
mirabilis Alluaud Bul. Nat. Mus. 1895, ... f

nest pas = voir Physonemus Gory

Thyreopterus Dejean 1831

= Eurydera Castelnau
S.G. Thysanotus Chaudoir
anchomenoides Gory, Cast. Hist. Nat. I, 1837, 7, t 2 f 10.
Chaud. B.M. 1848, I, 123.
Chaud. An. Belg. XII, 1869, 122.
Künck. l.c. t 27 f 3.
S.G. Pristacrus Chaudoir, 1869.
laticollis Cast. Hist. Nat. I, 1837, 6, t 2, f. 9.
Künck. l.c. t. 27, f. 4.
S.G. Peripristus Chaudoir, 1869.
emoratus Klug, Ins. Mad. 1833, 125.
Künck. l.c. t. 28 f. 15.

Thyreopterus (seu Eurydera) i. sp.

acutispina Fairm. An. Fr. 1868, 763.

armatus Cast. R. M. Z. 1831 t. 36.

Gory, Cast. Hist. Nat. I. t 1 f 1.

Klug. Ins. Mad. 1833, 124.
Künck. Hist. Mad. t. 27 f. 11. et 12

= flavicornis Gory, An. Fr. 1833, 203.

= scapularis Dupont, Dej. Cat. 3e ed. 15

binotatus Klug, Ins. Mad. 1833, 125.

communimacula Fairm. An. Belg. 1889, CR. VII.

cuspidatus Klug. Wiegm. Arch. 1835. 125.

impressiusculus Fairm. Le Nat.

Künck. Hist. Mad. t 28 f 16.

inermis Cast. Et. Ent., 1834, 147.

Gory. Cast. Hist. Nat, I, 1837, 6, t 2 f 8.

Künck. l.c. t. 27 f 5.

integer Fairm. An. Fr. 1868, 763.

latipennis Klug, Wiegm. Arch. 1835, I, 387.

mormolycoides Coq. R. Z. 1851, 86.

Coq. An. Fr. 1852, 360, t. 9, f. 9 f. 2.

Oberthuri Fairm. An. Belg. 1889, CR. xc.

Fairm. An. Belg. 1895, 9.

obscuratus Fairm. Le Nat. I, 1880, 308.

Fairm. An. Fr. 1880, 323.

= fenestra Klug.

ocularis Fairm. An. Fr. 1868, 761.

rotundatus Fairm. An. Fr. 1892, Bul. CLXIX.

rufotinctus Fairm. An. Fr. 1868, 762.

semiopacus Fairm. An. Fr. 1868, 763.

spinosus Gory An. Fr. 1833, 202.

Gory. Cast. Hist. nat. I, t. 1, f. 4.
Künck. l.c. t 27 f 10.

= brevicollis Klug. Wiegm. Arch. 1835. I. 386.

sublaevis Cast. Et. Ent. 1835 — 146.

Gory. Cast. Hist. Nat. I, 3, t. 1, f. 2.

= ormatus Dupont (nec Cast.) Dej. Cat. 3e ed. 15.

Xcrispatifrons Fairm 1896.

Kunck. Hist Mad. col. t. 27 f. 9.

tetraspilotus Fairm. Le Nat (2) I 56, f. 2.
Künck Hist Mad t. 28 f. 17
unicolor Klug. Ins. Mad. 1833, 124
Gory, Cast. Hist. Nat. I, t. 2, f. 7.
Künck. Hist. Mad. t. 27, f. 8.
= ovalis Cast. Et. Ent. 1835 — 147.
Gory. Cast. Hist. Nat I, 1837, 5, t. 2, f. 6.

S.G. Lobocephalus Chaudoir 1848
striatus Guér. R. M. Z. ~~IX~~ 1832. cl. IX. t. 22.
Künck. l. c. t. 27, f. 7.
= frontalis Klug. Ins. Mad. 1833, ~~[illegible]~~ 123
= spinosus Klug (nec Gory) Wiegm. Arch 1835, I, 386.
= gigas Cast. Et. Ent. 1835 — 146
Gory. Cast. Hist. Nat. I. t. 1, f. 3.
= longipennis Cast. Et. Ent. 1835 — 147
Gory. Cast. Hist. Nat I t. 2, f. 5.
Künck. l. c. t. 27. f. 6.

S.G. Phloeoxena Chaudoir 1869.
subappendiculata Dej. Spec. V. 451 (Maurice.
Coq. An. Fr. 1866, 300.
Chaud. An. Belg. XII. 1869, 145.

Helluonini

Macrochilus Hope 1838.
ferruginipes Fairm. An. Fr. 1892, Bul. CLXVIII.

Dryptini

Galerita Fabricius 1801
radecassa Fairm. Le Nat. I. 1880, 236.
Fairm. An. Fr. 1880, 322.
Künck. l. c. t 28 f 18.
Brancsik Jahr. Trencsén. 1893, 211.

nec Gory ?; verfi

teste Kolbe.

le fig. diffère du striatus sûrement.

Eunostus Castelnau 1835

Latreillei Cast. Et. Ent. 1835, 142.
Gory Cast. Hist. Nat I t 1 f 1.—
Lacord. Gen. Atl. I t. 3, f. 6.
Künck. Hist. Mad. t. 26, f. 5.

Drypta Fabricius 1801.

cyanella Chaud. B. M. 1843, IV, 698.
Chaud. B. M. 1861, II, 548.
Iris Cast. Hist. nat. I, 1840, 34
— Künck. l. c. t. 26, f. 3.
— madecassa Künck. l. c. t 26 f 4.
Brancsik. Jahr. Trencsén. 1893. 311.
parumpunctata Chaud. B. M. 1861, II, 550.
Chaud. B. M. 1877, II, 263.

Stenidia Brullé 1835.

hovana Fairm. St. E. Z. 1884, 273.

Odacanthini.

Odacantha Fabricius 1801

X nossibiana Fairm. Le Nat, I, 1880, 236 (Nossi-bé
Fairm. An. Fr. 1880, 332, t 11 f 1
Künck. l. c. t 28 f 11 (scrip. nossibeana)

Casnonia Latreille 1822

cærulans Künck. l. c. t. 28, f 10.

Hexagonia

cephalotes Dej. Spec. V. 289. (India or.
Künck. l. c. t. 26, f. 2.

Zuphium
Zuphium [illegible] Pierre
= Gebardi
Robert [illegible]

Waterhousei R. Ann. Fr. 1881 Bull. LXXI
= iris Wateh. (nec Cast.) [illegible]
II. 1878. 363.

[illegible] avec la figure?

Brachynini

Pheropsophus Solier 1833.

×acutecostatus Fairm. An. Fr. 1898 Bul. CLXVIII.

angusticollis Brancsik, Jahr. Trencsén. 1893, ~~[illegible]~~ 212 t. 10, f. 6. (Nossi-bé

bipartitus Fairm. An. Fr. 1868, 759
Chaud. Mon. Brachyn. ~~[illegible]~~ 1876, 9.
Brancsik, l.c. 211.

flavicomus Fairm. An. Fr. 1868, 759 (Nossi-bé
Chaud. l.c. 17

fulviventris (Künck) Brancsik. l.c. 211.
Künck. Hist. Mad. t 28 f 23. = bipartitus Fairm (¹)

Goudoti Dej. Spec. V, 1831, 414
Klug. Ins. Mad. 1833, 122.
Chaud. l.c. 21.
— Fairm. An. Fr. 1868, 759.
Künck. l.c. t 26 f 9! ~~10~~ (f 10 = humeralis)

madagascariensis Dej. Spec. V. 1831, 414.
Klug. Ins. Mad. 1833, 121.
× Fairm. An. Fr. 1868, 759.
Künck. l.c. t 26 f 11. la tête est inexact! [illegible]

Omostigma Chaud. Mon. Brachyn. 1876, 29.
‖ humeralis Chaud. B. M. 1843, 710.
Künck. l.c. t 26 f 10 (nec Goudoti)!
Brancsik. l.c. 211.

= madagascariensis var. Fairm. An. Fr. 1868, 759.
= espèce distincte Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. 1869 p. 179.

subcordatus Chaud. Mon. Brachyn. 1876, 28!

— * —

abbreviatus Künck. l.c. t 26 f 6. ~~×~~ f. 7. var.

quadrimaculatus Künck. l.c. t. 26, f 8.

Brachynus Weber 1801

gracicollis Brancsik. Jahr. Trencsén. 1893, 212. (Nossi-bé

[illegible]ticollis Fairm. An. Fr. 1884, 225.

Crepidogaster Boheman 1848

[illegible]ngata Brancsik. l.c. 213 t 12 f 9 (Nossi-bé

---

i/

j'ai en vain cherché après Fairmaire ce qui pourrait être flavicomus.
voisin de ~~[illegible]~~ [illegible] que j'ai trouvé.

(¹) ~~[illegible]~~

M. Fairmaire reproduit des captions mais ne l'avait pas.

madagascariensis var humeralis Chaud
× Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. 1868 p. 759
= Goudoti Dej var, nom [illegible]

vérifier si les noms sont bons après Künckel.

humeralis ~~Chaud~~ — espèce distincte
Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. 1869. p. 179
[illegible] L

→× nom. nouv. à cause du Brachynus humeralis Ahr.
la raison n'étant pas valable, humeralis doit être conservé à ce Pheropsophus.

M. Fairm qui ne connaissait pas Goudoti avait considéré Goudoti var un subcordatus par sang. —

i/

× [illegible]collis Fairm n'est pas Brachinus mais [illegible]

PAUSSIDAE

Paussus Linné, 1775.

cervinus Kraatz, D.E.Z. 1892, 8.

dama H. Dohrn, St.E.Z. 1890, 2.

Wasm. Myrmekoph. Termit. Arthr. 1894, 116.

elaphus H. Dohrn, St.E.Z. 1890, 1.

Wasm. l.c. 116.

Grandidieri Poujade An. Fr. 1891, Bul. LII.

‖ Sikorai Poujade An. Fr. 1891, Bul. XXXVI

howa Dohrn, St.E.Z. 1881, 91

Wasm. l.c. 117.

Humblotii Raffr. Nouv. Arch. Mus. 2e Sér. IX. 1887. 21 t. 19, f. 24.

Wasm. l.c. 117

Milne-Edwardsi Raffr. l.c. 23 t. 19, f. 23.

Mucius Dohrn, St.E.Z. 1884, 45.

Wasm. l.c. 118.

opacus Kraatz D.E.Z. 1892, 377.

Pierroni Fairm. An. Fr. 1880, 327 t. 2 f. 2 (Nossi-bé

Pipitzi Dohrn St.E.Z. 1884, 44.

Reitteri Kraatz D.E.Z. 1894, 318.

Scyphus Raffr. l.c. 24

sikoranus Dohrn St.E.Z. 1890, 82.

Wasmanni Kraatz D.E.Z. 1894, 317.

Haliplini

Peltodytes Régimbart

uadratus Régimb.

Dytiscini

Hyphydrus Illiger 1802.

ircularis Régimb.

istinctus Aubé, Spec. Hydr. 1838, 461
Dej. Cat. 3.e éd. 66.
Fairm. An. Fr. 1869, 185.
Sharp, Tr. Dubl. Soc. (2) II, 2.e p. 1882, 378.
Kolbe Arch. f. Naturg. XLIX, 1883, 408.

pressus Klug, Ins. Madag. 1833, 137.
Aubé, l.c. 458.
Sharp, l.c. 380.
Kolbe, l.c. 409.

= obesus Dej. Cat. 3.e éd, 66.

= Coquereli Fairm. [Hydroporus] An. Fr. 1869, 186.
Kolbe, l.c. 425.

dagascariensis Wehncke St. E. Z. 1877, 150.
Sharp, l.c. 379.
Kolbe l.c. 408.

ripstus (F.?) Aubé l.c. 459. (Réunion.
Sharp, l.c. 377.
Kolbe, l.c. 424.

parandus Régimb.
pes Sharp, l.c. 377.
Kolbe l.c. 424.

Heterydrus Fairm. 1869

aboides Fairm. An. Fr. 1869, 186.
Sharp, l.c. 337. (?= senegalensis Aubé [Hyphydrus]).
Kolbe, l.c. 424.

Herophydrus. Sharp 1882.

assimilis Régimb.
biseriatus Régimb.
confusus Régimb.
heros Sharp, Tr. Dubl. Soc (2) II, 2:p, 1882, 392.
Kolbe Arch. f. naturg. XLIX, 1883, 409.
hyphoporoides Régimb.
obsoletus Régimb.
spadiceus Sharp, l.c. 393.
Kolbe l.c. 410.
v. lineolatus Kolbe l.c. 410.
verticalis Sharp, l.c. 393.
Kolbe l.c. 425.
vittatus Régimb. (Maurice.

Hydrovatus Motschulsky 1855.

Badeni Sharp l.c. 333.
Kolbe l.c. 423.
crassicornis Kolbe [Hydatonychus] l.c. 403
cruentatus Kolbe l.c. 404.
Duponti Régimb.
humilis Sharp, l.c. 327.
Kolbe l.c. 423.
nigricans Sharp l.c. 332.
Kolbe l.c. 404.
pictulus Sharp, l.c. 323.
Kolbe, l.c. 423.
=dilutus Kolbe, l.c. 403
=rotundatus Dupont i.l.
subpunctatus Kolbe l.c. 405.
testudinarius Régimb.
uniformis Faicm [Hyphydrus] An. Fr. 1869, 185.
Sharp, l.c 332.
Kolbe, l.c. 423.

Hydrocanthus Say 1825

constrictus Régimb.

funebris Fairm. An. Fr. 1869, 187.

Sharp, Tr. Dubl. Soc (2) II, 2 p. 1882, 281.

Kolbe Arch. f. Naturg. XLIX, 1883, 400.

v. gracilis Kolbe l.c. 400.

Synchortus Sharp 1882.

asperatus Fairm (♀) An. Fr. 1869, 188.

Kolbe l.c. 422.

= duplicatus Sharp, (♂) l.c. 264.

Kolbe l.c. 398.

rugosopunctatus Wehncke B.E.Z. 1876, 221

Sharp l.c. 265.

Kolbe l.c. 422.

Canthydrus Sharp 1882.

concolor Sharp l.c. 274.

Kolbe l.c. 399.

guttula Aubé [Hydrocanthus] Spec. Hydr. 1838, 410.

Dej. Cat. 3. ed. 64.

Fairm. An. Fr. 1869, 188.

Sharp l.c. 275.

Kolbe l.c. 399.

v. frontalis Kolbe l.c. 399.

v. macularis Kolbe l.c. 399.

bellatus Régimb.

Hydrocoptus † Motschulsky 1853 – Sharp 1882.

striatus Sharp, l.c. 262.

Kolbe, l.c. 397.

Anodochilus Babington 1841 = Yola Gozis 1866.

stipennis Fairm. [Hydroporus] An. Fr. 1869, 187.

Sharp l.c. 347 [D.]

Kolbe [Bidessus] l.c. 406.

Bidessus Sharp 1882.

Alluaudi Régimb.
capitatus Régimb.
flavoguttatus Régimb.
geminodes Régimb.
hygrotoides Régimb.
longistriga Régimb.
octoguttatus Régimb.
perexiguus Kolbe, Arch. f. Naturg. XLIX, 1883, 407.
plagiatus Kolbe, l.c. 407.
rivulorum Régimb.
strigicollis Fairm. & Lat 1880, 293.
Sharp, Tr. Dubl. Soc (2) II 2.p. 1882,
Kolbe, l.c. 424.

Laccophilus Leach 1817.

addendus Sharp l.c. 316.
Kolbe l.c. 423.
v. geminatus Régimb.
complicatus Sharp, l.c.
Kolbe l.c. 402.
irroratus Aubé, Spéc. Hydr. 1838, 427. (Maurice & Réunion.
Dej. Cat. 3.e ed. 63.
Sharp l.c. 309.
Kolbe l.c. 426
lateralis Sharp, l.c. 307.
Kolbe, l.c. 401.
lineatus Aubé, l.c. 426. (Maurice
Kolbe, l.c. 426.
luctuosus Sharp, l.c. 307.
Kolbe, l.c. 422.
parvulus Aubé, l.c. 429. (Bombay.
Sharp, l.c. 312 (Sumatra.
Régimb. (Madag.

hosticus Aubé Spec. Hydr. 1838, 428 (Maurice
Esch. Syj Cat. 3ed. 63.
Sharp, Tr. Dubl. Soc (2) II, 2.pt, 1882, 309.
Kolbe Arch. f. Naturg. XLIX, 1883, 423.
rivulosus Klug, Ins. Mad. 1833, 48.
Aubé l.c. 425.
Fairm. An. Fr. 1869, 188.
Kolbe l.c. 401.

Neptosternus Sharp 1882.

oblongus Régimb.
rnatus Sharp. l.c. 317
Kolbe l.c. 423.

Rhantus Lacordaire 1835.

latus Fairm. An. Fr. 1869, 191
Kolbe l.c. 412.
= Goudoti Sharp l.c. 623.
ulverosus Steph. Ill. Brit. II, 69, t12 f2.
Sturm. Ins. VIII, 78, t194.
Knoch. Syj. Cat. 3.ed. 62
Sharp. l.c. 609. (Australie, Chine, Egypte, Europe. Régimb. (Madag.
australis Aubé l.c. 236.
conspersus Gyll. Ins. Suec. I, 482
Aubé l.c. 237.
rufimanus White Voy Ereb. Terr. Ent. 6.
notatus Lacord. Fn. Ent. Par. I, 311. (France
ocialis C. Waterh. a.m.n.H. (4) XVIII, 1876,
id. Phil. Trans. R. Soc. CLXVIII, 1879, (Rodrigue.
Sharp [Colymbetes] l.c. 765
Kolbe l.c. 427.
tenonychus Régimb.

Rhantaticus Sharp 1882.

ignatipennis Cast. [Hydaticus] Et. Ent. 95.
Aubé, l.c. 158
Sharp, l.c. 691. (Australie, Chine, Arabie, Madag. Senegal.
Künck Hist. Mad. t.34, f.9.
= pictus Bug. Syj. Cat. 3.ed. 61
= congestus Klug. Ins. Mad. 1833, 136.
Kolbe l.c. 416.

Copelatus Erichson 1832.

duodecimstriatus Aubé, Spec. Hydr. 1838, 378.
Dej. Cat. 3e ed. 63.
Sharp Tr. Dubl. Soc. (2) II 2e p. 1882, 573 (Maurice
Kolbe arch. f. Naturg. XLIX 1883, 411.

elongatus Kolbe l.c. 411.

Guerini Aubé l.c. 387.
Sharp, l.c. 572.
Kolbe, l.c. 427.

= octostriatus Dej. Cat. 3e ed. 63.

ilybioides Régimb.

owas Régimb.

polystrigus Sharp, l.c. 586. (Madag. Senegal.
Kolbe l.c. 412.

pulchellus Klug. Symb. Phys. IV, 1834, t 33 f 7.
C. Waterh. A. m. n. H. (4) XVIII. 1876. (Rodrigue
id. Phil. Tr. R. Soc. CLXVIII, 1879 (Mascar. Senegal
Sharp l.c. 583. (Réunion.
Kolbe l.c. 427.

ruficapillus Régimb.

vigintistriatus Fairm. An. Fr. 1869, 188. (Mayotte
Sharp l.c. 586. (Madag.
Kolbe l.c. 412 et 425.

Hydaticus Seach 1817.

bivittatus Lap.-Cast Et. Ent. 98.
Aubé l.c. 207.
Fairm. An Fr. 1869. 191.
Sharp l.c. 668. (Madag. Maurice, Seneg. Caffr.
Kolbe l.c. 414.

dorsiger Aubé l.c. 193.
Fairm. l.c. 190
Sharp l.c. 660
Kolbe l.c. 413

exclamationis Aubé l.c. 206.
Fairm. l.c. 191.
Sharp l.c. 671
Kolbe l.c. 415
Klünck Hist. Mad. t 34 f 11.

inconspicuus Régimb.

intermedius Régimb.

Leander Rossi Faun. Etr. I, 202.
Oliv. Ent. III, 40, p. 22, t 3 f 25.
Aubé Spec. Hydr. 1838, 198.
Sharp. Tr. Dubl. Soc. (2) II, 2.p, 1882, 662.
Kolbe Arch. f. naturg. XLIX, 1883, 425.
Kunck. Hist. Mad. t 34 f 10.

rufulus Aubé l.c. 199.
Fairm. An. Fr. 1869, 190.
Kolbe l.c. 426.

confusus Bohem. Res. Eugen. 1858, 21.
distinctus Dej Cat. 3.ed. 61.
Fabricii Macleay An. Jav. 1833, 134
varius F. Syst. El. I, 267.
marginalis Dahl. Dej. Cat. 3.ed. 61

V. concolor Kolbe l.c. 414 [? nec concolor Sharp l.c. 661. Cochinchina].

madagascariensis Aubé l.c. 210.
Fairm. An. Fr. 1869, 191
Kolbe l.c. 427
Künck l.c. t 34 f 12.

natruelis Clark Tr. Ent. Soc. 1864, 216 (afr. occid.

V. obliquevittatus Régimb. (Madag.

nigrotaeniatus Régimb.

rnatus Kolbe l.c. 415

etiti Aubé l.c. 204.
Fairm. l.c. 190.
Sharp l.c. 672. (Madag., Abyss., afr. austr.
Kolbe l.c. 416.
Künck l.c. t 34 f 13.

lagiatus Régimb.

brinus Aubé l.c. 156.
Fairm. l.c. 190.
Sharp l.c. 666. (Madag, Maurice, S. Amér.
Kolbe l.c. 413.

Graphoderes Eschscholtz

bertheri Régimb.

Erekes Laporte de Castelnau = Eunectes Erichson

ticticus F. Syst. Nat. I, 2, p 666.
Duval Gen. 1857, t 28 f 186.

griseus F. Syst. El. I, 263.
Aubé, Icon. V, 74 t 10 f 1
pallidus Zoch. Dej Cat. 3.ed. 61.

Cybister Curtis 1827.

Buqueti Aubé Spec. Hydr. 1838, 44 (Senegal
v. dytiscoides Sharp. Tr. dubl. Soc(2)II 2e p. 1882
738. (Madag.
Kolbe Arch. f. Naturg. XLIX, 1883, 421

Desjardinsi Aubé l.c. 93. (Maurice
Dej. Cat. 3e ed. 60.
Kolbe l.c. 427
Künck. Hist. Mad. t 34 f 2, 3.

madagascariensis Aubé l.c. 94.
Fairm. An. Fr. 1869, 189.
Kolbe l.c. 417
Künck. l.c. t 34 f 6, 7.
Brancs. Tab. Brancs. 1893. 219.

marginicollis Boheman. Ins. Caffr I, 235.
auritus Gerst. Arch. f. Naturg. XXXVII, 1871, 43.
Kolbe l.c. 420.
filicornis Sharp l.c. 719. (Afr. occid.

operosus Sharp l.c. 720
Kolbe l.c. 417.

owas Sap-Cast. Et. Ent. 100.
Aubé l.c. 85.
Fairm. An. Fr. 1869, 189.
Sharp l.c. 723.
Kolbe l.c. 418.
Künck. l.c. t 34 f 4, 5 [scrip. hova].
Brancs. l.c 219.

senegalensis Aubé l.c. 72.
Fairm. l.c. 189.
Sharp. l.c. 732.
Kunck l.c. t 34 f 8.
Brancs l.c. 219.
= convexiusculus Kolbe l.c. 420

tibialis Sharp l.c. 735
Kolbe l.c. 421.

tripunctatus Oliv. Ent. III, 1795, 40, p. 14 t 3 f 24
Aubé l.c. 76.
Sharp l.c. 730 (Bourbon, Mauric, etc., etc.
Künck l.c. t 34 f 1.
aegyptiacus Peyron An Fr. 1856, 722
africanus Cast. Et. Ent. 99. — Aubé Icon. V. 49 t 3 f 6.
Bonellii Dahl. Dej Cat. 3e ed. 60.
capensis Dej. Cat. 3e ed. 60
lateralis F. Suppl. Ent. 1798, 64. — Perch. Gen. 1835, II, 2 t 4.
meridionalis Géné Mem. Ac. Tor. 1836, 170 t 1 f 3.
scapularis Erich. Dej Cat. 3e ed. 60.
similis Dej Cat. 3e ed. 60.
v. cinctus Sharp l.c. 730 (Madag.
Kolbe l.c. 420.
v. irroratus Kolbe l.c. 420.

Enhydrini

Dineutes Mac Leay 1825.

dilatatus Régimb. An. Fr. 1882, 403, t 11 f 29, a. (Maurice

indus F. Ent. Syst. Suppl. 1798, 65 (Inde or.

Forsb. Nov. Act. Ups. VIII, 302

Régimb. l.c. 401 t 11 f 27, a. (Madag. nec Inde or.

= praemorsus F. Syst. El. I 1801, 275. (Inde or

Aubé Spec. Hydr. 1838, 765.

= emarginatus Dej. Cat. 3e ed. 1836, 66. (Maurice

= sinuatus Sturm Cat. 1826, 145. (Inde or.

livaceus Dej. Cat. 3e ed. 1836, 66 (Madag.

Régimb. An. Fr. 1882, 401 (Maurice

id. An. Fr. 1886, 247.

?V. cephalotes Dej. Cat. 3e ed. 1836, 66.

icipes C. Waterh A. M. N. H. (4) XVIII, 1876, 107 (Rodrigue

id. Phil. Trans. R. Soc. CLXVIII, 1879,

Régimb. An. Fr. 1882, 403.

roximus Aubé l.c. 1838, 764.

Dupont Dej. Cat. 3e ed. 66.

Fairm. An. Fr. 1869, 193.

Régimb. An Fr. 1882, 400 t 2 f 26.

id. An. Fr. 1891, 665.

= aterrimus Dupont l.c.

V. expansus Régimb. An Fr. 1891, 665.

inuosipennis Pap.-Cast Hist. Nat. I, 171 (Thibet erratim

Régimb. An. Fr. 1891, 665.

= bidens Vollenh. Rech. faune madag. 1869, 7 t 1 f 1, 2.

Régimb. An. Fr. 1886, 247.

= denticulatus Régimb. An. Fr. 1882, 402 t 11 f 28, a, b. (Nossibé, Mayotte

Brancs. l.c. 219.

V. comorensis Régimb. An Fr. 1891, 665. (Comores

subspinosus Klug, Symb. Phys. IV, 1829, t 34 f 9.
Aubé Spec. Hydr. 1838, 786.
Fairm. An. Fr. 1869, 193.
Régimb. An. Fr. 1883, 423, t 12 f 45 (Inde, Egypte, Madag.
= dentipennis Mackay An. Jav. 1825, 133.
v. laevigatus Dej. Cat. 3e éd. 1836, 66. (Maurice

Gyrinini.

Aulonogyrus Régimbart 1883.

carinipennis Régimb.
elegantissimus Régimb. An. Fr. 1883, 126, t 6 f 70, 75, 77.
Régimb. An. Fr. 1891, 672
Goudoti Régimb. An. Fr. 1883, 140, t 6 f 81
Régimb. An. Fr. 1891, 673.

*

festivus Klug. Ins. Mad. 1833, 137.

Gyrinus Geoffroy 1762.

2. nitidulus F. Ent. Syst. Suppl. 66. (Maurice
Aubé Spec. Hydr. 1838, 700. (Réunion, Pondichery
1. madagascariensis Aubé l.c. 675
Fairm. An. Fr. 1869, 191.
Régimb. An Fr. 1883, 155.
rufiventris Régimb. An. Fr. 1883, 146.
superciliaris Régimb. An. Fr. 1891, 681.

ignitus Régl

Orectochilini

Orectogyrus Régimbart 1883.

costatus Aubé, Spec. Hydr. 1838, 732.
Fairm. An. Fr. 1869, 192.
Régimb. An. Fr. 1883, 457, t 14 f 162.

cyanicollis Aubé Spec. Hydr. 1838, 736.
Dupont Dej. Cat 3e ed. 67.
Fairm. An. Fr. 1869, 193.
Régimb. An. Fr. 1883, 446 t 13 f 151.
— id. An. Fr. 1891, 719.
= ♀ coerulescens Aubé l.c.
Dupont l.c.

hastatus Régimb. An Fr. 1891, 720.
v. ♀ ensifer Régimb. l.c.

heros Régimb. An. Fr. 1883, 453 t 13 f 157.
— id. An. Fr. 1891, 723.

longitarsis Régimb. An. Fr. 1883, 466, t 14 f 171

madagascariensis Aubé l.c. 730.
Dupont l.c. 67.
Fairm. An. Fr. 1869, 192.
Régimb. An. Fr. 1883, 454. t 13 f 158.
— id. An Fr. 1891, 724.

Berthuri Régimb. An. Fr. 1883, 465 t. 14, f. 170.
— id. An. Fr. 1891, 717.

marticollis Aubé l.c. 728.
Dej. Cat. 3e ed. 67.
Fairm. An. Fr. 1869, 192.
Régimb. An. Fr. 1883, 444, t 13 f 149.
— id. An. Fr. 1891, 719.

callidocinctus Fairm. le Nat. 1880, 236.
id. An. Fr. 1880, 325.
Régimb. An. Fr. 1883, 448, t 13 f 152
— id. An. Fr. 1891, 719.
Brancs. l.c. Eug.

purpureus Régimb. An. Fr. 1891, 736.

dilloti Régimb. An. Fr. 1883, 444 t 13 f 148.
— id. An. Fr. 1891, 718.
v. ♀ scutellaris Régimb. An. Fr. 1891, 718.

speculum Aubé Spec. Hydr. 1838, 142
Régimb. An. Fr. 1883, 442, t 13 f 146.
— id. An. Fr. 1891, 717 (Comores, Mozambiq.

vestitus Régimb. An. Fr. 1891, 717

vicinus Régimb. An. Fr. 1891. 724.

RHYSODIDAE.

Rhysodes Dalman 1823.

canaliculatus

Grouvellei Fairm. An. Belg. 1895, 10.

montanus Künck Hist. Madag. t 32 f 10.

planifrons Fairm. An. Belg. 1893, 528. (Comores

tubericeps Fairm. An Fr. 1868, 782.
— id. An Fr. 1873, 387 et 389 [= canaliculatus Cast.]
— id. An. Belg. 1895, 11 [Synon. reconnue fausse]
Künck l.c. t 32 f 8.

Rhysodiastes Fairmaire 1895

parumcostatus Fairm. [Rhysodes] An. Fr. 1868, 782.
— id. An. Belg. 1895, 11.
Künck l.c. t 32 f 7.

STAPHYLINIDAE.

Piestini

Leptochirus Germar 1823.

convexus Sap-Cast. Et. Ent. 1835, I, 132. (Madag. & Comores.
Dohrn, St. E. Z. 1884, 41.
ebeninus Er. Gen. 828.

Lispinus Erichson 1840.

angustatus Er. Gen. 829, t 2 f 6.

microcephalus Fvl, An. Fr. 1866, 319.
id. Bul. Soc. Lin. Norm. 1867, I, 74. (Réunion.
barripennis Fvl. An. Fr. 1866, 318. (Madag. & Réunion
id. Bul. Soc. Lin. Norm. 1867, I, 73

Eleusis Laporte de Castelnau 1835

Ernestini Sap.-Cast. Et. Ent. 1835, I, 132. (Madag. & Comores.
complanata Er. Gen. 839, t 2 f 7.
impressicollis Fairm [Chasolium] Le Nat. 1880, 236.
id. An. Fr. 1881, 326.
Raoulti Fairm. [Chasolium] l.c.

testacea Er. Gen. 840.

tibialis Sap-Cast Et. Ent I 131
id. Hist. nat I 186, t 13 f 4.
Fvl. Bul. Soc. Lin. Norm. 1865, IX, 36 t 1 f 2.

Oxytelini

Trogophloeus Mannerheim 1830.

arsularis Kraatz B. E. Z. 1858, 127
Fvl. Faune Gall. rhén. III. 150. (Madag. & Réunion.

segnis Er. Gen. 802.

Oxytelus Gravenhorst 1802.

aurantiacus Fairm. Le Nat. 1880, 236.
id. An. Fr. 1881, 335 (Madag. & Nossi-bé.

insignitus Grav. Mon. 1802, 188. (Réunion
Er. Gen. 793 ob syn.
Woll. Cat. Madeira Col. 1857, 199. (Madère
Le C. Trans. Amer. Ent. Soc. 1877. VI, 236. (Amériques
Fvl. Rev. Ent. 1891, 90. (? Taïti.

latiusculus Kraatz Wiegm. arch. 1859, I, 176.
(Madag., Afr. austr., Inde, Chine, Australie, Syrie.
= sulcifrons Fvl. Faune Gal. Rhen. III Cat. xi.

laxipennis Fairm. An. Belg. 1893, 527. (Comor., Zanzib., Seychells,

madagascariensis Er. Gen. 793.

micans Kraatz Wiegm. arch. 1859, I, 175.

= ♀ puncticeps Kraatz l.c. 176.

nitidifrons Woll. a.m.n.H ( ) VIII, 1871, 411
id. Col. Ste Hel. 36.

sculptus Grav. Mon. 191
Fvl. Faune Gal. Rhen. III, 169 et syn.
Woll. Col Ste Hel. 34.

Holotrochus Erichson 1840.

crassicollis Er. Gen. 758.

Osorius Latreille 1829.

incisicrurus Latr. Nouv. An. Mus. Paris I, 85.
Klug. Ins. Mad. 139 t. 1 f. 18.
Er. Gen. 775
Sap.-Cast. Et Ent. I, t. 4 f. 2
† Coq. An. Fr. 1848, 180 t. 7 f. 3.
Dohrn. St. E.Z. 1884, 42.

Stenini

Stenus Latreille 1796.

attenuatus Er. Gen. 738.

colubrinus Er. Gen. 737

gracilis Er. Gen. 739

prolixus Er. Gen. 738.

Pinophilini

Oedichirus Erichson 1840.

foveicollis Quedf. W.E.Z. 1883, 117.

Paederini

Paederus Fabricius 1775.

:halybaeus Er. Gen. 664.

= Klugi Sap.-Cast. Hist. nat. I, 183.

'oerulescens Er. Gen. 664.

= Bernieri Sap.-Cast. l.c.

'astuosus Klug, Ins. Madag. 140.
Er. Gen. 665.

nadagascariensis Er. Gen. 652.

V. Goudoti Sap.-Cast. l.c. 183.

abaeus Er. Gen. 665. (Madag. Arabie, Afr. tropic.

= aestuans Boh. Ins. Caffr. I, 291 [nec Er.]

= longicornis Mots. B. M. 1858, II, 634.

Astenus Stephens 1832.

allidulus Woll. Cat. Can. Col. 1864, 591 (Canaries

=parviceps Ragusa Nat. Sicil. 1891, 239. (Madog. Zanzib., Afr. occid. (Sicile.

Medon Stephens 1832.

:bilicornis Woll. Cat. Mad. Col. 1857, 194
id. Col. Ste Hel. 34 et syn.
Fvl. Faun. Gal. Rhen. III, 322, t. 4, f. 8. (Subcosmopol.
id. An. Mus. Civ. Gen. 1878, XIII, 515.

= aegyptiacus Mots. B. M. 1858, II, 644.

= occultus C. Waterh. [Pithocharis] A. M. N. H. (4) 1876 XVIII, 108.
id. Phil. Fr. R. Soc. CLXVIII, 1879, 515. (Rodrigue.

= rufulus Lynch, Bol. Acad. Cordoba 1885, VII, 259.

bracceus Grav. Mon. Micr. 59.
Fvl. Faun. Gal. Rhen. III, 320, t. 4, f. 7.
id. An. Mus. Civ. Gen. 1878, XII, 234.
Woll. Col. Ste Hel. 33.

= brunniceps Fairm. R. Z. 1849, 290.

= nigriceps Kraatz Wiegm. Arch. 1859, I, 139.

= fastidiosus Fairm. An. Fr. 1861, 438.

Xantholinini

Leptacinus Erichson 1837

tenellus Er. Gen. 336.

Pachycorinus Motschulsky 1858

inflatipes Fairm. An. Belg. 1893, 527. (Madag & Comor.
sparsipennis Fairm. l.c. / id.

Xantholinus Serville 1825

anachoreta Er. Gen. 316
Kr. Wiegm. Arch. 1859, 102.

= hongkongensis Redt. Reis. Novar. 1867, II, 8.

coloratus Brancs. Jahr. Crefeld 1893, 220 t 3 f 8 (Neuibé

gagatinus Er. Gen. 316.
Har. Col. Heft. 1879, XVI, 27.

limbatus Klug. Ins. Madag. 138, t 1 f 13.

Staphylinini

Emus Curtis 1825.

iricanus Klug. Ins Madag. 137
Er. Gen. 350.
Fvl. Tijdschr. v. Ent. 1875

= Coquereli Fvl. An. Fr. 1866, 317.
id. Soc. Lin. Norm. 1867, I, 71.

Cafius Stephens

corallicola Fairm. R. M. Z. 1849, 289.
Fvl. an. mus. gen. 1877, X, 256.

Hesperus Fauvel

helvolus Er. Gen. 494.

Actobius Fauvel

orphanulus Er. Gen. 499, 931.

Philonthus Curtis 1825.

Fauveli Cog. An. Fr. 1866, 316 (Réunion.
= colubrinus Fvl. Bul. Soc. Lin. Norm. 1867, I, 70

fimbriolatus Er. Gen. 486. (Madag., Gabon

flavocinctus Motsch. B. M. 1858, II, 663 (Réunion, Inde
= rufomarginatus Kraatz Wiegm. Arch. 1859, 90

longicornis Steph. Ill. Brit. V, 237. (Cosmopolite
Fvl. Faun. Gal. Rhen. III, 480.
id. Rev. Ent. 1891, 115.
Woll. Col. Ste Hel. 29 et syn.

= fuscicornis Nordm. Symb. 96.
= nitidicollis Klug. Jahr. Berl. Ac. 1845, 644.
Peters Reis. 1862, 177, t. 10, f 15 (verisim.)
= algiricus Motsch. B. M. 1858, II, 663.

nigritulus Grav. Mon. Micr. 41.
Fvl. Faun. Gal. Rhen. III, 469.
Woll. Col. Ste Hel. 29.
Sharp. A. M. N. H. 1889, III, 40.

peregrinus Fvl. An. Fr. 1866, 315.
id. Bul. Soc. Lin. Norm. 1867, I, 69.

quisquiliarius Gyll. Ins. Suec. II, 335.
Fvl. Faun. Gal. Rhen. III, 363.
id. Rev. Ent. 1889, 100.

thermarum Aubé An. Fr. 1850, 316.
Fvl. Faun. Gal. Rhen. III, 470.
id. An. Mus. Civ. Gen. 1878, XII, 268.

= angustatus Kraatz Wiegm. Arch. 1859, 92.
Sharp, A. M. N. H. 1889, III, 39.
= pygmaeus Kraatz l.c. 93.
= fuscolateralis Motsch. Et. Ent. 1859, 76.
= sulcifrons Sharp l.c.

turbidus Er. Gen. 484.
Woll. Col. Ste Hel. 30.

= rufipes Bob. Ins. Caffr. 1848, I, 284.
= punctipennis Woll. Cat. Col. Madeira, 1857, 192
id. Col. Atl. 494.
= Pharao Saulcy An. Fr. 1864, 639.
= rubiginosus Solsky Mon. Soc. Ent. Ross. 1867. V. 30.

Anisolinus Sharp,

impressicollis Klug. Ins. Madag. 188, t. 4, f. 12.
Er. Gen. 508.

latus Er. l.c.

hemorrhoidalis Brancs. [Philonthus] Jahr. Trencsén
1893, 220, t. 11, f. 9.

Tanygnathus Erichson 1837

terminalis Er. Käf. Mark. I, 418.
id. Gen. 288, t. 1 f. 4.
Fvl. Faun. Gal. Rhen. III, 544.

= pictus Mots. B.M. 1858, III, 213.
= ruficollis Kraatz Wiegm. Arch. 1859, 64.
= varicornis Woll. Col. Hesper. 1867, 234.

Tachyporini

Conurus Stephens 1832

grossus Er. Gen. 220.

= obesus Boh. Ins. Caffr. I, 270.

Cilea Duval

silphoides Lin.

v. picta Er. Gen. 246 (Madag., Inde, Angola

= marginicollis Kraatz Nat. 394
id. Wiegm. Arch. 1859, 53.

Aleocharini

Leucocraspedum Kraatz
= Eurysiossa Mots.

contractulum Er. Gen. 917.

Homalota Mannerheim 1830.

platycephala Fvl. An. Fr. 1866, 314. (Réunion
id. Bul. Soc. Lin. Norm. 1867, I, 68.

= megacephala Fvl. l.c. 1868, II, 379.

Atheta Thomson

coriaria Kraatz, Nat. I 82
Fvl. Faun. Gal. Rhen. III, 715.
Woll. Col. Hesp. 223.
id. Col. Ste Hel. 24.

mucronata Kr. Wiegm. arch. 1859, 89.

= putrescens Woll. Trans. Ent. Soc. 1862, 185.—
id. l.c. — — — — — 1891, 292.—
= subputrescens Woll. Col. Hesp. 223.

= destituta Waterh. A.M.N.H. 1876(4)XVIII, 108
id. Phil. Trans. R. Soc. CLXVIII, 1879.

haedida Er. gen. 917.

Aleochara Gravenhorst 1802.

amplicollis Er. Gen. 171 (Gen. dub. an Polylobus?)

dilatata Er. Gen. 160.

parvula Waterh. A.M.N.H (4)XVIII, 1876, 107 (Rodrig.
id. Phil. Tr. R. Soc. CLXVIII, 1879.

picipennis Epp. B.E.Z. 1885, 110.

puberula Klug, Ins Madag. 139.
Er. Gen. 165
Kr. Wiegm. arch. 1859, 16.
Woll. Col. Hesp. 128.
id. Col. Ste Hel. 23.

= vaga Er. Gen 172.
Fvl. Rev. Ent. 1889, 109.
= decorata Aubé An. Fr. 1850, 311.

= Armitagei Woll. Ins. Mad. 1854, 559.

= sanguinolenta Mots. B.M. 1858, III, 241.

= dubia Fauv. An Fr. 1863, 428.

ulnerata Er. Gen. 164.

Pelusa Erichson. 1839.

labiata Er. Gen. 193 t 1 f 1.

Philusina Wasmann. 1893.

crematogastris Wasm. D.E.Z. 1893, 101 t 5 f 2.

id. Myrmekophil. und Termitophil. Arthr. 1894, 69.

Termitochara Wasmann. 1893.

Kraatzi Wasm. W.E.Z. 1893, 247.

id. Myrm. Term. Arthr. 1894, 88.

PSELAPHIDAE.

Acylopselaphus Raffray 1883.

Mariae Raffr. Rev. Ent. 1883, 237 t 5 f 11.—
d t. 4 f 12, 13, 14.

Autoplectus Raffray 1883.

integricollis Raffr. Rev. Ent. 1887, 50

torticornis Raffr. Rev. Ent. 1883, 249, t 5, f. 26-29.

Euplectus Leach 1817.

Sikorai Wasm. Myrmekoph. & Termitoph. Arth. 1894, 213.

Centrophthalmus Motschulsky.

communis C. Schauf. Ent. Nachr. 1890, 139.

CLAVIGERIDAE.

Radama Raffray 1883.

fimbriatus Wasm. D. E. Z. 1893, 107, t 5, f 8.
id. Myrm. Term. Arthr. 1894, 106.

inflatus Raffr. Rev. Ent. 1883, 231 t 4 f 3-4.

spinipennis Raffr. Rev. Ent. 1883, 232, t 4 f 5-6.

Miroclaviger Wasmann 1893.

cervicornis Wasm. D. E. Z. 1893, 108 t. 5, f. 9.
id. Myrm. Term. Arthr. 1894, 107.
(errat. scrip. Microclaviger).

Rhynchoclaviger Wasmann 1891.

crematogastris Wasm. St. E.Z. 1891, 5, t. 1, f. 1.
id. Myrm. Term. Arthr. 1894, 107.

Articeropsis Wasmann 1893.

Sikorai Wasm. D.E.Z. 1893, 111.
id. W.E.Z. 1893, 257.
id. Myrm. Term. Arthr. 1894, 108.

Paussiger Wasmann 1893.

limicornis Wasm. D.E.Z. 1893, 110.
id. W.E.Z. 1893, 257.
id. Myrm. Term. Arthr. 1894, 108.

Neocerus Wasman 1893.

compressicornis Wasm. D.E.Z. 1893, 105 t. 5, f. 6.
id. Myrm. Term. Arthr. 1894, 109.

Novofustiger Wasmann 1893.

Raffrayi Wasm. D.E.Z. 1893, 106, t. 5, f. 7.
id. Myrm. Term. Arthr. 1894, 109.

Commatoceropsis Raffray 1890

madagascariensis Raffr. [Fustiger] Rev. Ent. 1883, 229, t. 4 f. 1, 2.
Reitt. [Fustigerodes] D.E.Z. 1884, 168.
Wasm. Myrm. Term. Arthr. 1894, 109.

Semiclaviger Wasmann 1893.

Sikorai Wasm. D.E.Z. 1893, 103, t. 5 f. 5.
Wasm. Myrm. Term. Arthr. 1894, 111.

SCYDMAENIDAE.

Cyrtoscydmus Motschulsky.

madagascariensis C. Schauf. Nung. Otiosus III, 1890, 587. —

Kolbei C. Schauf. l.c. 590.

validus C. Schauf. l.c. 588.

vulgaris C. Schauf. l.c. 589.

Scydmaenus Latreille 1802.

gigantens C. Schauf. Nung. Otiosus III, 1890, 591

raptax C. Schauf. l.c. 592.

SILPHIDAE.

Silpha Linné 1758.

metallescens Fairm. Fe Nat. (2) I, 1887, 56 f. 4.

CLAMBIDAE.

CORYLOPHIDAE

Parmulus Gundlach.

(= Sacium Sec. = Clypeaster Latr.)

monstrosus C. Schauf. [Clypeaster] Tijdschr. v. Ent. XXXIV, 1891, 2 t, f 1.

TRICHOPTERYGIDAE

Trichopteryx Kirby 1826.

montivaga C. Schauf Tijdschr. v. Ent. XXXIV, 1891, 1.

madagascariensis C. Schauf. Nunq. Otiosus III 1890, 597.

SCAPHIDIIDAE

Scaphidium olivier 1791.

pulchellum Reit. Verh. ver. Brünn XVIII, 40

rufum Brancsik Jahr. Trencsén 1893, 220 (Nossi-bé.

Scaphisoma Leach 1812.

madecassa Brancsik l.c. 221 (Nossi-bé.

type coll. R. Oberthür

+ basale cast. Hist. nat. II p. 19.
+ Consobrinum cast. do 19.
nigrum cast do 19
punctatum cast do 19
simile cast do 19
unicolor cast do 19.
+ fasciatum cast do 19
+ bicolor cast do 19
~~Dupont~~ Dej. Cat. 3. ed. 133.

PHALACRIDAE

EROTYLIDAE

Megalodacne Crotch 1873.

sponsa Lacord. Mm. Erotyl. 1842, 69.

Episcaphula Crotch 1876.

Mouati Guér. Rev. Zool.
Lacord. Mon. Erotyl. 54.

Triplax Herbst 1793.

fasciata Bracsik Jahr. Erencsén 1893, 246.

Goudoti Lacord. mon. Erotyl. 205.

haematosoma Lacord. l.c. 208.

omogera Lacord l.c. 206.

pauxilla Lacord. l.c. 207.

LANGURIIDAE

ENDOMYCHIDAE.

Cymones Gorham 1886.

Cowani Gorh. P.Z.S. 1886, 158, t. 17, f. 1.

helopioides Gorh. l.c. t. 17, f. 3, ♂.

Sharpi Gorh. l.c. 157 t. 17, f. 4.

Haploscelis Blanchard, 1845.

(= Dioedes Gerstaecker 1857.).

atratus Klug. [Eumorphus] Ins. Madag. 126, t. 5, f. 12
Gerst. Mon. Endom. 1858, 138 t. 2, f. 10.
Fairm. An. Fr. 1871, 77.

atroclavatus Fairm.† St. E.Z. 1884, 140.* [Dioedes]

columbinus Gerst. Wiegm. Arch. XXIII, 1857, 232.
id. Mon. Endom. 139.
Fairm. An. Fr. 1871, 78.
= cupripennis Sturm, Cat. 1843, 313.

costipennis Fairm.† An. Fr. 1884, 242.* [Dioedes]

oblongulus Fairm. St. E.Z. 1884, 140.

Hybopterus Fairmaire 1884.

plagiaticollis Fairm. St. E.Z. 1884, 141

Stenotarsus Perty 1832.

lignarius Fairm.

ovulum Fairm.

russatus Gorh. Tr. Ent. Soc. 1874, 446. (Ceylon
Brancs. Jahr. Erencsén 1893, 247, (Nossi Bé
sulcithorax Guér. Arch. Ent. I, 1857, 27 t. 15 f. 23
Chevrol. Dej. Cat. 3 éd. 463.
Fairm. An. Fr. 1871, 78.
= hæmorrhoidalis Gerst. Mon. Endom. 334.

Crocboideus Westwood 1833.

cruciatus Zalm. Kongl. Vet. ak. Handl. 1825, 400.
t. 5, f. 9-11.
Westw. Tr. Lin. Soc. XVI, 675, t. 33, f 58-59.
id. Tr. Ent. Soc. II, 1838 96.
Gerst. Mon. Endom. 388.

Dalmani Westw. Tr. Ent. Soc. II, 1838, 96, t 10 f 8
Gerst. Mon. Endom. 384.
Fauna aus br. 1871. 78.

Desjardinsi Guér. Rev. Zool. 1838, 22.
Gerst. Mon. Endom. 385.
Cog. An. Fr. 1859, 257 t 6 f 2.

Wasm. Myrm. Term. arthr. 1894, 132.

= amphora Cantor. Journ. Proc. Ent. Soc. 118.

CRYPTOPHAGIDAE

Philocryptus Wasmann 1895
(= Cryptophilus Wasmann 1894).

crematogastris Wasm. [Cryptophilus] Myrm. Term. arthr. 1894. 217 et 131.
id – W. E. Z. 1895, 44.

LATHRIDIIDAE

TRITOMIDAE

NITIDULIDAE

Cillaeus Laporte-Castelnau 1835.

apicatus Fairm. An. Fr. 1884, 226.

castaneus Lap.-Cast. Et. Ent. 133.
Murr. Mon. Nit. 312 t. 35, f. 2. 1864
Fairm. An. Fr. 1869, 200.

filiformis Lap.-Cast. Et. Ent. 134.
Fairm. An. Fr. 1869, 202.

longipennis Murr. l.c. 314
Fairm. l.c. 201.

megacephalus Lap.-Cast. Et. Ent. 134
Murr. l.c. 313.
Fairm. l.c. 200.

obscurus Lap.-Cast. l.c. 134.
Murr. l.c. 313, t. 35 f 3.
Fairm. l.c. 201.

scapularis Fairm. l.c. 201

suturalis Lap.-Cast. l.c. 133
Fairm. l.c. 201.

thoracicus Lap.-Cast l.c. 134
Fairm. l.c. 202

vermis Murr. l.c. 315
Fairm. l.c. 201.

Carpophilus Stephens 1830.

angustatus Murr. mon. nitidul. 1864, 376.
Fairm. An. Fr. 1869, 199.

apicipennis Fairm. l.c. 200.

biguttatus Murr. l.c. 364.
Fairm. l.c. 199.

= sanguineofasciatus Dup.

bisignatus Bohem. Ins. Caffr. I, 563 (Caffrerie
Murr. l.c. 365. (Comores sec. Fairm

discolor Murr. l.c. 345
Fairm. l.c. 199.

hemipterus L. Syst. Nat. I, 2, 565. (Cosmopol.
murr. mon. 363, t. 32, f. 10. (Comores sec. Fairm.

= bimaculatus ol. Ent. III, 12, 6, t. 2 f. 11.
= bimaculatus Melsh.
= cadaverinus F.
= ficus F.
= flexuosus Payk.
= quadriguttatus Thunb.

Hoffmannseggi Murr. l.c. 362.

humeralis F. Syst. El. I, 354.
Murr. l.c. 343.
Fairm. l.c. 199.
C. Waterh. Phil. Trans. R. Soc. CLXVIII, 1879, 515.

= picinus Bohem. l.c. 560 (Caffrerie.

morio Murr. l.c. 357.
Fairm. l.c. 199.

= nigerrimus Dup. Dej. Cat. 3. ed. 134.

notatus Murr. l.c. 380.
Fairm. l.c. 200.

ochropterus Klug, Peters Reis. 1862, 209 t. 12 f. 9.
Murr. l.c. 377.
Fairm. l.c. 200.

= lividus Dej. Cat. 3. ed. 134.

truncatus Murr. l.c. 381.
Fairm. l.c. 200.

Haptoncura

sobrina Grouv. An. Fr. 1894, 15 (Réunion, Séchelles

Mystrops Erichson 1843.

dispar Er. Germ. Zeits. IV, 235.
Murr. Mon. 413.
Fairm. An. Fr. 1869, 198.

Microporum C. Waterhouse 1876

nitens C. Waterh. A. M. N. H (4) XVIII, 1876, 109.
id. Phil. Trans. R. Soc. CLXVIII, 1879, 516, t. 53 f. 2.
(Rodrigue.

Probaenus C. Waterhouse 1876.

longicornis C. Waterh. A. M. N. H. (4) XVIII, 1876, 110.
id. Phil. Trans. R. Soc. CLXVIII, 1879, 517 t 53 f. 1
(Rodrigue.

Epuraea Erichson 1843.

ophthalmica C. Waterh. A. M. N. H. ibid. 111.
id. Phil. Trans. R. Soc. ibid. 518.

Omosiphora

costata C. Schauf. Tijdschr. v. Ent. XXXIV, 1891, 6.

Idosoronia C. Schaufuss 1891

picta C. Schauf. l. c. 4 t. 1, f. 2.

Stelidota Erichson 1843.

clavicornis Fairm. An. Fr. 1868, 774.

Aethina Erichson 1843.

pubescens Fairm. An. Fr. 1868, 774.
Künck. Hist. Modag. t. 32, f. 13.

v. limbalis Brancsik, Jahr. Trencsén, 1893, 221
(Nossibé

Pria Stephens 1830.

Sordites Erichson 1843.

brevisculus Fairm. An. Fr. 1868, 775.

costulatus Fairm. l.c.
Künck. Hist. Madag. t. 33, f. 5.

Strongylus Herbst 1793.

Pallodes Erichson 1843.

Glischrochilus Murray
(= Ips Fabricius
Desbassini Sap.-Cast. Hist. Nat. II, 14 (Réunion

TROGOSITIDAE

Nemosoma

fasciatum Fairm. An. Fr. 1868, 196

n'est pas un Nemosoma mais un Hétéromère voisin d'Hypophloeus
Cf. Réveillé An. Fr 1888 Bul. CCVII.

Alindria Erichson 1844.

Alluaudi Lév. An. Fr. 1894, Bul. CXLIII

cyanicornis Fairm. Ec Nat.(2) I, 1887, 56, f. 5.
Künck. Hist. Madag. t. 32, f 5.

Sedilloti Lév. An. Fr. 1881, Bul. LXVIII
Künck. l.c. t. 32, f. 2.
= Sikorai Kuw. D.E.Z. 1891, 310.
Lév. An. Fr. 1892, Bul. CVIII.

Spectabilis Klug. Ins. Madag. 116. t 5 f 1.
Fairm. An. Fr. 1868, 176.
Künck Hist. Madag. t. 32, f. 4. [3 et 4 erratim?].

Tenebroides Filler 1783.

mauritanicus L. (Cosmopolite
(nombr. synon.)

Sophocateres Olliff 1888.

pusillus Klug. Ins. Madag. 71
Fairm. [Peltis] An. Fr. 1869, 202.
Künck. [Peltis], Le. t. 32, f. 12.
= africanus Mots. B.M. 1863, III, 508.
= Grani Allib. R.Z. 1847, 12
Rey, An. Fr. 1888 Bul. XXXVIII.

Gauramba Thomson 1859.

olobicoides Fairm. [Peltis] An. Fr. 1869, XXX.
id. An. Fr. 1886, 32, t. 2, f 2. —

COLYDIIDAE.

Rhechodes Erichson 1848. (et Fairmaire 1868).

Coquereli Fairm. Ann. Fr. 1868, 778.
id. Ann. Fr. 1886, 32, t. 3, f. 1.
Künck. Hist. Madag. t. 32, f. 15.

fungosus Fairm. Ann. Fr. 1868, 778.
Künck. l.c. t. 32, f. 16.

Humbloti Fairm. Ann. Belg. 1893, 528
Künck. l.c. t. 33, f. 9.

[serratus Klug. in. litt.

tuberosus C. Schauf. Nung. Ot. III, 1890, ~~528~~ 593. (comparé à Fungosus et à Coquereli.)

variegatus C. Schauf. l.c. 596.

Ascomma C. Waterhouse 1876.

horrida C. Waterh. A. M. N. H. (4) XVIII 1876, 111
id. Phil. Tr. R. Soc. CLXVIII, 1879, 519, t. 53, f. 3.
(Rodrigue.

Priolomus Erichson 1845.

spinicollis Fairm. Ann. Fr. 1869, 204.

Endocoxelus C. Waterhouse 1876.

variegatus C. Waterh. A. M. N. H. l.c. 112.
id. Phil. Tr. l.c. 520, t. 53, f. 4
(Rodrigue.

Ditoma Herbst 1793.

= Microprius Fairmaire 1868, sec Grouv

terrena Fairm. [Microprius] Ann. Fr. 1868, 779.

Cerchanotus Erichson 1845.

Diplotoma Erichson 1845

Erichsoni Reitt. D. E. Z. 1878, 113.
colorata Reitt. l.c. 114.

Syntarsus Fairm. pire 1869.
(? = Diplotoma Erichson-)

asperulus Fairm. Ann. Fr. 1869, 206

soricinus Fairm. l.c. 206.

Aprostoma Guérin 1839. (cf Fairmaire Ann Fr. 1868, 780; Reitter V.E.Z. 1878, 120.)

Lilum Guérin Rev. Zool. 1839,
Fairm. Ann. Fr. 1868, 780.

Mecedanum Erichson 1845.

Erichsoni Sharp, Ent. M.M. XXIX, 1893, 255.

Sosylus Erichson 1845.

Poudoti Fairm. Ann. Fr. 1869, 206.

Aeschyntelus C. Waterhouse 1876.

ter C. Waterh. A.M.N.H. (4) XVIII, 1876, 113.
id. Phil. Trans. R. Soc. CLXVIII, 1879, 521, t. 53, f. 5.

Penthelispa Pascoe 1860.

onferta Reitt. V.E.Z. 1878, 123.

Pycnomerus Erichson 1842.

ribricollis Fairm. Ann. Fr. 1868, 780.
Künck. Hist. Madag. t. 32, f. 11.

ulgaris C. Schaufl. Tijdschr. v. Ent. XXXIV, 1891, 8.

Ceylon Latreille 1807.

mplicolle Fairm. le Nat. 1880, 236.
id. Ann. Fr. 1880, 327. (Mossi-lé
Künck. l.c. t. 33, f. 10.

ervicolle Fairm. Ann. Fr. 1869, 207.
Künck. l.c. t. 33, f. 11.

Mychocerus Erichson 1845.

'lluaudi Grouv. Ann. Fr. 1894, 15 (Séchelles

Murmidius Leach 1822

(Placé dans les Histeridae par Gemm. et Har. — Genre de transition entre les Colydiidae et les Cucujidae.)

segregatus C. Waterh. A.M.N.H.(4) XVIII, 1876 114.
id. Phil. Tr. R. Soc. CLXVIII, 1879, §21.

Tritomidea

CUCUJIDAE

Passandrina Reitter 1878.

egregia Reitt. Verh. Zool. Bot. Ges. Wien. 1878, 187

Hectarthrum Newman 1838.

Goudoti Grouv. Ann. Fr. 1875, Bull. CCXXXV.
Künck. Hist. Mdag. t. 32, f. 6.

= bilineatum Reitt. l.c. 186.

Inopeplus Smith
(= Sno Laporte de Castelnau 1835)

brevisculus C. Schauf. Nung. Ot. III, 1890, 604.

pictus Lap.-Cast. Et. Ent. 1835, 135.
Fairm. Ann. Fr. 1869, 207.

= fragilis C. Schauf [Pseudino] l.c. 602
(sec Grouv.)
Künck. l.c. t. 33, f 12.

Pseudino Fairmaire 1869.

Coquerelii Fairm. Ann. Fr. 1869, 208.
Künck. l.c. t. 33, f 13.

Hyliota Latreille
(= Bruntes Fabricius 1801)

atratus Grouv. Ann. Fr. 1890, Bull. XCII.

cinnamomeus Fairm. Ann. Fr. 1868, 781

quadraticollis Fairm. l.c. 781.

Telephanus Erichson 1845.

armatus Grouv. Ann. Mus. Civ. Gen. (2) IX, 127.
C. Schauf. Nung. ot. III, 1890, 598.

cedius C. Schauf. l.c. 601.

gracilis C. Schauf. l.c. 600.

spinosus Grouv. Ann. Fr. 1890 Bull. XCII
C. Schauf. l.c. 599.

Laemophloeus Laporte de Castelnau 1840 (an Stephens?)

palpalis C. Waterh. A. M. N. H. (4) XVIII, 1876, 114
id. Phil. Tr. R. Soc. CLXVIII, 1879, 522. (Rodrigue.

pusillus Schön. et syn. (Cosmopolite.

testaceus F. (id. —

Cryptamorpha Wollaston 1854.

Desjardinsi Guér [Psammoechus] Ic. R. Anim. Ins. 196.
= musae Woll. Ins. Mader. 157. t. 4. f. 1.

Psammoecidius Fairmaire 1869 (erratim scrip. Psammaechidius).

binicollis Fairm. Ann. Fr. 1869, 209.
Künck [erratim Psammochoedius] Hist. Madag. t. 33, f. 14.

Silvanus Latreille 1807.

quadraticollis Reitt. Col. Heft. XV, 1876, 62.

Holocephala Fairmaire 1886
(|| Pachycephala Fairmaire 1883). (placé à tort dans les Trogositidae).

chlorotica Fairm. Ann. Fr. 1886, 31
Künck. t. 33, f. 8.

DERMESTIDAE.

Dermestes Linné 1767.

cadaverinus F. , cosmopolite (Nossibé
cf. Brancsik Jahr. Erenczen 1893, 222.
vulpinus F. Cosmopolite (id
cf. Brancsik. l.c.

Attagenus Latreille 1807

annulifer Lap.-Cast. Hist. Nat. II, 36.

(?= cinnamomeus Roth, ?= gloriosae F. cf. Fairm. Rev. Ent. 1892, 91.

Aethriostoma Motschulsky 1858.

gloriosae F. Syst. El. I, 107 [Anthrenus] (Inde or.
Mots. Et. Ent. 1858, 146.
cf Fairm. Ann. Belg. 1893, 523 (Comores.

undulata Mots. l.c. 47 t. 1, f. 10 (Inde or.
Fairm. An. Belg. 1893, 528. (Mayotte.

& Fairm. Ann. Belg. 1893, 528.

Anthrenus Geoffroy 1764.

CISTELIDAE

Limnichini.

HISTERIDAE

Notolister Lewis 1894

dux Lew.[Epierus] A.M.N.H. 1891, 387.

Edwardsi Mars.[Aulacosternus] Mon. 1853, 237 t.6,f.2.

imitans Lew[Epierus] l.c. 388.

Apobletes Marseul 1860

exhaustus Schmidt Ent. Nachr. 1893, 9.
id. An. Fr. 1895 Bul. CXXXII.

frater Schmidt An. Fr. 1895, Bul. CXXXII.

incognitus Schmidt Ent. Nachr. 1893, 8.
id. An. Fr. 1895 Bul. CXXXII.

latiusculus Schmidt l.c. 8.

nigritulus Lew. A.M.N.H. ( ) 1892, 342.

owas Mars. Mon. 1853, 245 t.6,f.4.

planipygus Schmidt An. Fr. 1895, Bul. CXXXII.

striatellus Mars. Mon. 1853, 246, t.6,f.5.

taciturnus Mars. l.c. 244, t.6, f.2.
Dupont, Dej. Cat. 3.ed. 143.
Schmidt An. Fr. 1895 Bul. CXXXII.

Platysoma Leach 1817.

bulvinatum Schmidt An. Fr. 1895 Bul. CXXXI.

quadricorne Lew. A.M.N.H. 1894, 177. ( )

Richteri Schmidt Ent. Nachr. 1889, 335.
id. An. Fr. 1893, Bul. XCIX.
id. l.c. 1895 Bul. CXXXI.

tenuimargo Schmidt An. Fr. 1893, Bul. G.

Hister Linné 1767.

aequistrius Mars. Mon. 1854, 589, t.10, f. 148.

boudoti Mars. l.c. 585 t.10, f. 144.

decurvus Mars. l.c. 232, t.7, f.48.

kikorai Lew. a.m.n.h. 1891, 387 ( )

Carcinops Marseul 1855

madagascariensis Mars. mon. 1855, 99 t.8,f.12. (h.222)

Paromalus Erichson 1834.

Alluaudi Schmidt An. Fr. 1893, Bul. C.

Sphaericosoma Marseul 1868.

ovum Mars. Mon. 1855, 164, t. 9, n° 32.

Saprinus Erichson 1834.

disjunctus Mars. Mon. 1855, 331, t. 20, f. 163.
Schmidt. An. Fr. 1895, Bul. CXXXIII.

Erichsoni Mars. l.c. 363, t. 16, f. 8.
Schmidt. An. Fr. 1893, Bul. C.

fulgidicollis Mars. Mon. 1855, 392, t. 16, f. 32.

Cerétrius Erichson 1834.

mozambicus Mars l.c. 138, t. 3, f. 5

Epiechinus Lewis 1891.

bova Lew. [Onthophilus] A.m.n.H( ) 1885, 473.

Bacanius Leconte 1853.

ambiguus Schmidt An. Fr. 1893, Bul. CI.

inopinatus Smidt l.c. CII.

Acritus Leconte 1853

Alluaudi Schmidt An. Fr. 1895, Bul. CXXXIV.

algarum Schmidt l.c. 1893, Bul. CIII.

madagascariensis Schmidt l.c. 1895. Bul. CXXXIII.

HYDROPHILIDAE.

Hydrochini

Hydrochus Leach 1817.

Hydrena Kugelann 1794.

Berosini

Berosus Leach 1817.

1° Berosus sensu stricto

2° Enoplurus Hope

acutispina Fairm. Ann. Fr. 1869, 196
voir rectific. ibid. 1886, 31.

bidenticulatus Muls. Opusc. Ent. IX, 1859, 59

mixtus C. Waterh. A.M.N.H. (4) XVIII, 1876, 114
id. Phil. Trans. R. Soc. CLXVIII, 1879, 523
/ Rodrigue.

obscuriceps Fairm. Ann. Fr. 1886, 31

prolongatus Fairm. Ann. Fr. 1869, 196.

Brachygaster Mulsant 1853
(‖ Volvulus Brullé 1835)

denticulata Muls. An. Soc. Lin. Lyon, 1853, 383.

inflata Brullé [Volvulus] Hist. Nat. V, 1835, 283, t. 13 f. 4
Lacord. Gen. Atlas t. 13, f. 5. / Maurice.

stagnicola Muls. l.c. 385.

Hydrophilini

Sternolophus Solier 1834.

comoriensis Fairm. Ann. Fr. 1869, 195.

unicolor Lap.-Cast Hist. Nat. II, 54.
Fairm. Ann. Fr. 1869, 195.—

Sternoxus Solier 1834.

(‡ Hydrophilus auct.
cf. Bedel Rev. Ent. 1892, 306 et suiv.

ruficornis Klug, [Hydrophilus] Ins. Madag. 1833, 159.
Fairm. Ann. Fr. 1869, 193.

s-g. Temnopterus Solier 1834

aculeatus Sol. Ann. Fr. 1834, 308

= spinipennis Gory, Guér. Icon. 72 t. 20 f 14.
Dap.-Cast. Hist. Nat. II, 51.
= armatus Dap.-Cast Hist. Nat. II, 51.
= lugubris Motsh. B. M. 1845, I, 31.
= aegyptiacus Peyron Ann. Fr. 1856, 723
Reiche Ann. Fr. 1857, Bull. 110, note

Hydrophilus Müller 1764

(Hydrous Oahl 1775. — Hydrochara Berthold 1827
Hydrocharis Westwood 1840.)

fulvofemoratus Fairm. [Hydrous] Ann. Fr. 1869, 193.

uniformis Fairm. [Hydrous] l.c. 194.

Hydrobius Leach 1817

s.g. Tritonus Mulsant 1844.

cribratus Muls. Ann. Soc. Agr. Lyon, VII, 1844, 377
(Maurice.

Paracymus Thomson

Philydrus Solier

melanocephalus ol. (Europe
C. Waterh. Phil. Trans. R. Soc. CLXVIII, 1879, 523
(Rodrigue.

Helochares Mulsant

nigrifrons Brancsik Jahr. Trencsén. 1893, 219. (Nossi-Bé

s.g. Graphelochares Kuwert

Laccobius Erichson 1837.

Amphiops Erichson 1843.

lucidus Er. Wiegm. Arch. 1843, 231.
(Angola et Madagascar.

Sphaeridiini.

Sphaeridium Fabricius 1775.

chrysomelinum Klug, Ins. Madag. 1833, 160.
Fairm. Ann. Fr. 1869, 198.

Coelostoma Brullé
(Cyclonotum Erichson 1837.)

orbiculare F.
cf. Fairm. Ann. Fr. 1869, 197 (Europe (Madagascar

punctulatum Klug. Ins. Madag. 1833, 161.
Fairm. An. Fr. 1869, 198.

Dactylosternum Wollaston 1854.

cassidaeforme [s.g. ‖ Erichopoda] Brullé Hist. Nat
I, 295, t. 13. f. 12.
Fairm. Ann. Fr. 1869, 197.
Bedel Ann. Fr. 1881, Bull. XCV.

depressum Klug [Sphaeridium] Ins. Madag. 160.
Fairm. Ann. Fr. 1869, 197.

diaperinum Klug. [Sphaeridium] l.c. 160.
Fairm. l.c. 198.

insulare Sap.-Cast. Hist. Nat. II. 59 (Maurice)
= abdominale Woll. (nec F.)
= Rousseti Woll. Ins. Mader. 100 t. 3, f. 1. 1854.

Cercyon Leach 1817

grandis Sap.-Cast. Hist. Nat. II, 62.
Fairm. Ann. Fr. 1869, 198.

rufocaudatus Fairm. Ann. Belg. 1893, 326
(Comores.

GEORYSSIDAE.

PARNIDAE.

Potamophilus Germar 1811.

abdominalis C.O. Waterh. List. Ent. II, 529.

= oxypterus Fairm. An. Belg. XXXIII, 1889, CR. xc
id. ann. Belg. 1895, 12.
Kunck. Hist. Madag. t. 33, f. 15.

Hydrobus Fairmaire 1889.

dermestoides Fairm. Ann. Belg. XXXIII, 1889, CR. xc
Künck. l.c. t. 33, f 16.

Parnus Fabricius 1792.

Alluaudi Grouv.

semifuscus Grouv.

vestitus Grouv.

HETEROCERIDAE.

Heterocerus Fabricius

elongatus Grouv.

incertus Grouv.

PLATYCERIDAE = LUCANIDAE.

Cladognathus Burmeister 1847.

punctatissimus Fairm. Ann. Belg. 1893, 529 (Comores.

cerricornis Latr. Règne anim. III t. 1, f. 3.
Burm. Handb. V, 1847, 392.
Reiche Ann. Fr. 1853, 81.
Künck. Hist. Madag. t. 21, f. 6, 7.
(v. Brunneus Ronfried Ent. Nachr. 1893, 119 (Afrig. orient.

Rigidius MacLeay 1819.

madagascariensis Sap.-Cast. Hist. Nat. II, 175
Burm. Handb. V, 434.
Künck. l.c. t. 21, f. 8.

Oberndorferi Ronfried Ent. Nachr. 1893, 118.

Agnus Burmeister 1847.

genus Burm. Handb. V, 1847, 442. (Réunion.
= agnus Dej. Cat. 3e ed. 194.

Amneidus Coquerel 1866.

Godefroyi Coq. Ann. Fr. 1866, 326, t. 7, f. 1.
(Réunion.

Figulus MacLeay 1819.

anthracinus Klug. Ins. Madag. 1833, 173.
Künck. l.c. t. 21 f. 9
= ebenus Westw. Ann. Sc. nat. (3) I, 1834, 129, t. 7, f. 4.
= vulneratus Thoms. Ann. Fr. 1862, 433.

triatus Ol. Ent. I, 1, 19, t. 4, f. 14.
Westw. Ent. Mag. V, 262.
Sap.-Cast. Hist. Nat. II, 175, t. 17, f. 6.
Burm. Handb. V, 438.
Künck. l.c. t. 21 f. 10

* Blanch. Hist. nat. I, 268, t. 8, f. 2-3

Passalini.

Taeniocerus Kaup 1871

Deyrollei Kaup [Aulacocyclus] Col. Heft III, 1868, 7. (Réunion. Kuw. D.E.Z. 1891, 170. St Denis. neuholland. sic!

Solenocyclus Kaup 1868.

exaratus Klug. [Passalus] Ins. Madag. 1833, 173.
Mannerh. B.M. 1838, I, 65.
Burm. Handb. V, 472.
Perch. Mon. Suppl. I, 16
Kaup Col. Heft III, 1868,
id. Mon. 1871, 25
Künck. Hist. Madag. t. 21, f. 13.
Kuw. D.E.Z. 1891. 185.
= Manouffi Perch. Mon. 62, t. 4, f. 7.

Erionomus Kaup 1868.

Studti Kuw. D.E.Z. 1890, 103.
do 1891, 176

Semicyclus Kaup 1871.

Grayi Kaup, Mon. 1871, 28 (incertae sedis. Madagascar
ferecinctus Kuw. D.E.Z. 1891, 177 Kuwert. D.E.Z. 1891, 177.

Ciceronius Kaup 1871

antanarivae Kuw. D.E.Z. 1891. 183.

morbillosus Klug [Passalus] Ins. Madag. 175.
Perch. Suppl. I, 18, t. 77, f. 6.
Künck. l.c. t. 21, f. 11.
Kuw. l.c. 1891, 183,

paucipunctus Kuw. D.E.Z. 1890, 101.
do 1891 183

Schroederi Kuw. l.c. 1890 102.
l.c. 1891. 183,

Sinuosus Kuw. l.c. 1891. 183.

Leptaulax Kaup 1868.

= Vitellinus Kuw. 1891.

approximatus Klug. [Passalus] Ins. Madag. 174.
Perch. Mon. Suppl. I, 16, t. 77, f. 2.
Künck. l.c. t. 21, f. 12.
Kuw. D.E.Z. 1891, 191,

breviceps Kuw. l.c. 1891. 191,

Madagassus Kuw. l.c. 1891, 191.

pullus Kuw. l.c. 1891. 191.

elevaticornis Kuw. l.c. 1891. 183.

Flaminius Kuw. 1891.

Nonfriedi Kuw. D.E.Z. 1891, 185

Didimoides Kuw 1891.

honoratus Kuw. D.E.Z. 1891. 191.

SCARABAEIDAE

Coprini.

Scarabaeus Linné

Radama Fairm. Ann. Belg. 1895, 12.
Künck Hist. Madag. t. 17, f 1. [ateuchus].

Epilissus Reiche 1841.

æneus Künck. l.c. t. 18, f 12.

ater Sap.-Cast. Hist. Nat. II, 1840, 67.

bimaculatus Künck l.c. t. 18, f 17.

brunnipes Sap.-Cast. l.c. 67.

clypeatus Sap.-Cast. l.c. 67.

= *depressus* Dupont Dej. Cat. 3.ed. 151.

cupraricus Fairm. Ann. Belg. 1889, C.R. VII.

cyanescens Brancsik Jahr. Erencsén, 1893, 222, t. 12, f. 10, b.

dilaticollis Fairm. l.c. VI.

fulgens Künck. l.c. t. 18, f. 10.

fuscovirens Fairm. l.c. VII.

globulosus Künck. l.c. t. 18, f. 8.

Goudoti Sap.-Cast. l.c. 67.

= *Duponti* Dej. Cat. 3.ed. 151

histeroides Sap.-Cast. l.c. 67.
Künck. l.c. t. 18, f. 7.

ova Künck l.c. t. 18, f. 1.

madagascariensis Künck. l.c. t. 18, f. 11.

minutus Sap.-Cast. l.c. 67.
Künck. l.c. t. 18, f. 9.

morio Harold Col. Heft. XVI, 1879, 225.
cf. Brancsik Jahr. Erencsén 1893

nitidus Sap.-Cast. l.c. 67.
Westw. Tr. E. Soc. 1847. 228, t. 16, f 2.
Künck. l.c. t. 22, f. 2.

parasinus Klug. [Canthon] Ins Madag. 161.
Westw. l.c. 227, t. 16, f. 1.
Lacord. Gen. Atl. t. 26, f. 4.
Künck. l.c. t. 18, f. 16.

= *Klugi* Dej. Cat 3.ed. 151.

pygmaeus Sap.-Cast. l.c. 67.
Westw. l.c. 228, t. 16, f. 3.
Künck. l.c. t. 18, f. 14.

rubromaculatus Künck Hist. Madag. t. 18 f. 5.

saprinoides Fairm. An. Belg. 1889, CR. VII.
Brancsik. Jahr. Erencsén 1893, (Rossi 6e.
t. 12, f. 10, a.

splendens Künck. l.c. t. 18, f. 18.

splendidus Fairm. l.c. VI.

striatus Sap.-Cast. Hist. Nat. II, 67.
Künck. l.c. t. 18, f. 13.

vicinus Sap.-Cast. l.c. 67.
Kunck. l.c. t. 18, f. 6.

viridis Guér. Ic. r. anim. t. 21, f. 3.
Gray Griff. Anim. Kingd: I, t. 45 f. 4.
Fair. Dej Cat. 3e ed. 152,
Künck. l.c. t. 18, f. 2.
= Latreillei Dej. Cat. l.c.
= prasinus ♀ Klug. Ins Madag. 161.

violaceus Künck. l.c. t. 22, f. 1.

Copris Geoffroy 1762.

diversus C. Waterh. A. M. N. H. (6) VII, 1891, 518.

Aulonocnemis Klug 1838.

anobioides Har. Col. Heft V, 1869, 96.
Fairm. Ann. Fr. 1886, 33.

casalis C. Schauf. Hung. Ot. III, 1890, 616.

crassecostata Fairm. An. Fr. 1886, 32, t. 2, f. 3.

exarata Klug Wiegm. Arch. 1838, I, 72.

irregularis Har. Col. Heft V, 1869, 97.
Fairm. Ann. Fr. 1886, 33.

laevis C. Schauf. l.c. 610.

nitida C. Schauf. l.c. 613.

opatrina Klug. Wiegm. Arch. 1838, 72.
Fairm. Ann. Fr. 1886, 32.

sellata C. Schauf. l.c. 618.

tenuis C. Schauf. l.c. 617.

thoracica C. Schauf. l.c. 619.

valida C. Schauf. l.c. 616.

vulgaris C. Schauf. Ent. Nachr. 1891, 111.

Onthophagus seu Oniticellus

amplicollis Har. Mitth. Münch. Ver. 1880, 155.
Fairm. Ann. Belg. 1895, 15.

auratus (Künck. Hist. Madag. t. 17, f. 7, an auratus F. de Guinée ?).

caeruleus Künck l.c. t. 17, f. 13.

Clouei Har. Col. Heft. V, 1869, 68
Fairm. Ann. Belg. 1895, 13.
Künck l.c. t. 17, f. 17.

elegans Klug. Ins. Madag. 1833, 163.
Künck. l.c. t. 17, f. 2, 3.

fissicollis Fairm. Ann. Belg. 1895, 14.

gazella F. ex syn. (Cat. Gem. Har. IV, 1029) (Sénégal, etc.

gibbicollis Fairm. Ann. Belg. 1895, 16.

giganteus Har. Col. Heft. V, 1869, 68.
Fairm. Ann. Belg. 1895, 13.

hinnulus Klug, Ins Madag. 1833, 163.
Künck. l.c. t. 17, f. 2, 3.

= Goudoti dej. Cat. 3ed. 158.

Maitso Künck. l.c. t. 17, f. 5, 6.

Marsyas ol. Ent. I, 3, p. 140, t. 21, f. 192, ♂.
Har. Col. Heft. V, 1869, 68.
Fairm. Ann. Belg. 1895, 13.
Künck. l.c. t. 17. f. 10, 11, 12. [erratim ?].

pictus Künck. l.c. t. 17, f. 9.

Pipitzi Ancey, Nat. Sicil. II, 72.

quadripunctatus ol. Ent. I, 3, p. 143, t. 2, f. 13.
Klug, Ins madag. 162
Künck. l.c. t. 17, f. 16.

semimetallicus Fairm. Le Nat. (2) II, 1888, 11, f. 2.
id. Ann. Belg. 1895, 14.

splendidicollis Fairm. Ann. Fr. 1893, Bull. CCXCI
id. ann. Belg. 1895, 13.

subretusus Fairm. Ann. Belg. 1895, 14.

sumptuosus Har. Col. Heft XI, 1873, 104.

undatus Ol. Ent. I, 3, p. 141, t. 21, f 194
Klug. Ins. madag. 162.
Guér R. M. Z. IX, 1833, t. 67.
Künck. Hist. Madag. t. 17, f. 14, 15.

variegatus (Künck. l.c. t. 17, f 8; an variegatus Roth. d'Abyssinie ?).—

Aphodiini.

Aphodius Illiger 1798.

granarius L. (et syn.) (Cosmopolite.

impurus Roth. Wiegm. Arch. 1851, I, 131.
Bohem. Ins. Caffr. II, 332.
Har. B. E. Z. 1862, 152

= anthracinus Sturm, Cat. 1843, 110

= melas Dej. Cat. 3e ed. 162.

= picipes Klug, Mon. Berl. Ac. 1855, 556
id. Peters Reise 1862, 244.

lividus Ol. (et syn.)
> Fairm. ann. Fr. Bull. 1893, CCCXXII (Séchelles.

Le signe > indique une simple indication de localité.

Inoestus F. Syst. El. I, 78. (Afr. australe
Bohem. Ins. Caffr. II, 351
Künck l.c. t. 22, f. 3.

= madagascariensis Har. B. E. Z. 1859, 208 (Madag.
id. l.c. 1861, 114.
Dej. Cat. 3e ed. 161.

= mutans Walk. A. M. N. H. (3) II, 1858, 207 (Ceylan.

nigrita F. Syst. El. I, 73. (Madag.
Klug. Ins. Madag. 164.

= tenebrosus Dej. Cat. 3e ed. 162. (Maurice

Ataenius Harold 1867.

Pleuropborus Mulsant

caesus Panz. (et Syn.) (Cosmopol.
> Fairm. Ann. Fr. 1886, 34 (Madag. ×

Rhyssemus Mulsant 1842.

germanus L. (et Syn.)
= asper F. > Fairm. Ann. Fr. 1886, 34 (Madag. ×

Goudoti Har. Col. Heft. ~~XIII~~ IV, 1868, 85
Fairm. Ann. Fr. 1886, 33.

madagassus Har. Col. Heft. XVI, 1879, 228.
Fairm. Ann Fr. 1886, 33.

?= Goudoti (fec. Bates)

polycolpus Fairm. Ann. Fr. 1886, 34.

tarsalis C. Waterh. A. M. N. H. (4) XVIII, 1876, 115
id. Phil. Trans. R. Soc. CLXVIII, 1879, 524
(Rodrigue

Psammodes Saporta-Castelnau
(= Psammobius Heer 1841).

c'est un Ataenius.

laticeps Fairm. Ann. Fr. 1871, 34.
Künck. Hist. Madag. Col. t. 22, f 4.

Rhyparus Westwood 1847.

Desjardinsi Westw. Tr. Ent. Soc. 1847, 241, t. 17, f. 5.
Cog. Ann. Fr. 1866, 329.
Dej. Cat. 3ed. 160. (Maurice

Hybosorini

Drepanognathus Laus.

falciger Laus. Nov. Leyd. Mus. 1886, 93

Orphnus MacLeay 1819.

Coquereli Fairm. Ann. Fr. 1868, 784.
Künck. l.c. t. 22, f. 7. 8.
Brancsik Jahr. Erencsén 1893, 223.

Goudoti Künck. l.c. t. 22, f. 9. 10.

Le signe × indique que l'insecte a été introduit.

Hildebrandti Fairm. Ann. Fr. 1883, 365

* *hova* Fairm. Ann. Fr. 1868, 783
Brancsik Jahr Erencsén 1893, 224

v. *fuscipennis* Brancsik l.c. (hossi-bé

madecassus Künck. Hist. Madag. Col. t. 22, f. 11.

nigrita Brancsik l.c. 224. (Nossi-bé.

Nitidulus Guér. Ic. 86
Westw. Tr. Ent. Soc. IV. 1846, 172, t. 12, f. 4.
Sap.-Cast. Hist. Nat. II, 108.
Dufour Dej. Cat. 3e ed. 166

obsoletus Brancsik, l.c. 223 (Nossibé

* *owas* Westw. Tr. Ent. Soc. 1852, 74 t 9 f 9.

Ochodaeus Serville 1825.

cannellinus Fairm. Ann. Fr. 1868, 781.
Künck. Hist. Madag. Col. t. 22, f. 13.

infuscatus Fairm. Ann. Fr. 1868, 785

maxillosus Fairm. Ann. Fr. 1868, 786
Künck. l.c. t. 22, f. 12.

miliaris Klug, Ins. Madag. 164.
Fairm. Ann. Fr. 1868, 784.

Hybosorus Mac Leay 1819.

baliensis Brancsik, Jahr. Erencsén 1893, 225, t. 12 f. 14, a, b.
Fairm. Ann. Belg. 1895, 16.

Illigeri Reiche = *arator* Ill. (et syn.)
v. *nossibianus* Fairm. Ann. Belg. 1895, 17.

laeviceps Fairm. Ann. Belg. 1893, 229.
(Mayotte-

tenuepunctatus Fairm. Ann. Belg. 1895, 17

Phaeochrous Laporte-Castelnau 1840.

madagascariensis Westw. Tr. Ent. Soc. 1846, 161.
Künck. l.c. t. 16, f. 14.

Trogini

Trox Fabricius 1792.

madagascariensis Fairm. Ann. Fr. 1871, 34
Künck., Hist. Madag. Col. t. 22, f. 15.
(Est une variété de Sgualidus ol.
sec. Harold, Col. Heft. 1872, (Mon.) 107.

Synarmostes Germar 1843.

humilis Fairm. Ann. Belg. 1893, 530.
(Mayotte—

latericostatus Fairm. Ann. Fr. 1884, 237.

scabrosus Lap. Cast. Hist. Nat. II, 109
Germ. Zeitschr. IV, 1843, 128.
Har. Col. Heft. XII, 41.

tibialis Klug, [Acanthocerus] Ins Madag. 1833, 164
Germ. l.c. 127. t. 1, f. 9.
Har. l.c. 41.

Dynastini.

Hexodon Olivier 1789.

Hopei (Kollar (vide infra).
Künck. Hist. Madag. t. 20, f. 13.

Montandoni Buquet, R.Z. 1840, 212
id. R.M.Z. 1840, t. 62.
Burm. Handb. V, 25
Künck, l.c. t. 20, f. 14.

reticulatum ol. Ent. I, 7. p. 4, t. 1, f. 1, a-c.
Guér. Ic. t. 23, f. 6.
Burm. Handb. V, 26

rotundatum Künck. l.c. t. 20, f. 11.

unicolor ol. Ent. I, 7, p. 4, t. 1, f. 2.
Herbst, Käf. VII, 323, t. 117, f. 2.
Burm. Handb. V, 26.
Künck. l.c. t. 20, f. 12.

(= Hopei Kollar, Ann. Mus. Wien I 336, t. 31, f. 5 Maurice (an. sp. dist. sec Künck?)
= Kirbyi Hope Col. Man. I, 57.
Burm. Handb. V, 27.

Anodon Fairmaire 1871

Coquereli Fairm. Ann. Fr. 1871, 36.

Heteronychus Burmeister 1847

adolescens Brancsik Jahr. Erencsén 1893, 230, t. 10, f. 9, d.

clypealis Fairm. Ann. Belg. 1893, 530. (Gd Comore.

digitatus Brancsik l.c. 230.

minutus Burm. Handb. V, 95
Fairm. Ann. Fr. 1871, 35.

nanus Brancsik, l.c. 231

parvus Burm. Handb. V, 95.
Fairm. Ann Fr. 1871, 35.

plebejus Klug [Geotrupes] Ins. Madag. 166.
Burm. Handb. V, 96.
Fairm. Ann. Fr. 1871, 35.
Künck Hist. Madag. Col. t. 20, f. 7.

v. lucubensis Brancsik l.c. 229.

rugifrons Fairm. Ann Fr. 1871, 36.

rusticus Klug, [Geotrupes] Ins. Madag, 166.
Burm. Handb. V, 96.
Fairm. Ann. Fr. 1871, 36.
Künck. l.c. t. 20, f. 8.

Lonchotus Burmeister 1847.

crassus Klug, [Geotrupes] Ins Madag. 79.
Burm. Handb. V, 173.
Fairm. Ann. Fr. 1871, 38.
Künck. l.c. t. 20, f 5–6.

lentus Burm. l.c. 174.
Fairm. l.c. 38.

muticus Burm. l.c. 174
Fairm. l.c. 38.
Künck. t. 16. f. 15.

Parisomorphus C. Schaufuss 1890

hilaris C. Schauf. Nunq. Ot. III, 1890, 607.

Mavronus Coquerel 1866

borbonicus Cog. Ann. Fr. 1866, 337, t.7, f.2.
/Réunion.

Temnorrhynchus Hope 1837

Coquereli Fairm. Ann. Fr. 1868, 796.

Fairmairei Künck. Hist. Madag. Col. t.21, f.3.
Brancsik Jahr. Erencsén 1893, 232.

galeatus Künck. l.c. t.20, f.4.

truncatus Klug Ins. Madag. 1833 165.

Oryctes Illiger

Augias Ol. Ent. I, 3, p.36, t.24, f.212.
Burm. Handb. V, 197.
Künck. l.c. t.19, f 9-10.

= madagascaricus Lap-Cast. Hist. Nat. II, 114.

colonicus Cog. Ann. Fr. 1892, 371, t.10, f.6.
Künck. l.c. t.20, f. 1-2.

comoriensis Fairm. Ann. Belg. 1893, 531. /Mayotte.

insularis Cog. Ann. Fr. 1892, 372, t.10, f.5.
id. l.c. 1866, 333.

LibeKabeka Künck. l.c. t.20, f.3.

minor C. Waterh. A.m.n.H. (4) XVIII, 1876, 115
id. Phil. Tr. R. Soc. CLXVIII, 1879, 525 /Rodrigue

Pyrrhus Burm. Handb. V, 197.
Dej. Cat. 3e ed. 166.
Künck. l.c. t. 19, f. 1-2.

= Radama Cog. Ann. Fr. 1892, 366, t.10, f 1-2. nom bé.

Ranavalo Cog. Ann. Fr. 1892, 368, t.10, f.3.
Künck. l.c. t. 19, f. 5,6.

Simiar Cog. Ann. Fr. 1892, 369, t.10, f.4.
= id. l.c. 1885, 174, t.10, f.1.

vestor = Vinsoni
Dejean

Tarandus Ol. Ent. I, 3, p. 39, t 8 f 69; t.21, f 69. bx 2 figures dont bien Tarandus.
Burm. Handb. V, 195.

= Chevrolati Guér. Ic. R. anim. 85, t.23, f 1

= Paniscus Dej. Cat. 3e ed. 167.

= ♀ Stentor F. Syst. El. I, 15.

Vinsoni Deyr. in Maillard, Not. Réun. II, 2 t 2 f 1.
/Réunion.

Trionychus Burmeister 1847.

foveiceps Fairm. Ann. Belg. 1893, 530 (Gde Comore

mainty Künck Hist. Madag. t. 20, f. 9-10.

Melolonthini

Monochelus Serville 1825

contractus Klug, [Monocheles] Ins. Madag. 1833, 171

Hopliopsis Blanchard 1850.

fulvovestita Blanch. Cat. Mus. 69.
Künck. l.c. t. 15 f. 2.

Hopleidos (sic) Kunckel i.f.

lineopictus Künck. l.c. t. 15, f. 1.

Hoplia Illiger 1803.

adspersa Klug. Ins. Madag. 1833, 170.

bicallosa Blanch. Cat. Mus. 1850, 70.
Künck. l.c. t 13, f 5.

bicolor Fairm. Ann. Fr. 1886, 35
Künck. l.c. t. 13, f. 2.

cornuta Nonfried Ent. Nachr. 1892, 109.

cribrella Klug. Ins. Madag. 171
(erratim. cribella in Cat. Mün.)
Künck. l.c. t. 13, f. 4 (erratim ciribrella).

debilis Burm. Handb. IV, 1 p., 195.
Künck. l.c. t. 13, f. 10.

= elegantula Dupont Dej. Cat. 3e ed. 184.

fasciculata Blanch. Cat. Mus. 1850, 70.
Künck. l.c. t. 13. f. 14

fasciculata Nonfried Ent. Nachr. 1892, 108.

fulva Blanch. Cat. Mus. 1850, 70
Künck. l.c. t. 14, f. 1.

gemmata Klug, Ins. Madag. 170, t. 3, f. 10.
Burm. Handb. IV, 1:p., 200.
Künck. Hist. Madag. Col. t. 13, f. 9.

riseobirta Fairm. Ann. Fr. 1886, 34.

hova Künck. l.c. t. 13, f. 7.
id. l.c. t. 16, f. 16 (an sp. dist. ?).

irrorata Blanch. Cat. Mus. 1850, 71.

lactea Künck. l.c. t. 14, f. 3.

luctuosa Blanch. l.c. 70.
Künck. l.c. t. 14, f. 2.

nadecassa Künck. l.c. t. 16, f. 17.

nargaritacea Künck. l.c. t. 14, f. 7.

narmorea Künck. l.c. t. 13, f. 1.

norio Burm. Handb. IV, 1:p., 186.

nigra Künck. l.c. t. 14, f. 5.

nigrescens Blanch. l.c. 70.
Künck. l.c. t. 13, f. 8.

nodipennis Künck. l.c. t. 13, f. 11.

nulata Fairm. Ann. Fr. 1886, 35.
Künck. l.c. t. 13, f. 12.

ornata Nonfried D.E.Z. 1891, 359 (Madag. ?—

pilosa Blanch. l.c. 71.
Künck. l.c. t. 13, f. 3.

retusa Klug, Ins. Madag. 170, t. 3, f. 9.
Burm. Handb. IV, 1:p., 199.
Künck. l.c. t. 14, f. 8.

= orientalis Dej. Cat. 3:ed, 185.

sinuata Künck. l.c. t. 14, f. 6

squarrosa Burm. Handb. IV, 1:p, 197.

striata Künck. l.c. t. 14, f. 4.

tuberculata Blanch. l.c. 71
Künck. l.c. t. 13, f. 13.

umbrina Fairm. Ann. Fr. 1886, 34.

Dicentrines Burmeister 1844.

femoralis Blanch. Cat. Mus. 1850, 69.
Künck. Hist. Madag. Col. t. 13, f. 16.

lineatocollis Burm. Handb. IV, 1:p, 177.
Dej. Cat. 3:ed. 184.
Künck. l.c. t. 14, f. 9.

lineatus Blanch. l.c. 70.
Künck. l.c. t. 14, f. 10.

pallidulus Burm. l.c. 177.

pumilus Klug. [Heptia] Ins. Madag. 1833, 171.
Burm. Handb. l.c. 176.
Künck. l.c. t. 13, f. 15.
= madagascariensis Dej. Cat. 3:ed. 184.

Microplus Burmeister 1844.

brevis Blanch. Cat. Mus. 1850, 69.
Künck. l.c. t. 14, f. 16.

castaneus Blanch. l.c. 69.
Künck. l.c. t. 14, f. 13.

cinerascens Blanch. l.c. 69.
Künck. l.c. t. 14, f. 12.

insignicollis Burm. Handb. IV, 1:p, 175
Dup. Dej. Cat. 3:ed, 184.
Künck. l.c. t. 14, f. 11.

rugosus Blanch. l.c. 69.
Künck. l.c. t. 14, f. 15.

strigatus Burm. l.c. 175.

vittatus Burm. l.c. 175
Dup. l.c. 184.
Künck. l.c. t. 14, f. 14.

Pleophylla Erichson 1847.

Brenskei Brancsik Jahr. Trencsén, 1893, 225.

unicolor Snell.-Voll. Rech. faune Madag. 1869, 8, t. 1, f. 3.

Empbania Erichson 1847

metallica Blanch. [Heptomera] l.c. 89.
Künck. l.c. t. 12, f. 1, 2.
= chloris Burm. Handb. IV, 2:p., 180.

Serica Mac Leay 1819.

affinis Blanch. Cat. Mus. 1850, 80
Künck. Hist. madag. Col. t. 15, f. 18.

Blanchardi Brenske

carinata Burm. Handb. IV, 2.p., 175.

castanea Blanch. l.c. 81.
Künck. l.c. t. 15, f. 3.

cinnamomea Klug Ins. Madag. 168.
Künck. l.c. t. 15, f. 8.

conspurcata Blanch. l.c. 81.
Künck. l.c. t. 15, f. 14.

cruciata Burm. Handb. IV, 2.p, 173.

caliginosa Blanch. l.c. 81.
Künck. l.c. t. 15, f. 9.

deminata Klug Ins. Madag. 169.
Künck. l.c. t. 15, f. 17.

granulosa Blanch. l.c. 77.

grossa Blanch. l.c. 80.
Künck. l.c. t. 15, f. 11

irrorata Blanch. l.c. 80.
Künck. l.c. t. 15, f. 6.

laevigata Künck. l.c. t. 15, f. 12.

lucidula Blanch. l.c. 80
Künck. l.c. t. 15, f. 7.

maculata Künck. l.c. t. 15, f 15

micans Künck. l.c. t. 15, f. 16.

Moreli Cog. Ann Fr. 1866, 330. (Réunion.

mutans Blanch. l.c. 80.
Künck. l.c. t. 15, f. 10.

mucea Fairm. Ann. Fr. 1868, 36.

nisiformis Burm. Handb. IV, 2.p, 171.

pumila Burm. l.c. 173.

rufina Burm. l.c. 175

semicribrosa Fairm. Ann. Fr. 1868, 36.

setosicollis Blanch. Cat. Mus. 1850, 81.
Künck. Hist. madag. Col. t. 15, f. 5.

setosipennis Blanch. l.c. 81
Künck. l.c. t 15, f. 4.

= *crinita* Burm. Handb. IV, 2. p, 174.
Dupont, Dej. Cat. 3:d. 182.

simillima Brenske

splendens Harold Col. Heft. V, 1869.

= *micans* ‖ Klug. (rec. F.) Ins madag, 169.
Burm. l.c. 174.

tessellata Klug, Ins. madag. 169
Künck. l.c. t. 15 f 13 (errätim tesellata).

truncata Brenske

umbrosa Fairm. Ann. Fr. 1868, 787.

Crochalus Laporte-Castelnau 1832.

maculifrons Fairm. Ann. Fr. 1886, 35.

Homaloplia Stephens 1830.

gracilis Künck. l.c. t. 16, f. 19.
laevigata Künck. l.c. t. 16, f. 20.
unicolor Künck. l.c. t. 16, f. 21.
virescens Künck. l.c. t. 16, f. 18.

Ablabera Erichson 1847.

aeneobrunnea Fairm. Ann. Fr. 1886, 37.
gracilis Fairm. l.c. 1868, 789.
iridescens Fairm. l.c. 1886, 37.
laevigata Fairm. l.c. 1868, 788.

Eutrichesis Waterhouse 1882 (Tr. Ent. Soc. 499)

Rhizotroginae-

pilosicollis Waterh. Tr. Ent. Soc. 1882, ~~XXXX~~ 501.
placidus Waterh. l.c. 501
punctatus Waterh. l.c. 500.

Schizonycha Blanchard 1845

glabra Brenske Soc. Entom. V, 1890, 34

ova Cog. R.Z. 1851, 88.

Encya Blanchard 1845

albostriata Brenske Soc. Entom. VI, 1891, 97.

apicalis Blanch. Cat. Mus. 1850, 154
Burm. Handb. IV, 2.p., 277.
Künck. Hist. Madag. Col. t. 10, f. 4.

= quadrisignata Dup. Doj. Cat. 3.ed. 177.

betanimena Künck. l.c. t. 10, f. 3.

bisignata Blanch. l.c. 154.
Burm. l.c. 277.
Künck. l.c. t. 10, f. 2.

calva Waterh. Tr. Ent. Soc. 1882, 495

Commersoni Ol. Ent. I, 5, p. 11, t. 4, f. 40.
Künck. l.c. t. 10, f. 1.

condensata Gerst. in Mus. Berol.

= Commersoni Burm. l.c. 277.

cribrata Waterh. Tr. Ent. Soc. 1882, 499

dubia Künck. l.c. t. 11, f. 4.

gutticollis Waterh. Tr. Ent. Soc. 1882, 496.

inornata Burm. l.c. 279.

invulnerata Waterh. Tr. Ent. Soc. 1882, 497

mucronata Klug. [Melolontha] Ins. Madag. 167.
Künck. l.c. t. 10, f. 6.

nebulosa Kunck. l.c. t. 11, f. 1.

ornatipennis Blanch. l.c. 155
Burm. l.c. 278.
Künck. l.c. t. 11, f. 2.

pilosa Brenske. Soc. Entom. VI, 1891, 97.

pyriformis Waterh. Tr. Ent. Soc. 1882, 496.

Sikorai Brenske, l.c. 97.

strigiscutata Fairm. Pet nat. 1888, 364.
id. St. Ent. Zeit. XLV, 1884, 131.

subrufida Blanch. l.c. 154

variegata Waterh. Tr. Ent. Soc. 1882, 498.

variipennis Blanch. l.c. 155.
Künck. l.c. t. 10, f. 5.

Pour les espèces figurées par Künckel, cf. Brenske, Soc. Entom. VI, 1891, 97 et suiv.

Rhizotrogina cf. Waterh.

Asaphomorpha Brancsik 1893

nigra Bonfried [Encya] B. E. Z. 1891,
Künck. [Encya] Hist. Madag. Col. t. 11, f. 3.
Brancsik, Jahr. Troncsén, 1893, 328. t. 10, f. 14.

= [illegible]

Enaria Erichson 1847.

Rhizotroginae-
cf. G. Waterh. Tr. Ent. Soc. 1882, 493.

× conspurcata Klug [Melolontha] Ins. Madag. 168, t. 3, f. 8. [= Empecta cinerea Blanch. sec. Brenske

depressiuscula Waterh. Tr. Ent. Soc. 1882, 495.

latifrons Waterh. l.c. 494

marginata Waterh. l.c. 494

melanictera Klug. [Melolontha]
Künck. l.c. t. 12, f. 3.

rufofulva Fairm. Le Nat. 1880, 308.
id. Ann. Fr. 1880, 327. (Nossi Bé)

× antanala Künck. l.c. t 12, f. 4.

Empecta Erichson 1847

Pour les esp. figurées par Künckel,
cf. Brenske Sol. Entom. VI, 1891, 98.

~~cinerea Blanch. Cat. Mus. 1850, 154~~

Gambouei Bonfried Ent. Nachr. 1892, 107.

maculipennis Blanch. Cat. Mus. 1850, 153.
Burm. Handb. IV, 2. p, 287.
Künck. l.c. t. 11, f. 6.

marginalis Fairm. Ann. Belg. 1889, CR, VII.

~~obsoleta Blanch. l.c. 153~~

pristinaria Burm. l.c. 287

squamifera Blanch. l.c. 153.
Künck. l.c. t. 16, f. 3.

= ancilla Burm. l.c. 287.

(Espèces appart.s au G. Enaria sec. Brenske)

cinerea Blanch. l.c. 154
Künck. l.c. t. 16, f. 5 } = Enaria conspurcata Klug. (Sec. Brenske).

gracilis Blanch. l.c. 153
Künck. l.c. t. 16, f. 4 } = Enaria conspurcata Klug. (Sec. Brenske).

Espèces rentrant dans le G. Hoplochelus (sec. Brenske)

betanimenoe Künck. Hist Madag. Col. t. 16, f. 6.

(=? *semirufa* Fairm. sec. Brenske).
pris Hoplochelus obesus.

cuprea Blanch. Cat. Mus. 1850, 153
Künck. l.c. t. 16, f. 2.

micantipennis Blanch. l.c. 154
Künck. l.c. t. 11, f. 5.

obsoleta Blanch. l.c. 153.
Künck. l.c. t. 16, f. 1.

piligera Blanch. l.c. 153.
Jacob. Gen. Atl. III, t. 31, f. 2.
Künck. l.c. t. 10, f. 7.

(= Hoplochelus obesus sec Brenske).

semirufa Fairm. St. E. Z. XLV, 1884, 274.

villosa Künck. l.c. t. 11, f. 7.

Pegylis Erichson 1847.

brevior Fairm. St. E. Z. XLV, 1884, 132.

Lepidiota Hope 1837

rygidialis Waterh. Er. Ent. Soc. 1882, ~~XXIII~~ 502.

Proagosternus Blanchard 1850.

antanala Künck. l.c. t. 10, f. 10.

lamellifer Künck. l.c. t. 11 f. 8

niveus Blanch. l.c. 156.
Künck. l.c. t. 10, f. 8.

= *Satreillei* Burm. Handb. IV, 2 p, 299.
Künck. l.c. t. 11, f. 9.

= *ochraceus* Blanch. l.c. 156
(Var.) Künck. l.c. t. 10, f 9.

_Melolonthinae cf. Waterh. Er. Ent. Soc. 1882, 499.

Erichsolepis Blanchard 1850.

cf. Waterh. Tr. Ent. Soc. 1882, 499.

lactea Gory, Silb. Rev. Ent. I, n°11, t 9.
Burm. Handb. IV, 2:p., 537.
Künck. Hist. Madag. Col. t. 11, f. 10.

niveopilosa Blanch. Cat. Coll. Mus. 1850, 156
Burm. l.c. 307.
Künck. l.c. t. 10, f. 11.

Lachnodera Erichson 1847

rufojubata Fairm. St. E.Z. XLV, 1884, 275.

Hoplochelus Blanchard 1850.

voir Empecta p. 89.

obesus Burm. l.c. 317

rhizotrogoides Blanch. l.c. 152
Burm. l.c. 318
Künck. l.c. t. 11, f. 11.

Lachnosterna Hope 1837.

Erreur probable ; genre Américain.

gradaria Ch. Waterh. A.M.N.H (4) XVIII, 1876, 115
id. Phil. Tr. R. Soc. CLXVIII, 1879, 524
(Rodrigue.

Rodriguezi Ch. Waterh. A.M.N.H. l.c. 115
id. Phil. Tr. l.c. 524, t. 53, f. 6.
(Rodrigue.

Anoxia Saporta-Castelnau 1832.

africana Sap.-Cast. Ann. Fr. 1832, 408.
Burm. Handb. IV, 2:p., 424 note 2.
(Maurice.

Enthora Erichson 1847.

cf. Waterh. Tr. Ent. Soc. 1882, 499.

chlorodera Blanch. Cat. Coll. Mus. 1850, 152.
Künck. t. 11, f. 12.
id. t. 16, f. 11. (an sp. dist. ?)

ornata Ronfried D.E.Z. 1891, 267.

polita Waterh. Cist. Ent. II, 364.

Gymnogaster Blanchard 1850.

cuphthalma Blanch. Cat. coll. Mus. 1850, 155.
Burm. Handb. IV, 2.p., 423.
Dej. Cat. 3.ed. 176.
Jacob. Gen. Atl. IV, t. 31, f. 4.
/Réunion.

Pachycolus Erichson 1847

clypeatus Waterh. Cist. Ent. II, 364.

Dohrni Fairm. Ann. Fr. 1868, 788.
Künck. Hist. madag. Col. t. 16, f. 12. (scrip. Douini!)

madagascariensis Blanch. l.c. 155.
Burm. l.c. 461.

Perissosoma Ch. Waterhouse 1875

aenescens Ch. Waterh. A.M.N.H. (4) XV, 1875, 410
/Séchelles.

Rutelini.

Anomala Samouelle 1819.

Sieboldi Hope P.Z.S. II, 1839, 69.
id. A.M.N.H. (1) IV, 1840, 347
Burm. Handb. IV, 1.p., 277.

Parastasia Westwood 1841

Coquereli Fairm. Ann. Fr. 1868, 789 /Séchelles.
id. & Ann. Fr. 1893, Bull. CCCXXIII.

Trigonostomum* Burmeister 1844–

bivittatum Brell.-Voll. [Anomala] Rech. faun. Madag. 1869, 8, t 1, f. 4. —
Künck. [Trigonostoma] l.c. t. 16, f. 7

mucoreum Burm. Handb. IV, 1.p., 467.
Künck. l.c. t. 12, f. 5.

---

* Nota: Brenske, Soc. Entom. 1893, VIII, 1 divise le Adoretides de Madagascar en:
Trigonostomus Burm. — adoretus (Esp.-Cast) Burm. — Adorodocia n.g. — adoroleptus n.g. —
Prodoretus n.g.

Adoretus Laporte-Castelnau 1840.

aenescens Blanch. Cat. Coll. Mus. 1850, 230.
Künck. Hist. Madag. Col. t. 12, f. 6.

aeneus Brenske Soc. Entom. VIII, 1893, 10

albosetosus Waterh. Cist. Ent. II, 1878, 288.

= albohispidus Fairm. Le Nat. 1883, 364.
id. St. E.Z. XLV, 1884, 133.
cf. Brenske l.c. 2 note.

carinatus Künck. l.c. t. 12, f. 11.

convexipennis Blanch. l.c. 230.
Künck. l.c. t. 12, f. 12.

costalis Blanch. l.c. 231.
Künck. l.c. t 12, f. 9.

curtus Künck. l.c. t 12, f. 8.

elongatus Blanch. l.c. 231.
Künck. l.c. t. 12, f. 13.

fulvus Brenske Soc. Entom. VIII, 1893, 2.

giganteus Burm. Handb. IV, 1. p, 474.
Künck. l.c. t. 12, f. 14.

hystrix Künck. l.c. t. 16, f. 9.

indutus Burm. l.c. 469

lanatus F. Syst. El. II, 169.
Burm. l.c. 476. (Maurice.

laticeps Fähr. Bohem. Ins. Caffr. II, 69 Afr. or.
? > Brancsik, Jahr. Brencsén 1893, (nossi-bé.

latissimus Blanch. l.c. 230.
Künck, l.c. t. 12, f. 15.

maximus Brenske [Adorodocia] l.c. 1.

niger Brenske l.c. 9.

setifer Brenske l.c. 9.

Sikorai Bonfried, Ent. Nachr. 1892, 110.

strigatus Waterh. Cist. Ent. II, 1878, 287.
Künck l.c. t. 16, f. 8.

= villaticollis Fairm. Le Nat. 1883, 364.
id. St. Ent. Z. XLV, 1884, 132.
cf. Brenske l.c. 2, note.

tibialis Blanch. Cat. Coll. mus. 1850, 230.
Künck. Hist. Madag. Col. t. 12, f. 16.

umbrosus F. Ent. Syst. I, 2, 169. (Maurice.
Burm. Handb. IV, 2.p, 532.
Blanch. Voy. Pôle Sud. IV, 109

= *bufo* Dej. Cat. 3.ed. 174

(= *Cinerarius* Burm. (Senegal.
(= *hirtellus* Sap.-Cast id.
(= *luteipes* id. id.
(= *mutabilis* Homb. & Jacquin (Philippines)
V. *femoratus* Sap.-Cast. Hist. nat. II, 142 (Réunion.

?= *compressus* Weber Obs. Ent. 72 (Réunion an spec. distincta ?
Wiedem. Zool. Mag. II, 1, 95.
Burm. Handb. IV, 2.p, 532.

vagepunctatus Blanch. l.c. 230.
Künck. l.c. t. 12, f. 7.

villosus Blanch. l.c. 230
Künck. l.c. t. 12, f. 10.

vittatus Waterh. Cist. Ent. II, 287.
Künck. l.c. t. 16, f 10.
Brenske [Prodoretus] Soc. Entom. VIII, 1893, 10 an vittatus Brenske ? (ne cité pas Waterh.) —

Cyrtolophus Fairmaire 1895.

grandicornis Fairm. Ann. Belg. 1895, 17.

Cetoniini

Bothrorrhina Burmeister 1842.

ochreata Gory & Perch. [Goliath] Silb. Rev. Ent. III, 1835, 123.
Burm. Handb. III, 1842, 201
Künck. Hist. Madag. Col. t. 6, f. 10.

Radama Künck. Ann. Fr. 1887, Bull. XXVI.
id. Hist. Madag. t. 9, f. 2, 3.

reflexa Gory & Perch. [Goliath] Silb. Rev. Ent. l.c. 123 †
Burm. l.c. 201.
Westw. [Plaesiorrhina] Arcana I, 1845, 126, t. 32, f. 1, ♂.
Künck. l.c. t. 6, f. 8, 9. — id. t. 9, f. 1 (var).

† Toutes les autres espèces de ce mémoire sont décrites comme Cetonia. —

Heterosoma = Schaum 1844.

collaturn Gory & Perch. Silb. Rev. Ent. III, 1835, 125 ♂
Schaum Ann. Fr. 1844, 390.
Künck. [Parachilia] l.c. t. 3, f. 9.

= Guerini Westw. [Schizorrhina] Arcana I, 127, t. 32, f. 2. ♂
Künck. [Parachilia] l.c. t. 5, f. 5.

cf. ann. Fr. 1852 p. 379.

Elaphoides Schoch 1894

Sikorai Schoch, Mitth. Schw. Ent. Ges. 1894, (56)

(pagination de tirage à part, entre parenthèses)

Heteropbana Burmeister 1842

canaliculata Gory & Perch. Mon. 169. t. 29, f. 5
Burm. Handb. III, 602.
Künck. l.c. t. 7, f. 14, 15.

= soror Gory & Perch. Silb. Rev. Ent. III, 1835, 127.
= ♀ vittaticollis Dupont dej. Cat. 3ed. 192.
V. similis Gory & Perch. Silb. Rev. Ent. l.c. 127.

craticula Gory & Perch. l.c. 127
Künck. l.c. t. 7, f. 12, 13.

Deyrollei Künck. l.c. t. 7, f. 9.

fuscocostata Fairm. Le Nat. (2) II, 1888, 11, f. 3.

villosula Gory & Perch. Silb. Rev. l.c. 128.
Burm. Handb. III, 603.
Künck. l.c. t. 7, f. 10, 11.

Callipechis Burmeister 1842.

Clavipes Burm. Handb. III, 1842, 609.
Künck. Hist. Madag. Col. t. 7, f. 16.

Rhychocephala Fairmaire 1883.

Hildebrandti Fairm. Le Nat. 1883, 365. St. E. Z. XLV, 1884, 134
Künck. l.c. t. 9. f. 7.

Doryscelis Burmeister 1842

calcarata Klug Ins. Madag. 1833, 172, t. 3 f. 11, ♂.
Burm. l.c. 584.
Künck. l.c. t. 6, f. 7.

= ♀ inscripta Gory & Perch. Mon. 318, t. 62, f. 6
Latr. Dej. Cat. 3e éd. 189.

Humbloti R. Oberth. Ann. Fr. 1887, Bull. CCII
Fairm. Ann. Belg. 1893, 531. (Gde Comore.

Chromoptilia Westwood 1841.

diversipes Westw. Arcana I, 1841, 128, t. 32, f. 3.
Künck. l.c. t. 6, f. 6.

= fimbriata Burm. [Trichotarsia] Handb. III, 1842, 588.

Le nom de Genre Souligné indique qu'il est décrit à l'endroit indiqué pour l'espèce.

Stenotarsia Burmeister 1842.

crocata Gory & Perch. Silb. Rev. III, 129 ♂
Burm. Handb. III, 593.
Künck. l.c. t. 6, f. 1.
Kraatz Wien. E. Z. 1894, 162

= ♀ coccinea Gory & Perch. l.c. 129 ♀
Burm. l.c. 593.
Kraatz. l.c. 162.

d'après Janson.

marginicollis Kraatz W. E. Z. 1894, 163.

pelutina Gory & Perch. Silb. Rev. Ent. III, 129 ♂
Burm. l.c. 592.
Künck. l.c. t. 6, f. 2.
Kraatz. W. E. Z. 1894, 161 et 162.

v. bimaculata Kraatz. l.c. 161
v. quadrimaculata id. l.c.
v. thoracica id. l.c.
v. sexmaculata id. l.c.
v. basalis id. l.c. 162
v. atra id. l.c.

vermiculata Gory & Perch. Silb. Rev. Ent. III, 1835, 128.
Burm. Handb. III, 592.
Künck. Hist. Madag. Col. t. 5, f. 13.
Kraatz W. E. Z. 1894, 160.

(= ♂ corpulenta Coq. (vide infra) sec. Janson.

— . —

scapulata Coquerel R. Z. 1851, 87.
id. Ann. Fr. 1852, 375. — pl. 9 fig 7
Künck [Stenotarsia] l.c. t. 6, f. 3
Kraatz [Ischnotarsia] D. E. Z. 1880, 307.
= corpulata Coq. Ann. Fr. 1852, t. 9, f. 7. — sic! corpulata
ut erreur de graveur

Linotarsia Kraatz 1880

cf. Waterh. A. M. N. H. (5) XIV, 1884, 348.

Clytus Westw. [Gametis?] Tr. Ent. Soc. 1879, 206. t. 4, f. 5.

= picta Künck [Linotarsia] l.c. t. 9, f. 5.

discoidalis Waterh. [Stenotarsia] Ent. M. M. XV 1879, 84.
Künck. l.c. t. 9, f. 4.

picta Waterh. [Stenotarsia] A. M. N. H. (5) IV, 1879, 74.
Künck. l.c. t. 9, f. 5.

plagiata Waterh. [Stenotarsia (Linotarsia)] A. M. N. H. (5) IX, 1882, 323. —

plagiicollis Fairm. [Linotarsia] Ann. Fr. 1894, Bull. LXXXVII.

punctiventris Waterh. A. M. N. H. (5) XIV, 1884, 348.
Aid. t. 182, f. 2. [Stenotarsia] -

rotundicollis Fairm. [Linotarsia] Ann. Fr. 1894, LXXXVII

Scotti Janson Cist. Ent. II, 134, t. 1, f. 7.

Epistalagma Fairm. 1880

multi-impressa Fairm. Le Nat. 1880, 236
id. Ann. Fr. 1880, 329, t. 11, f. 4. (nossibé.

Liostraca Burmeister 1842.

cella Waterh. Ent. M. M. XV, 1879, 84.
Künck. Hist. Madag. Col. t. 9, f. 6.

cina Gory & Perch. Silb. R. Ent. III, 125.
Burm. Handb. III, 589.
Künck. l.c. t. 6, f. 5.

iota Gory & Perch. l.c. 125 ♀
Burm. l.c. 590.
Künck. l.c. t. 6, f. 4.

= elegantula Dupont Dej. Cat. 3. ed, 192.

rufoplagiata Westw. [Liostraca ?] Tr. Ent. Soc. 1879, 206, t. 4, f. 4.

Epixanthis Burmeister 1842.

maculitarsis Burm. Handb. III, 585,
Westw. Tr. Ent. Soc. 1879, 203, t. 3, f. 5.
Künck. l.c. t. 5, f. 11.

mediata Westw. [Glycyphana] Tr. Ent. Soc. 1874, 476, t. 7. f. 3.
(cité par erreur de Borneo.

nigripes Kraatz, Wien. Ent. Z. 1893, 155.

novempunctata Gory & Perch. Silb. Rer. Ent. III, 129.
Künck. l.c. t. 5, f. 12.

= noviespunctata Burm. Handb. III, 586.

octopunctata Kraatz [Parepixanthis] W. E. Z. XII, 1893, 234.

stella Gory & Perch. l.c. 130.
Burm. l.c. 587.
Künck. l.c. t. 5, f. 10.
Kraatz [Pseudepixanthis] D. E. Z. 1880, 309.

Euchilia Burmeister 1842

costifera Waterh. A.M.N.H. (5) IV, 1879, 75.
Künck. Hist. Madag. Col. t. 8, f. 8.

cupricollis Waterh. l.c. 76.
Künck. l.c. t. 9, f. 9.

picipes Waterh. l.c.
Künck. l.c. t. 8, f. 9.

puncticollis Waterh. Cist. Ent. II, 291.
Künck. l.c. t. 9, f. 8.

quadrata Gory & Percheron Silb. Rev. Ent. III, 135.
Burm. Handb. III, 1842, 556.
Künck. l.c. t. 5, f. 7.

= costifer Waterh. [Pygora] Cist. Ent. II, 1878, 293.
Kraatz [Cratomolops] D.E.Z. 1880, 311.
(sec. Waterh. cf. Heerv.-Pool. Notes Leyd. Mus. IX, 1887, 282.)

sulcata Ol. Ent. I, g. 6, 36, t. 5, f. 32.
F. Syst. El. II, 148 ..... (Brésil. erratim -
Gory & Perch. Mon. 170, t. 30, f. 2.
Burm. Handb. III, 555.
Künck. l.c. t. 5, f. 6.

tarsalis Waterh. A.M.N.H. 1879 (5) IV, 76.
Kraatz [Pareuchilia] D.E.Z. XXIV, 1880, 310.

Eucatheta Fairmaire 1894.

bicarinata Fairmaire Ann. Belg. 1894, 140.

Trachyblaenia Kraatz 1895.

Alluaudi Kraatz D.E.Z. 1895, 219.

Parachilia Burmeister 1842

bufo Gory & Perch. Sibb. Rev. Ent. III, 129.
Burm. Handb. III, 558.
Künck. Hist. Madag. Col. t. 5, f. 2.
Kraatz [Chilamblys] D.E.Z. XXIV, 1880, 307.

compacta Waterh. A.M.N.H. (5) V, 1880, 409.

Feroyi Cog. Ann. Fr. 1859, 240, t 7, f. 1.
Künck. l.c. t. 5, f. 1.

melanocala Burm. Handb. III, 1842, 557 ♀
Künck. l.c. t. 5, f. 3.

Polleni Snell.-Vall. Rech. faun. Madag. 1879, 9, t. 1, f. 5.

rubripes Künck. l.c. t. 5, f. 4.

testaceipes Fairm. Ann. Belg. 1895, 18.

Lophophora Kraatz 1895

probablement = Parachilia.

fasciculata Kraatz D.E.Z. 1895, 220.

rufipes Kraatz l.c.

Micropeltis Blanchard
Kraatz D.E.Z. 1880, 308.

angulata Gory & Perch. Sibb. Rev. Ent. III, 129.
Burm. Handb. III, 560. [anochilia].
Künck. l.c. t. 3, f. 13 [anochilia].

Anochilia Burmeister 1842.

beryllina Janson Cist. Ent. II, 605.

bicolor Künck. Hist. Madag. Col. t. 4. f. 10.

bifida Ol. [Cetonia] Ent. I, 6, p. 38, t. 2, f. 9. (Ind. or.
Gory & Perch. Mon. 159, t. 27, f. 4 [Schizor.] erratim.
Schaum Ann. Fr. 1844, 339 [Schizorrhina].
[Schizorrhina in Cat. Gemm. Har.]
Kraatz [Dysephicta] D. E. Z. 1880, 208. (Ind. or.

= republicana Coq. Ann. Fr. 1848, 277, t. 8, f. 2.
Künck. l. c. t. 6. f. 11, 12. — t. 9. f. 10, var.
Kraatz [Coquerelia] D. E. Z. 1880, 314
cf. Kraatz W. E. Z. 1893, 237.
cf. Kannegieter Notes Leyd. Mus. XIII, 1891, 196.

v. fuscipennis Kraatz D. E. Z. 1880, 314.

v. bisignata Kraatz D. E. Z. 1895, 222.

v. strigicollis Kraatz W. E. Z. 1893, 238.

v. brunneicollis Kraatz l. c.

v. rufo-testacea Kraatz l. c.

conjuncta Gory & Perch. Silb. Rev. Ent. III, 125.
Burm. Handb. III, 564.
Künck. l. c. t. 3, f. 11.

cultrata Gory & Perch. Silb. Rev. Ent. III, 128.
Burm. Handb. III, 564.
Künck. l. c. t. 4, f. 12.

erythroderes Schaum, Ann. Fr. 1844, 416.
Blanch. Cat. Coll. Ent. Mus. 1850, 11.
Künck. l. c. t. 7, f. 1, 2.

fascicularis Waterh. Cist. Ent. II, 293.

Flacourti Künck. Bull. Mus. 1895.

flavipennis Kraatz W. E. Z. 1893, 148.

v. trilineata Kraatz ?

v. marginicollis Kraatz D. E. Z. 1895, 222. note

v. flavicollis Kraatz l. c. 222, note

v. bilineata Kraatz ?

v. rufa Künck. Bull. Mus. 1895

Frobervillei Künck. Bull. Mus. 1895

herbacea Westw. Tr. Ent. Soc. 1879, 205, t. 4, f. 3.

hydrophiloides Westw. l. c. 205, t. 4, f. 2.

Schizorrh. ... Ann. Fr. 1852 p. 380 ...

ann Fr. 1852 p. 379.

s. le G. Cocquerelia [sic.] cf. Schoch. Mitth. Schw. Ent. Ges. 1894, 24.

incilis Janson Cist. Ent. II, 147.

laevigata Gory & Perch. Silb. Rev. Ent. III, 124.
Künck. Hist. madag. Col. t. 4 f. 3, 4, 5, 6, 7.

= variabilis Burm. Handb. III, 559.

= varians Dup. Dej. Cat. 3. ed. 190.

= marginicollis Westw. Tr. Ent. Soc. 1874, 479, t. 8, f. 7.

v. innotata Gory & Perch. Silb. Rev. Ent. III, 124.

v. plana Gory & Perch. l.c. 124.

lineata Künck. l.c. t. 8, f. 12.

nigriceps Waterh. Ent. M. Mag. XV, 1879. 85
Schoch. D.E.Z. 1894, 319.

picipes Kraatz D.E.Z. 1895, 221.

pratensis Gory & Perch. Silb. Rev. Ent. III, 128.
Burm. Handb. III, 562.
Künck. l.c. t. 4, f. 11.

princeps Burm. Handb. III, 560.
Künck. l.c. t. 4, f. 1.
Kraatz [Moriaphila] D.E.Z. 1880, 313.

punctatissima Gory-Perch. Silb. Rev. Ent. III, 128.
Burm. Handb. III, 566.
Künck. l.c. t. 5, f. 9.

rufipes Kraatz W.E.Z. 1893, 149.
Schoch. [Coquerelia] Mitth. Schw. Ent. Ges. 1894, 220.

v. plagiata Kraatz W.E.Z. 1893, 149.

v. dilutipennis Kraatz l.c. 149

v. signata Schoch. D.E.Z. 1894, 319.
id. Mitth. Schw. Ent. Ges. 1894, 24

v. bipunctata Schoch. D.E.Z. l.c. 319

v. ruficollis Kraatz, D.E.Z. 1895, 222

v. vitticollis Kraatz, l.c. 222.

v. vittipennis Kraatz, l.c. 222.

scapularis Gory & Perch. Silb. Rev. Ent. III, 124
Burm. Handb. III, 558.
Künck. Hist. Madag. Col. t. 4, f. 2.

= punctatissima Waterh. A. M. N. H. (5) IX, 1882, 323.

cf. Heerv. Pollt. Not. Leyd. Mus. IX, 1887, 282

stupida Gory & Perch. Silb. Rev. Ent. III, 128.
Burm. Handb. III, 561
Künck. l.c. t. 4, f. 8.

Kraatz [Hyphelithia] D.E.Z. 1880, 313.

villosula Künck. l.c. t. 4, f. 9.

Pygora Burmeister

albomaculata Kraatz W.E.Z. 1893, 151.

bella Waterh. A. M. N. H. (5) IV, 1879, 77.

[costifer Waterh. = Euchilia quadrata sec. Waterh. & Heerv.

Cowani Waterh. Ent. M. Mag. XV, 1879, 85.
Künck. [Euchilia] l.c. t. 8, f. 11.

hirsuta Waterh. A. M. N. H. (5) III, 1879, 78.

ignita Waterh. Pr. Ent. Soc. 1879, 204, t. 4, f. 1.

lenocinia Gory & Perch. Silb. Rev. Ent. III, 126.
Burm. Handb. III, 563.
Parry Tr. Ent. Soc. 1848, 82, t. 11, f. 8.
Künck. [Anochilia] l.c. t. 3, f. 10.

V. Brzozowski Nonfried Ent. Nachr. 1892, 120.

ornata Janson Cist. Ent. II, 135.

ornatissima Schoch. Mitth. Schweiz. Ges. 1894, 219.

pulchripes Waterh. Ent. Month. Mag. XV, 1879, 85.

puncticollis Waterh. A. M. N. H. (5) III, 1879, 77

Kraatz, [Stizopygora] D.E.Z. 1881, 79.

quatuordecim-guttata Kraatz W.E.Z. 1893, 150.

versicolor Waterh. A. M. N. H. (5) IV, 1879, 78.
Künck. l.c. t. 8, f. 13.

Bricoptis Burmeister 1842.

variolosa Gory & Perch. Mon. 166, t. 28, f. 7.
Burm. Handb. III, 583.
Künck. Hist. Madag. Col. t. 5, f. 8.

Dirrbina Burmeister 1842.

iris Gory & Perch. Silb. Rev. Ent. III, 124.
Burm. Handb. III, 568.

= platessa Dupont Dej. Cat. 3. ed. 190.

Pantolia Burmeister 1842

anthracina Brancsik Jahr. Trencsén. 1893, 232, t. 12. f. 15. (Mossi bé

brevicollis Waterh. A. M. N. H. (5) VI, 1880, 399.

cerina Schaum Ann. Fr. 1844, 415.
Kraatz [Percnobapta] D. E. Z. 1880, 319.

longata Brancsik l.c. 233, t. 12, f. 16. (Mossi bé

flavomarginata Gory & Perch. Mon. 168, t. 29, f. 1.
Burm. Handb. III, 569.
Fairm. Dej. Cat. 3. ed. 191.
Künck. l.c. t. 1, f. 12.

fulvofasciata Schaum Ann. Fr. 1844, 415.

infobasalis Waterh. A. M. N. H. (5) IV, 1879, 79.

isolita Waterh. Cist. Ent. II, 293.
id. A. M. N. H. (5) IV, 1879, 79.

Kraatz [Mesorrhaga] D. E. Z. 1880, 319.

capsha Gory & Perch. Silb. Rev. Ent. III, 124.
Burm. Handb. III, 568.
Künck. l.c. t. 4, f. 13.
Blanch. Kraatz [Tetraodorrbina] D. E. Z. 1880, 317.

striata Gory & Perch. Mon. 169, t. 29, f. 6.
Burm. Handb. III, 570.
Fairm. Dej. Cat. 3. ed. 190.
Künck. l.c. t. 2, f. 3.
Kraatz [Hemilia] D. E. Z. 1880, 316.

= sulcatula Dup. Dej. Cat. 3. ed. 190.

Mesorrhopa Kraatz

fasciata Kraatz

Coptomia Burmeister 1842.

apicalis Waterh. Ent. M. Mag. XV, 1878, 86.
Künck. Hist. Mdag. Col. t. 9, f. 15.

= iridoides Kraatz D.E.Z. 1883, 382.
cf. Neerv. Notes Leyd. Mus. IX, 1887, 282.

bipunctata Künck. l.c. t. 2, f. 9. = celata Waterh. ?

castanescens Kraatz D.E.Z. 1883, 382.

celata Waterh. A.M.N.H. (5) VI, 461, 1880.

costata Gory & Perch. Silb. Rev. Ent. III, 123.
Burm. Handb. III, 551.
Künck. l.c. t. 2, f. 7, 8.

crassa Waterh. A.M.N.H. (5) IV, 1879, 83.
Künck. l.c. t. 8, f. 7.

Chroms. [Adonides] Fe Nat. II, , 278.

crucigera Waterh. A.M.N.H. (5) IV, 1879. 82
Künck. l.c. t. 8, f. 3.

elegans Waterh. A.M.N.H. (5) IV, 1879, 79.
Künck. l.c. t. 9, f. 17.

Ellisi Künck. Bull. Mus. 1895,

fulgida Waterh. A.M.N.H. (5) IV, 1879, 80.
Künck. l.c. t. 8, f. 4.

granulata Burm. Handb. III, 551.
Künck. l.c. t. 3, f. 4.

= rugososulcata Blanch. Liste Cét. Mus. 9.

laevis Waterh. A.M.N.H. (5) IV, 1879, 82
Künck. l.c. t. 9, f. 12.

lucida Waterh. A.M.N.H. (5) IV, 1879, 80.
Künck. l.c. t. 8, f. 2.

marginata Waterh. A.M.N.H. (5) IV, 1879, 80.
Künck. l.c. t. 8, f. 5.

= mantis Kraatz [Pyrrhopoda] D.E.Z. 1880, 312. = cyanescens Kraatz [Pyrrhopoda] D.E.Z. 1880, 312.
cf. Neerv. Notes Leyd. Mus. IX, 1887, 282. cf. id. l.c.

 Heteroh.
mauritania Hope Gory.

mauritiana Gory & Perch. Mon. 170, t. 30, f. 1.
Burm. Handb. III, 550.
Künck. Hist. Madag. Col. t. 2, f. 10, 11, 12.

v. fasciata Gory & Perch. Silb. Rev. Ent. III, 123.

v flavolimbata Dej. i. l.

modesta Waterh. A. M. N. H. (5) IV, 1879, 81.
id. l. c. (5) IX, 1882, 322. (Variétés).
Künck. l. c. t. 9, f. 14.

Kraatz W. E. Z. 1893, 235 [Pyrrhopoda]

v. plagiata Kraatz l. c. 236
v. basalis "
v. flavipennis "
v. quadrimaculata "
v. vittipennis 237
v. strigipennis "
v. cyanea "
v. marginipennis "
v. caeruleostriata "
v. sellata "
v. obscurata "
v. marginicollis "

mutabilis Waterh. A. M. N. H. (5) II, 1878, 139.
Künck. l. c. t. 9, f. 13.

nigriceps Waterh. Ent. M. Mag. XV, 1878, 85.
Künck. l. c. t. 8, f. 1.

olivacea Waterh. A. M. N. H. (5) IX, 1882, 322.

Olivieri Künck Bull. Mus. 1895.

opalina Gory & Perch. Mon. 1833, 255, t. 48, f. 5
Burm. Handb. III, 552.
Waterh. A. M. N. H. (5) II, 1878, 138.
aid. t. 18.
Künck. Hist. Madag. Col. t. 3, f. 1.

prasina Burm. Handb. III, 551.

propinqua Waterh. Ent. M. Mag. XV, 1878, 86.

quadrimaculata Waterh. l. c. 86.

rufovaria Waterh. Tr. Ent. Soc. 1880, 60.
= Hildebrandti Kraatz D. E. Z. 1883, 381
cf. Neerv. Notes Leyd. Mus. IX, 1887, 282.

sericea Gory & Perch. Silb. Rev. Ent. III, 125.
Burm. Handb. III, 553.
Künck. Hist. Méday. Col. t. 3, f. 2.

sexmaculata Gory & Perch. Silb. Rev. Ent. III, 123.
Burm. Handb. III, 552.
Künck. l.c. t. 3, f. 3.

sexsulcata Kraatz [Eccoptomia] D.E.Z. 1880, 320.

tarsalis Künck. l.c. t. 8, f. 6.

uniformis Waterh. A. M. N. H. (5) IV, 1879, 82
Künck. l.c. t. 9. f. 16.

ventralis Janson Cist. Ent. III, 108.

villosula Janson l.c. 148. 138.

Pogonotarsus Burmeister 1842.

plumiger Gory & Perch. Silb. Rev. Ent. III, 124.
Burm. Handb. III, 548.
Westw. Arcana Ent. I, 137, t. 32, f. 4.
Künck. l.c. t. 2, f. 5.

Pogoniotarsus Kraatz 1880.

bimaculatus Kraatz D.E.Z. 1894, 152.

cruciatus Fairm. Ann. Belg. 1894, 139.

crucifer Kraatz D.E.Z. 1895, 223.

flavovirgulatus Fairm. & Mat. 1888, 32, f. 2 (nec 1)
id. Ann. Belg. 1895, 19.

quadrimaculatus Kraatz D.E.Z. 1895, 223..... { *V. humeralis* id. l.c.
V. concolor id. l.c.

setiger Kraatz D.E.Z. 1894, 152.

Vescoi Cog. Rev. Zool. 1861, 88.
id. Ann. Fr. 1862, 376, t. 9, f. 6.
Künck. l.c. t. 2, f. 6.

Zebinus Fairmaire 1894.

flavolimbalis Fairm. Ann. Belg. 1894, 139.

Euchroea Burmeister 1842.

abdominalis Gory & Perch. Silb. Rev. Ent. III, 127.
Burmeister Handb. III, 573.
Künck. Hist. Madag. Col. t. 1, f. 5.

= chlorographa Schaum Ann. Fr. 1844, 389.

= Sganzini Dupont Dej Cat. 3e ed. 190.

auripigmenta Gory & Perch. Silb. Rev. Ent. III, 126
Burm. Handb. III, 575.
Künck. l.c. t. 1, f. 1.

aurora Burm. Handb. III, 572.
Künck. l.c. t. 1, f. 7, 8.

Clementi Künck. l.c. t. 1, f. 4.

coelestis Burm. Handb. III, 574.
Künck. l.c. t. 1, f. 9, 10.

Desmaresti Gory & Perch. Mon. 168, t. 29, f. 3.
Burm. Handb. III, 573.
Künck. l.c. t. 1, f. 11

Kraatz [Stygnochroea] D.E.Z. 1880, 317.

= Dejanira Dupont Dej. Cat. 3. ed. 190.

discopalis Guér. R.M.Z. cl. IX, t. 21.
Burm. Handb. III, 576.
Künck. l.c. t. 1, f. 6.

= loricata Klug, ~~Ins~~ Ins. Madag. 172, t. 3, f. 12.

flavoguttata Waterh. A.M.N.H. (5) IX, 1882, 321.

histrionica Burm. Handb. III, 575.
Künck. l.c. t. 1, f. 3.

multiguttata Burm. Handb. III, 577.
Künck. l.c. t. 1, f. 2.

Cyriodera Burmeister 1842.

Herculicollis Gory & Perch. Mon. 167, t. 29, f. 2.
Burm. Handb. III, 580.
Künck. l.c. t. 3, f. 5, 6.

= ♀ fasciata Gory & Perch. Silb. Rev. Ent. III, 126.

v. parallela Gory & Perch. l.c. 126.

Celidota Burmeister 1842

parvula Janson Cist. Ent. II, 606

splendens Waterh. Tr. Ent. Soc. 1880, 59.
aid. t. 180, f. 2.

Stephensi Gory & Perch. Mon. 218, t. 40, f. 5.
Burm. Handb. III, 578.
Künck. Hist. Madag. Col. t. 3, f. 7.

Euryomia Burmeister 1842.

argentea Ol. Ent. I, g. 6, 50, t. 6 f. 49.
Burm. Handb. III 594.
Künck. l.c. t. 3, f. 8.

= argentata Gory & Perch. Mon. 268, t. 52, f. 2.

maculosa Fairm. Ann. Belg. 1893, 532. (Mayotte

Oberthuri Fairm. l.c. 531 (Mayotte.

quadrimaculata Westw. Tr. Ent. Soc. 1874, 477, t. 8, f. 8.

Tetrarhabdotis Kraatz 1883

nigra Kraatz D. E. Z. 1883, 389.

ruficollis Kraatz l.c. 389.

Oxythyrea Mulsant 1842.

amabilis Künck. l.c. t. 7. f. 4.

argentata nonfr. [Mausoleopsis] Ent. Nachr. 1892, 124 (Comores.

argentifer Künck. l.c. t. 7. f. 3.

eustalacta Burm. Handb. III, 424.
Cog. Ann. Fr. 1848, 280, t. 8, f. 3-5

Clouei Blanch. Cat. Coll. Mus. 1850, 11.
Cog. ann. fr. 1852 p. 379.

Vandana Künck. l.c. t. 7, f. 5.

Glycyphana Burmeister 1842

ersicolor F. et syn. (Ind. or. Ceylan.
(Gory & Perch. mon. 280, t. 54. f. 5)
Künck. ft. I, f. 7 Hist. Madag. Col.

V. variegata F. Syst. El. I, 51 (Madagasc.

V. luctuosa Gory & Perch. Mon. 283, t. 55, f. 5.
Fath. Voj. Cat. 3. od. 192 (Réunion.
(Séchelles.

lycyphana mediata Westw. Tr. Ent. Soc. 1874, 476, t. X, f. 3.
= Epixanthis mediata, et vient de Madagascar
et non de Borneo. Cf. G. Epixanthis.]—

Cetonia Fabricius 1775.

oudoti Burm. Handb. III, 495
Künck. l.c. t. X. f. 8.

naculata F. Spec. Ins. I, 58.
Gory & Perch. Mon. 199, t. 36, f. 1.
Burm. Handb. III, 476.
(Inde Or. Maurice. Séchelles.

= Antheus Voet Col. I, 10, t. 1. f. 8.

= aurichalcea F. Syst. Ent. 49.
Ol. Ent. I, p. 6, 42, t. 9, f. 78.

Valgini
Valgus Scriba 1790.

lbolineatus Waterh. A. M. N. H. (5) IV, 1879, 83.

Steraspis *

BUPRESTIDAE

Chalcophoropsis Thomson 1878 -

quadrifoveolata Lap-Cast. et Gory Mon. I, 1837, Bupr. 8, t. 2, f. 4.
Thoms. Typ. Bupr. 1878, 18.
Künck. Hist. Madag. Col. t. 38, f. 1.

= foveipennis Dej. Cat. 3ed. 1837, 87
= primaria Chevr. Silb. Rev. Ent V, 1839, 57
= bilis Gory Mon. Suppl. IV, 1841, 59, t. 18, f. 59.
= Jacquemonti Gory l.c. 60 t 12, f. 60.

Rothschildi Gahan A.M.N.H. (6) XI, 1893, 224

Iridotaenia H. Deyrolle 1864

mahena Fairm. Bull. Fr. 1891, XLVI.
Kerr. ibid. 1893, CIII. /Séchalles

Psiloptera Solier 1833.

comorica Mann. B.M. 1837, VIII, ~~125~~ 125.
Sommeri

Nota. C'est la seule espèce de la Région Malgache laissée dans ce genre par Kerremans (Catal. Bupr. 1892). Il met toutes les autres espèces décrites comme ~~Polyb.~~ Psiloptera dans le genre Polybothris.

---

* Steraspis Solier 1833

colossa Har. Berl. Ac. 1878, 214 (Afr. or.

= Hercules (Blanch. i.l.)
Künck. Hist Madag. Col. t 41, f 11.

Polybothris Solier 1833.

adelpha Thoms. R.Z. 1878, 342.

aenea Thoms. l.c. 344.

aeneomaculata Klug, Ins Madag. 1833, 149.
Lap-Cast et Gory, Mon I, 1837, Bupr-77, t 19, f 102
Künck. Hist. Madag. t. 38, f. 4.
id. Var. t. 43, f. 5

= stigmatipennis Dej. Cat. 3e ed. 1837, 88.

aeneosticta Künck. l.c. t. 39, f. 9.

aequalis Waterh. Tr. Ent. Soc. 1880, 182.

alboplagiata Lap-Cast. et Gory Mon. I, 63, t 16 f 81
Künck. l.c. t. 42, f. 8.

albosparsa Fairm. [Psiloptera] Ann Fr. 1869, 210.

alata Lap-Cast & Gory l.c. 74 t. 19, f. 99.
Künck [Icaria] l.c. t. 39, f. 10.

= erosa Chevrol. Silb. Rev. Ent. V, 1838, 68.

ambigua Thoms. R.Z. 1879, 337.

amorpha Lap-Cast. & Gory l.c. 51, t. 13 f 65.
Künck. l.c. t. 40. f. 8.

= chaotica Thoms R.M.Z 1878, 328.

ampliata Fairm. [Psiloptera] Ann Fr. 1869, 216

analis Chevrol. R.M.Z. 1833, 60.
Coq. Ann. Fr. 1852, 365.
Künck. l.c. t. 39, f. 7.

= auromaculata Lap-Cast & Gory l.c. 60, t. 15, f. 77.

ancora Spin = Klugi Lap-Cast & Gory.

annulifer Waterh. Tr. Ent. Soc. 1880, 184.

auriventris Lap-Cast & Gory = sparsuta Lap-Cast & Gory.

auroclavata Coq. R.Z. 1851, 86.
id. Ann Fr. 1852, 362. t. 9. f. 4.

aurocyanea Coq. Ann. Fr. 1848, 276, t. 8, f. 1.
Künck. l.c. t. 44, f. 6.

n. Bé coq.

---

* [Vu le grand nombre d'espèces du G. Polybothris (environ 140), j'ai suivi l'exemple de M. Kerremans et mis à leur place alphabétique les noms tombés en synonymie, pour permettre de les retrouver rapidement.

[auromaculata Sap-Cast & Gory = analis Chevr.

auropicta Sap.-Cast & Gory Mon. I, 61, t. 15, f. 19 1837
Künck. Hist. madag. t. 42, f. 1.

= Schönherri Chevrol. Silb. Rev. Ent. V, 1838, 67.
= myotica Thoms. R.Z. 1878, 347.

aur(e)opilosa Guér R.M.Z. 1832, t. 13.
Sap-Cast & Gory Mon. 55 t. 14, f. 70
Künck. l.c. t. 39, f. 1.

= Goudoti Klug Ins. Madag. 1833, 144, t. 2, f. 4.
Künck (Var. Goudoti) l.c. t. 40, f. 5.
= chalybeoventralis Thoms. R.Z. 1878, 326.

Bernieri Sap-Cast et Gory, Mon. I, 65, t. 16, f. 84.
Künck. l.c. t. 41, f. 1.

bilobata Kerr. Ann. Belg. 1894, 343.

bistrigata Waterh. Tr. Ent. Soc. 1880, 192.

bothrypyga Fairm. Ann. Fr. 1869, 222.
Künck. l.c. t. 43, f. 11.

Bremei Fairm. [Psiloptera] Ann. Fr. 1869, 212.

[calceata Klug = Euczoti Guér.

[carcharias Klug = scapularis Guér

[cassidea Klug. = colliciata Guér.

cassidoides Guér. R.M.Z. 1832, t 29.
Sap.-Cast. et Gory Mon I, 72, t. 18, f. 96.
Künck. l.c. t. 42, f. 5.

= platessa Klug Ins. Madag. 1838, 146 t. 11, f. 4.
= Dalmasi Dej. Cat. 3.e ed. 1837, 88.

caudalis Thoms. R.Z. 1878, 346.

= plagiata Waterh. Tr. Ent. Soc. 1880, 191.

chalcochrysea Klug. Ins. Madag. 1833, 148.
Sap.-Cast. et Gory Mon. I. 76, t 19 f 101.
Künck. l.c. t. 41, f. 3.

= madagascariensis Dej. Cat. 3.e ed. 1837, 88.
= Klugi Dej. l.c.

[chalybeata Klug = exophthalma Guér.

[chalybeoventralis Thoms. = auropilosa Thoms.

[chaotica Thoms. = amorpha Sap-Cast & Gory.

circularis Sap-Cast & Gory, Mon. I. 71, t. 18, f. 93.

circulum Thoms. R.Z. 1878, 345.

caeruleifinis } mis par erreur à coe....
caeruleipes }

circumdata Sap.-Cast et Gory Mon. I, 1837, 47, t. 13, f. 59.
Künck. Hist. Madag. Col. t. 38, f. 5.

coccinella Sap.-Cast. et Gory Mon. 70, t. 17, f. 92.
Künck. l.c. t. 42 f. 6.

= rotundipennis Chevr. Silb. Rev. Ent. V. 1838, 68.
[cæruleifinis Thoms. = naviculare Sap.-Cast. & Gory

cæruleipes Waterh. Tr. Ent. Soc. 1880, 184.

colliciata Guér. R.M.Z. 1832, 27.
Sap.-Cast et Gory Mon. 59, t. 15, f. 76.
Künck. l.c. t. 41, f. 4.

= cassidea Klug Ins. Madag. 1833, 147.
= quadrifoveolata Dej. Cat. 3. ed. 1837, 88.
V. diffinis Kerr. Ann. Belg. 1894, 347.

[compacta Waterh. = moesta Thoms.

complanata Guér. R.M.Z. 1832, t 25.
Sap.-Cast. & Gory, Mon. 73, t. 18, f 99.
Künck. l.c t. 42, f. 11.

= flesa Klug, Ins. Madag. 1833, 145, t. 2, f. 2.

convexa Sap.-Cast & Gory Mon. 58 t. 14, f. 74.
Künck. l.c. t. 38, f. 7.

Coquereli Fairm. [Psiloptera] Ann. Fr. 1869, 211.
Künck. l.c. t. 39, f. 8.

cordiformis Thoms. R.Z. 1878, 346.

crassa Waterh. Tr. Ent. Soc. 1880, 196.

crassiuscula Fairm. Ann. Belg. 1889, CR. VII.

cribaria Waterh. Tr. Ent. Soc. 1880, 185.

Croesus Dup = sumptuosa Klug.

cupreonitens Kerr. Ann. Belg. 1894, 346.

cupreonotata Sap.-Cast & Gory = sparsuta Sap.-Cast. & Gory.

cupreosignata Sap.-Cast & Gory = Solea Klug.

cuprecovaria Kerr. Ann. Belg. 1894, 341.

cuprifera Sap.-Cast & Gory Mon. 59, t. 14, f. 75

= obscurella Thoms. R.Z. 1878, 341.
Künck. l.c. t. 43, f. 6.

cyaneopyga Kerr. Ann. Belg. 1894, 345.

cyaneoviridis Künck. l.c. t. 43, f. 2.

cyanimaculifer Künck. l.c. t. 38, f. 8.

cyclopyga Fairm. Ann. Belg. 1889. CR. VIII.

[Dalmasi Def. = cassidoides Guér.

decolor Thoms. R.Z. 1878, 349.

dejecta Waterh. Tr. Ent. Soc. 1880, 188.
id. A.M.N.H. (5) IX, 1882, 324.

Deyrollei Thoms. R.Z. 1878, 331.

dilatata Ol. Ent. III, 1790, ger. 32 t. 3 f. 24, a, b.
Herbst Col. IX, 1801, 39, t. 149, f. 6.
Schönh. Syn. Ins. 1817, I, 253.
Sap.-Cast. & Gory Mon. I, 1837-54, t. 13, f. 68.
Künck. Hist. Madag. Col. t. 39, f. 3.

dissimilis Thoms. R.Z. 1878, 332.

elegans Künck. l.c. t. 40, f. 1.

elliptica Waterh. Tr. Ent. Soc. 1880, 189.

emarginata Sap.-Cast & Gory, Mon. 71, t. 18, f. 94.
Künck. l.c. t. 41, f. 7.

emarginaticollis Künck. l.c. t. 42, f. 2.

[erosa Chevr. = alata Sap.-Cast. & Gory

exophthalma Guér. R.M.Z. 1832, t. 26.
Sap.-Cast. & Gory, Mon. 86, t. 22, f. 117.
= chalybeata Klug, Ins. madag. 1833, 149.
= tropica Sap.-Cast & Gory Mon. 87, t. 22, f. 118.

expansicollis Fairm. Ann. Fr. 1869, 217.

extrema Thoms. R.Z. 1878, 334.

flavocincta Kerr. Ann. Belg. 1894, 339.

[flesa Klug, = complanata Guér.

fulgidiventris Waterh. Tr. Ent. Soc. 1880, 185.

Garroti Chevr. Silb. Rev. Ent. V, 1838, 67.

[gloriosa Thoms = sumptuosa Klug.

Goryi Guér R.M.Z. 1833, t. 62.
Sap.-Cast & Gory, Mon. 52, t. 13, f. 66.
Künck. l.c. t. 39, f. 4.
= hygaena Klug. Ins. madag. 1833, 143, t. 2, f. 3.
= myops Gory Mon. Suppl. IV, 1840, 98, t. 17, f. 96.
= vespertilio Thoms. R.Z. 1878, 325.

[Goudoti Klug, = auropilosa Guér.

granulosissima Thoms. R.Z. 1878, 332.

hova Künck. l.c. t. 38, f. 11.

Humbloti Fairm. Ann. Belg. 1893, 533.

humeralis Kerr. Ann. Belg. 1894, 340.

impressipennis Sap.-Cast & Gory Mon. I, 1837, 57, t. 14 f. 73.
Künck. Hist. Madag. Col. t. 38, f. 3.

incongrua Thoms. R.Z. 1878, 333.

indistincta Gory Mon. Suppl. IV, 1840, 99, t. 17, f. 97.

infrasplendens Thoms. R.Z. 1878, 323.
Künck. l.c. t. 44, f. 3.

inornata Fairm. Ann. Fr. 1869, 219.

Jansoni Thoms. R.Z. 1878, 330.

Klugi Dej = chacochrysea Klug.

Klugi Sap.-Cast & Gory Mon. 75. t. 10, f. 100.

= *ancora* Spin. Ann. Fr. 1837, 117.

= *Petiti* Dej. Cat. 3. ed. 1837, 88.

laeta Sap-Cast & Gory Mon I, 111, t. 28, f. 152.

laeviventris Waterh. A. M. N. H. (5) IX, 1882, 326.

Lafertei Gory Mon. Suppl. IV, 1840, 102, t. 18, f. 99.
Künck. l.c. t. 41, f. 9.

Lalandei Guer = ochreata Ol.

lamina Klug. Ins. Madag. 1833, 144, t. 2, f. 8.
Sap.-Cast & Gory, Mon. I, 78, t. 18, f. 95.
Künck. l.c. t. 42, f. 7.

lateralis Waterh. Tr. Ent. Soc. 1880, 186.

Lelievri Bug. Ann. Fr. 1854, 75, t. 3, f. 4.
Künck. l.c. t. 40, f. 4.

Lepetiti Gory Mon. Suppl. IV, 1840, 103, t. 18, f. 100.

Luczoti Guér. R.M.Z. 1833, t. 61.
Sap.-Cast & Gory, Mon. I, 50, t. 12, f. 63.
Künck. l.c. t. 40, f. 2.

= *calceata* Klug. Ins. Madag. 1833, 141, t. 2, f. 5.
Spin. Ann. Fr. 1837, 120.

luteomaculata Künck. l.c. t. 44. f. 11.

luteosignata Sap-Cast & Gory = Sparsuta Sap.-Cast & Gory.

maculiventris Sap.-Cast & Gory, Mon. I, 67 t. 17, f. 87.
Künck. l.c. t. 41, f. 2.

madagascariensis Dej. = chalcochrysea Klug.

marginalis Ol. Ent. IV, 1790, Gen. 32, 15, t. 6, f. 60.
Herbst. Col. IX, 1801, 187, t. 150, f. 8.

mayottensis Snell.-Voll. [Psiloptera] Rech.-faune Madag. 1869, 9, t. 1, f. 6, 6a.

moesta Thoms. R.Z. 1878, 348.
Künck. Hist. Madag. Col. t. 43, f. 8.

= compacta Waterh. Tr. Ent. Soc. 1880, 194.

molesta Thoms. R.Z. 1878, 339.

[morosa Gory = sumptuosa Klug.

mucronata Sap.-Cast & Gory Mon. I, 1837, 63, t. 16, f. 80.
Künck. l.c. t. 42, f. 9.

[multifoveolata Dej. = navicularis Sap.-Cast & Gory

multiguttata Waterh. Tr. Ent. Soc. 1880, 186.

[musops Gory = Gorzyi Guérin

[myotica Thoms. = auropicta Sap.-Cast & Gory.

navicularis Sap.-Cast. & Gory Mon. I, 57, t. 14, f. 72.
Künck. l.c. t. 38, f. 9-10.
id. l.c. t. 44, f. 10.

= multifoveolata Dej. Cat. 3. ed. 1837, 88.
= quadricollis Sap.-Cast et Gory Mon. I, 56, t. 14, f. 71.
= caeruleipinis Thoms. R.Z. 1878, 324.

nitidiventris Sap.-Cast et Gory Mon. I, 65, t. 16, f. 85.
Künck. l.c. t. 41, f. 10.

nossibiana Fairm. Ann. Fr. 1869, 221
Künck. l.c. t. 43, f. 13.

Oberthuri Fairm. [Psiloptera] Ann. Belg. 1893, 33.

obscura Thoms. R.Z. 1878, 337.
Künck. l.c. t. 43, f. 12.

[obscurella Thoms. = cuprifera Sap.-Cast et Gory.

obsoleta Thoms. R.Z. 1878, 348.

obtusa Sap.-Cast et Gory Mon. I. 55 t. 13, f. 69.
Künck. l.c. t. 39, f. 6.

ochreata Ol. Ent. IV, 1790, Gen. 32, 59, t. 6, f. 64.
Sap.-Cast et Gory Mon. I, 58, t. 13, f. 67.
Künck. l.c. t. 39, f. 5.

= Lalandei Guér. Ic. 1832, t. 11, f. 4.
= Sganzini Dej. Cat. 3. ed. 1837, 88.

oculicollis Fairm. Ann. Fr. 1869, 223.

= Fairmairei Saund. Cat. Bupr. 1871, 29

oculifera Lap.-Cast. & Gory Mon. I, 1837, 45, t. 11 f. 57.

orbicularis Thoms. R.Z. 1878, 343.

ovalis Waterh. Er. Ent. Soc. 1880, 188.

ovularis Thoms. = quadrispilota Lap.-Cast & Gory

parallela Waterh. Er. Ent. Soc. 1880, 182.

parmulata Fairm. Ann. Fr. 1869, 220.

patruelis Fairm. Ann. Fr. 1869, 211.

peraffinis Fairm. Ann. Fr. 1869, 214.
Künck. Hist. Madag. Col. t. 44, f. 8
(errahm scrip. paraffinis)

Peltis dej. = Klugi Lap.-Cast & Gory.

pisciformis Thoms. R.Z. 1878, 335
Künck. l.c. t. 44, f. 4.

plagiata Waterh. = caudalis Thoms.

platessa Klug. = cassidoides Guér.

propinqua Waterh. = punctcollis Thoms.

Proserpina Künck l.c. t. 44, f. 1.

puncticollis Thoms. R.Z. 1878, 343.
Künck. l.c. t. 43 f. 7.

= propinqua Waterh. Er. Ent. Soc. 1880, 248.

punctipennis Kerr. Ann. Belg. 1894, 344.

punctiventris Waterh. Er. Ent. Soc. 1880, 187.

pyropyga Cog. R.Z. 1851, 86.
id. Ann. Fr. 1852, ~~350~~, t. 9 f. 5.
Künck. l.c. t. 43, f. 1.

quadricollis Lap.-Cast & Gory = naviculoris Lap.-Cast & Gory.

quadrifoveolata dej. = colliciata Guér.

quadrimaculata Waterh. A.M.N.H. (5) IX, 1882, 324.

quadriplicata Thoms. R.Z. 1878, 333.

quadrispilota Lap.-Cast. & Gory Mon. I, 1837, 61, t. 15. f. 18.
Künck. l.c. t. 43, f. 9.

= ovularis Thoms. R.Z. 1878, 342

Rombus Klug = rotundata Guérin

364.

rotundata Guér. R.M.Z. 1832, 98.
Sap.-Cast et Gory Mon. I, 1837, 74, t. 19. f. 98.
Künck. Hist. Madag. Col. t. 42, f. 3.

= rhombus Klug Ins Madag. 1833, 145, t. 2, f. 9.

[rotundipennis Chevr. = coccinella Sap-Cast. & Gory.

ruficauda Thoms. R.Z. 1878, 338.
Künck. l.c. t. 43, f. 10.

scapularis Guér. R.M.Z. 1832, t. 14.
Sap.-Cast & Gory Mon. I, 51, t. 13 f. 64.
Künck. l.c. t. 40, f. 3.

= carcharias Klug, Ins. Madag. 142, t. 2, f. 2.

= spectralis Thoms. R.Z. 1878, 329.

scenica Gory Mon. Suppl. IV, 1840, 97, t. 17, f. 95.
Künck. l.c. t. 40, f. 7.

[Schönherri Chevr. = auropicta Sap.-Cast. & Gory.

scintillans Waterh. Tr. Ent. Soc. 1880, 180.

[sexfoveolata Spin. = sparsuta Sap.-Cast & Gory.

sexmaculata Sap.-Cast & Gory Mon I, 46, t 12, f. 58.

sexsulcata Fairm. [Psilopteva] Ann. Fr. (4) IX, 1869, 215.

[Sganzini dej. = ochreator Ol.

silphoides Thoms. R.Z. 1878, 340.

simulatrix Thoms. l.c. 336.

sobrina Waterh. A.M.N.H. (5) IX, 1882, 325.

sodalis Waterh. Tr. Ent. Soc. 1880, 190.

solea Klug Ins. Madag. 145, t. 2, f. 11.
Sap.-Cast & Gory. Mon. I, 64 t. 16, f. 83.
Künck. l.c. t. 42, f. 10.

= cupreosignata Sap.-Cast & Gory Mon. 63, t. 16, f. 82.

sozor Thoms. R.Z. 1878, 335.

sparsuta Sap.-Cast & Gory Mon. 66, t. 16, f. 86.
Künck. l.c. t. 41, f. 8.

= sexfoveolata Spin. Ann. Fr. 1837, 118.

= auriventris Sap.-Cast & Gory Mon. 68, t. 17. f. 89.
Künck. l.c. t. 41, f. 6.

= luteosignata Sap.-Cast & Gory l.c. 69, t. 17 f 90

spectabilis Thoms. R.Z. 1878, 329.

[spectralis Thoms. = scapularis Guérin

Spinolae Thoms. R.Z. 1878, 325.

splendidiventris Lap.-Cast & Gory Mon. I, 1837, 69. t. 17, f. 91.

squalus Thoms. R.Z. 1878, 331.

sternalis Fairm. [Psiloptera] Ann. Fr. 1869, 213.
Künck. Hist. Madag. Col. t. 44, f. 2.

[stigmatipennis Dej. = aeneomaculata Klug.

striolata Kerr. Ann. Belg. 1894, 342.

subelongata Thoms. R.Z. 1878, 342.

subimpressa Künck. l.c. t. 44, f. 5.

subsilphoides Thoms 1878 R.Z. 341.

sumptuosa Klug. Ins. Madag. 140, t. 2, f. 1.
Lap.-Cast & Gory Mon. 49, t. 12, f. 62.
Künck. l.c. t. 38, f. 6. — t. 40, f 6 &

= Croesus Dup. ~~Dej. Cat.~~ R.M.Z. 1833, t. ??.
= morosa Gory Mon. Suppl. IV, 1840, 96, t. 17 f. 94.
= gloriosa Thoms. R.Z. 1878, 321.
= superba Thoms. l.c. 322.
Künck. l.c. t. 44, f. 12.

superba Thoms. = sumptuosa Klug.

sycophanta Fairm. [Psiloptera] Ann. Fr. 1869, 212.
Künck. l.c. t. 44, f. 9.

terminalis Waterh. Tr. Ent. Soc. 1880, 192.

testudinea Gory = auriventris Lap.-Cast & Gory.

tetrops Fairm. Ann. Fr. 1869, 218.

tropica Lap.-Cast & Gory = exophthalma Guér.

truncatella Waterh. Tr. Ent. Soc. 1880, 195.

truncatipennis Fairm. CR Belg. 1889, VIII.

vespertilio Thoms = Goryi Guér.

videns Thoms. R.Z. 1878, 338.

viridichalybea Thoms. R.Z. 1878, 338.

viridicollis Kerr. Ann. Belg. 1894, 344

viridicollis Künck. l.c. t. 39, f. 2.

viridicornis Künck. l.c. t. 43, f. 3.

viriditarsis Lap.-Cast. & Gory Mon. 47. t. 12, f. 60.
Künck. l.c. t. 43. f. 4.

xanthosticta Fairm. [Psiloptera] Ann. Fr. 1869. 215
Künck. l.c. t. 44, f. 7.

zivetta Klug. Ins. Madag. 1833, 143, t.2, f.6.
Sap.-Cast. & Gory. Mon. I, 1837, 48, t.12, f.61.
Künck. Hist. Madag. Col. t. 38, f.2.

zivettoides Fairm. CR. Belg. 1889, VII.

[zygaena Klug. = Goryi Guérin

Dicercomorpha H. Deyrolle 1864.

Alluaudi Kerr. Bull. Fr. 1893, CIII (Séchelles.

Paraphrixia Saunders mss.

purpurea Ol. Ent. II, 1790, g. 32, 23. t.10, f.105.
Sap.-Cast. & Gory Mon. I, [apatura] 7, t.2, f.11.
(Maurice-

Polycesta Solier 1833.

Goryi Thoms. Typi Bupr. 1878, 45.

howas Kerr. Ann. Belg. 1894, 348.

tigrina Sap.-Cast & Gory Mon. II, 1838, 6, t.1, f.7,

Sponsor Laporte-Castelnau & Gory 1839

aeneus Guér. R.Z. 1840, 357.
Gory Mon. Suppl. IV, 1841, 323, t.54, f.317.
(Maurice.

Alluaudi Kerr. Ann. Belg. 1894, 348. (Madagas.

caerulescens Guér. R.Z. 1840, 357 (Maurice
Gory. mon. Suppl. IV, 1841, 324, t.54, f.318.

convexus Sap.-Cast & Gory Mon.I, 1839, 2, t.1, f.1.
= columbinus Dej. Cat. 3e ed. 1838, 94. (Maurice

Desjardinsi Guér. R.Z. 1840, 357. (Maurice.
Gory mon. Suppl. IV, 1841, 320, t.54, f.314.
> Ch. Waterh. & Phil. Tr. R. Soc. CLVIII, 585 (Rodrigue.

ovalis Gory mon. Suppl. IV, 1841, 322, t.54, f.316.
(Maurice-

parvulus Guér. R.Z. 1840, 358. (Maurice-
Gory. mon. Suppl. IV, 1841, 325, t.54 f.319.

pinguis Guér R.Z. 1840, 357. (Maurice-
Gory. l.c. 321, t.54 f.315.

splendens Guér. l.c. 357 (Maurice.
Gory l.c. 319, t.53. f.313

Ptosima Solier 1833.

sericea Kerr. Ann. Belg. 1894, 349.

Sphenoptera Solier 1833.

hoevsa Nonfried Ent. Nachr. 1892, 139.

Belionota Eschscholtz 1829.

canaliculata F. Mantissa I, 1787, 181.
Herbst Col. IX, 1801, 282.
Schönh. Syn. Ins. I, 1817, 251.
Lap.-Cast. & Gory Mon. II, 1838, 7, t. 1, f. 6.

= punctata Silb. Rev. Ent. V, 1838, 108.

= Championi Murr. Tr. Lin. Soc. 1862, 451, t. 47, f. 5.

Actenodes Lacordaire 1857.

acuminipennis Gory, Mon. Suppl. IV, 1841, 184, t. 31 f. 181.

aenea Gory (nec Thoms.) Mon. Suppl. IV, 1841, 185. t. 31. f. 182.

Alluaudi Kerr. Ann. Belg. 1894, 347.

circumdata Gory, Mon. Suppl. IV, 1841, 183, t. 31, f. 180.

curvipes Gory Mon. Suppl. IV, 1841, 179, t. 30, f. 174.

Chrysobothris Eschscholtz 1829.

boschismanni Lap.-Cast. & Gory. (Cap.
var. > Snell.-Voll. Rech. faune Madag. 2 (Nossi bé.

cyanicollis Lap.-Cast & Gory Mon. II, 1837, 5, t. 1, f. 5.

Entomogaster La Ferté mss.

sexpunctata Lap.-Cast. & Gory [Anthaxia] Mon. II, 1839, 36, t. 8, f. 51.

Meliboeus H. Deyrolle 1864.

miliaris Lap.-Cast. & Gory [Agrilus] Mon. II, 1839, 32 t. 7. f. 40.

Discoderes Chevrolat 1837.

Goudoti Thoms. Syp. Bupr. 1878, 82.
humeralis Waterh. A.M.N.H. (5) XIX, 1887, 293.
inaequalis Sap.-Cast. & Gory [anonymos] Mon. II, 1839, 11, t. 3, f. 14.
lumbaris Klug Ins. Madag. 1833, 62, t. 2, f. 12.
ochraceopictus Fairm. Le Nat. (2) I, 1887, 56, f. 6.
pumicatus Klug Ins. Madag. 1833, 62.
Sap.-Cast. & Gory Mon. II, 1839 [Coraebus] 6, t. 1, f. 7.

Evimantius H. Deyrolle 1864.

curvicollis Kerr. CR. Belg. 1891, 163.
rufopictus Kerr. CR. Belg. 1891, 164.

Agrilus Stephens 1830.

brevicollis Kerr. Ann. Belg. 1894, 352.
octoguttatus Kerr. l.c. 353.
owas Sap.-Cast. & Gory Mon. II, 1835, 65, t. 14, f. 86.
= octosignatus Sap.-Cast. & Gory l.c. 32, t. 7, f. 41.
tuberculicollis Kerr. l.c. 352.

Ankareus Kerremans 1894.

aeneus Kerr. Ann. Belg. 1894, 351.
cyanicollis Kerr. l.c. 350.
subcyaneus Kerr. l.c. 351.

Aphanisticus Latreille 1829.

ater Sap.-Cast. & Gory Mon. II, 1840, 4, t. 1, f. 4.
auriculatus Sap.-Cast. & Gory. l.c. 2, t. 1, f. 2.
= madagascariensis Dej. Cat. 3. ed. 1838, 95.
cristatus Kerr. Ann. Belg. 1894, 353.
Goudoti Sap.-Cast. & Gory Mon. II, 1840, 3, t. 1, f. 3.
mitratus Chevr. Silb. Rev. Ent. V, 1837. 106.
= bicornutus Sap.-Cast. & Gory l.c. 3 t. 1. f. 1.

Trachys Fabricius 1801.

Alluaudi Kerr. Ann. Belg. 1894, 356.

apicata Chevr. Silb. Rev. Ent. V, 1837, 105.

= *accphala* Lap.-Cast. & Gory Mon. II, 1840, 2, t. 1, f. 1.

exsculpta Kerr. l.c. 356.

fasciata Lap.-Cast. & Gory Mon. II, 1840, 4, t 1, f. 5.

imperatrix Kerr. l.c. 354.

magnifica Kerr. l.c. 355.

obsoleta Chev. Silb. Rev. Ent. V, 1837, 105.

= *marmorea* Lap.-Cast. & Gory. Mon. II, 1840, 3 t. 1, f. 2.
= *purpurea* id. l.c. 3, t 1. f. 3.
= *quadrinotata* id. l.c. 4, t. 1 f. 4
= *irrorata* Dej. Cat. 3 ed. 1838, 94.

solitaria Kerr. l.c. 356.

Stenianthe Fairmaire 1886

{ Kerremans in Cat. 1892 scripsit Semianthe
{ id. l.c. (Table alph.) „ Sennianthe

janthina Fairm. Ann. Fr. 1886, 38.

Galbella Westwood 1848.

howas Kerr. Ann. Belg. 1894, 354.

EUCNEMIDAE Mon. Bonvouloir Ann. Fr. 1870

Poecilochrus. Bonvouloir 1870.

grossicollis Bonv. Mon.

Fornax Lap.-Castelnau 1835

filicornis Bonv. Mon. t. 19, f. 6.

intermedius Bonv. Mon. t. 19, f. 5.

macrocerus Bonv. Mon. t. 19, f. 5.

madagascariensis Lap.-Cast. Silb. Rev. Ent. III, 173.
Guér Ann. Fr. 1843, 182, t. 5 f. 28–30.
Bonv. Mon t. 18, f. 7.
Cog. ♯ Ann. Fr. 1856, 511, t. 15.
id. l.c. 1858, Bull. CLXII.
> Fairm. (Comores

subflabellatus Fairm. Le nat. 1880, 246.
id. Ann. Fr. 1880, 329. (Nossibé

subquadricollis Fairm. Le nat. 1880, 246.
id. Ann. Fr. 1880, 330 (Nossi bé

Plesiofornax Bonvouloir 1866.

Bonvouloiri Cog. Ann. Fr. 1866, 321 (Réunion

Coquereli Bonv. Mon. (Réunion

insularis Bonv. Ann. Fr. 1866, 322 (Réunion.

Ottii Bonv. Mon. t. 23, f. 1. (Maurice

unguicularis Bonv. Mon. t. 23, f. 6. (Madag.

Scython Lap.-Castelnau 1835.

velutinus Bonv. Mon.

Cephalodendron Latreille 1834.

indigaceum Bonv. Mon. t. 36, f. 1.
Künck. Hist. Madag. Col. t. 36, f. 12, 13.

virescens Bonv. Mon.
Künck. l.c. t. 36, f. 14.

Convexus Plant. Notes from the Leyd. Mus, 1896. p. 153. (XVIII.

ELATERIDAE.

Mon. Candèze I, mem. Soc. Sc. Liège XII, mai 1857
II, " " XIV, mai 1859
III, " " XV, Juillet 1860.
IV " " XVII, mai 1863.

Révis. de la Mon. Candèze. Mém. Soc. Sc. Liège. (2) IV, 1875.

Etat. Nouv. Candèze. I. Mem. Acad. Belg. XVII, 1864.
II. CR. Soc. Ent. Belg. 1868.
III. Mém. Soc. Sc. Liège 2(IX) 1881.
IV. Ann. Soc. Ent. Belg. 1889
V. Mem. Soc. Liège (2) XVIII, 1893.

Etat. de Madagascar (Voyage Alluaud) Ann. Belg. 1895, 50.

Agrypnus Eschscholtz 1829

fuscipes F. Syst. Ent. 211.
id. Syst. El. II, 224.
Ol. Ent. II, 31, 20, t. 3. f. 21.
Cand. Mon. I, 24, t. 1, f. 1.
> Cand. Ann. Belg. 1895, 52. (Indes. Madag. Réunion.
> Fairm. Bull. Fr. 1893, CCCXXIII. (Séchelles. Afrique Indes or.

Sondaicus Cand. Mon. I, 33. Jec. Candèze Ann. Belg. 1895, 69.

punctatus Cand. Mon. I, 31 Jec. Fleutiaux Bull. Fr. 1894, CCLII
ar.

= insularis Fairm. Bull. Fr. 1891, LXX.

Adelocera Latreille 1829.

aterrima Cand. Elat. Nouv. IV, 4.
Künck. Hist. madag. Col. t. 37, f. 4.

dorsalis Cand. Mon. I, 62, t. 1, f. 4.
Künck. Hist. madag. Col. t. 35, f. 9.

foveata Cand. Ann. Belg. 1895, 52.

inflata Cand. Mon. I, 62.
Künck. l.c. t. 35, f. 8.

madida Cand. Elat. Nouv. IV, 4.
Künck. l.c. t. 37. f. 5.

modesta Boisd. et syn. (Océanie, antilles
> Ch. Waterh. Phil. Trans. R. Soc. CLXVIII, 1879, 525 (Rodrigue.

rectoralis Fairm. St. E. Z. 1884, 276.

tenebrioides Cand. Mon. I, 61.

Dilobitarsus Latreille 1834.

Allucaudi Cand. Ann. Belg. 1895, 52.

signifer Cand. l.c. 53.

vicinus Cand. l.c. 53.

Lacon Sap. Castelnau 1836.

albopictus Cand. Mon. I, 104.
Dej. Cat. 3.ed. 100. — Künck. Hist. Madag. Col. t. 35 f. 3.
= *pictus* Dup. l.c.

alboscutatus Cand. Elat. Nouv. V, 8.

antiquus Cand. Mon. I, 100.

arctior Cand. Ann. Belg. 1895, 56.

argentatus Cand. Elat. Nouv. V, 7.

Baderi Cand. Elat. Nouv. II, 7.

biforatus Cand. Ann. Belg. 1895, 55.

castaneipennis Cand. l.c. 1895, 55.

conspurcatus Cand. l.c. 1895, 56.

crenatus Klug. Ins. Madag. 154.

decoratus Cand. Elat. Nouv. III, 6.

Desjardinsi Cand. Mon. I, 143. (Maurice.
Dej. Cat. 3.ed. 99.

eximius Cand. Mon I, 102.

Fairmairei Cand. Elat. Nouv. IV, 6.

fictus Cand. Elat. Nouv. II, 7.

flavipes Cand. Mon. I, 137. t. 2, f. 14 (Réunion.

gibberosus Cand. Elat. Nouv. IV, 6.

Goudoti Cand. Mon. I, 106, t. 2, f. 1
Dej. Cat. 3.ed. 99.
Künck. Hist. Madag. Col. t. 37, f. 8.

grisescens Cand. Révis. 52.

hamatus Cand. Elat. Nouv. V, 8.

hydropicus Fairm. & Mat. 1880, 293. (Réunion.

interpunctatus Klug. Ins. Madag. 154.

irroratus Klug. Ins. Madag.
Cand. Mon. I, 109. — Künck. l.c. 37, 7.
> Fairm. (Comores

V. *confusus* Cand. Mon. I. 109. (cf. Cand. Ann. Belg. 1895, 54).

Jansoni Fairm. Ann. Fr. 1871, 40.

latiusculus Cand. Elat. Nouv. II, 7.

latus Cand. Mon. I, 136.

= *gravis* Dej. Cat. 3. ed. 99.

laxatus Cand. Ann. Belg. 1895, 56.

leprosus Cand. Mon. I, 107, t. 2, f. 3.
Kunck. Hist. Madag. Col. t. 35 f. 10–11.

= *hydropicus* Dupont Dej. Cat. 3. ed. 99

maculosus Cand. Revis. 53.

Maillardi Deyr. Maill. Réun. II, 4, t. 20, f. 2. (Réunion.

minimus Cand. Ann. Belg. 1895, 57.

minor Cand. Mon. I, 136.
Dej. Cat. 3. ed. 100.

mysticus Cand. Mon. I, 104.

nodicollis Cand. Mon. I, 101.

nodifer Klug. Ins. Madag. 152, t. 3, f. 2.
Cand. Mon. I, 100.

ornatellus Cand. Elat. Nouv. IV, 6.
Kunck. l.c. t. 37. f. 6.

palliatus Cand. Elat. Nouv. V, 7

pictiventris Cand. Mon. I, 127.

pictus Cand. Elat. Nouv. II, 7.

Pipitzi Cand. Elat. Nouv. IV, 7.

planatus Cand. Ann. Belg. 1895, 55.

porcinus Cand. Mon. I, 142. (Réunion.

porosus Klug. Ins. Madag. 153.
Cand. Mon. I, 105.

procellosus Cand. Ann. Belg. 1895, 54.

quadripicturatus Schwartz B. E. Z. 1891.

scaber Cand Mon. I, 153.

sinuatus Cand. Mon. I, 102, t. 1, f. 16.

soricinus Cand. Mon. I, 133, t. 2. f. 11.
id. ♀ Ann. Belg. 1895, 55.

sticticus Cand. Ann. Belg. 1895, 56.

subocellatus Cand. Elat. Nouv. III, 6. (Nossi bé.

tripartitus Cand. Révis. 54.

turbidus Germ. Zeitsch. II, 263,
Cand. Mon. I, 99, t. 1, f. 17.
Künck. Hist. Madag. Col. t. 35, f. 1.

vestitus Klug. Ins. Madag. 152.
Cand. Mon. I. 107. t. 2, f. 2.
Künck. l.c. t. 35, f. 2.

v. *tumidicollis* Künck. l.c. t. 37, f. 9.

Sylotarsus Germ. 1840.

albisparsus Cand. Mon. I, 174,
Künck. l.c. t. 37, f. 12.

aculeatus Cand. Mon. I, 178, t. 2, f. 22
Künck. l.c. t. 37, f. 10.

armatus Cand. Elat. Nouv. IV, 8.
Künck. l.c. t. 36, f. 3.

cinctipes Germ. Zeitschr. II, 248.
Künck. l.c. t. 36, f. 4
= *cuspidatus* Cand. Mon. I, 171, t. 2, f. 21.

cuspidatus Klug. Ins. Madag. 154, t. 3, f. 3.
= *Boieldieu* Cand. Mon. I, 176.
= *madagascariensis* Dupont. Dej. Cat. 3. ed. 99.

depressus Cand. Elat. Nouv. III, 14

Gazagnairei Cand. Elat. Nouv. IV, 8

hastatus Cand. Mon. I, 177.

hexagonus Cand. Elat. Nouv. V, 13.

insulsus Cand. Ann. Belg. 1895, 57.

major Cand. Mon. I, 172.

mucoreus Cand. Mon. I, 173.
Künck. l.c. t. 37, f. 11.

pulvereus Künck. l.c. t. 37, f. 13.

rugatus Cand. Mon. I, 174.

rusticus Cand. Elat. Nouv. V, 13 (Nossi bé.

spinifer Cand. Elat. Nouv. IV. 8

spissicollis Cand. Elat. Nouv. V, 12.

squalescens Fairm. Ann. Fr. 1871, 39.

suboculatus Cand. Elat. Nouv. III, 13.

Ctenicera Latreille 1817

insignis Klug. Ins. Madag. 151 t. 3, f. 1.
Cand. Mon. I, 205, t. 5, f. 3.
Künck. Hist. Madag. Col. t. 36, f. 11.

lugubris Cand. Mon. I. 206, t. 5, f. 4. (Mozambiq.
= Fairm. Ann Belg. 1893, 523. (Mayotte.

nobilis Illig. Wiedm. Arch. I, II, 116,
Cand. Mon. I, 205.
Künck. l.c. t. 39, f. 9-10.
= bicruciatus Latr. Règne. Anim. t. 18, f. 3.
et 3 var. in. Dej. Cat. 3.ed. 101.

Lycoreus Candèze

cyclops Cand. Révis. 116.
Künck. t. 37. f. 2. et var. t. 35. f. 4 ---------- Ces 2 fig. ne peuvent pas représenter
= Ebenaui Heyd. Ber. üb. d. S. Nat. Ges. 1877-78. la même espèce.

corpulentus Cand. Elat. nouv. IV, 11.

dux Cand. Mon I, 208.
Künck. l.c. t. 37. f. 1.
= heros Dej. Cat. 3.ed. 101.

Goudoti Lap. Cast [Iphis] Silb. Rev. Ent. IV. 9.
Cand. Mon. I, 209, t. 4. f. 2.
Künck. l.c. t. 35, f. 5.

madagascariensis Gory. Ann. Fr. 1832, 385, t. 12 f. 2.
Cand. Mon. I, 208.
Künck. l.c. t. 35, f. 1.

= biocellatus Sturm. Cat. 1843, 67.
= Borisduvali Dup. Dej. Cat. 3.ed. 101.

regalis Cand. Mon. I, 209, t. 4, f. 3.
Künckel. l.c. t. 35. f. 6.

triocellatus Lap. Cast. Silb. Rev. Ent. IV, 8.
Cand. Mon. I, 210, t. 4, f. 1.
Künck. l.c. t. 35, f. 3.

Alaus. Eschscholtz 1829.

nabenus Fairm. Bull. Fr. 1892, CLI (Séchelles.

Tetralobus Serville 1825.

Grandidieri Cand. Elat. nouv. IV, 17
Künck. l.c. t. 37. f. 15.

insularis Cand. Elat. nouv. IV, 18.
Künck. l.c. t. 37. f. 14.

Coresus

= Piezophyllus Hope 1842.

macrocerus Sap.-Cast. Silb. Rev. Ent. IV, 1836, 12.
Cand. Mon. II, 11.
Künck. [Piezophyllus] Hist. Madag. Col. t. 35, f. 7.

= robustus Hope P.Z.S. 1842. 75.

Psephus Candèze, Mon. II, 1859, 19.

bucculatus Cand. Mon. II, 25. (Capreric, — Madag.?
> Fairm. Ann. Belg. 1893 (Mayotte.

Dorygonus Candèze, Mon. II, 1859, 182.

amaurus Cand. Mon. II, 186.

brunneus Cand. Elat. nouv. V, 25.

Coquereli Cand. Mon. II, 186.

famelicus Cand. Mon. II, 184, t. 4, f. 2.

humilus Cand. Elat. nouv. V, 186.

semiustus Cand. Mon. II, 185.

stygius Cand. Mon. II, 183.

xanthobrachus Cand. Mon. II, 184.

Phedomenus Candèze, Elat. nouv. IV.

bellus Cand. Elat. nouv. IV, 24.

decoratus Cand. Elat. nouv. IV, 24.

flavangulus Cand. Ann. Belg. 1895, 59.

scitus Cand. l.c. 60.

Sikorai Cand. Elat. nouv. V, 25.

venustus Cand. Elat. nouv. IV, 24.

Aeolus Eschscholtz 1829.

madagascariensis Cand. Elat. nouv. V, 27

{ Pourrait être réuni aux Phedomenus?
{ Cf. Candèze. Ann. Belg. 1895, 60.

Heteroderes Latreille 1834.

complanatus Klug. Ins. Madag. 155.
Cand. Mon. II, 370.

inscriptus Ec. [Aeolus] Wiegm. Arch. 1843, 225
Cand. Mon. II, 347, t. 6, f. 35. (Angola.
Cand. Ann Belg. 1895, 60. (Diego-Suarez.

rufulus Cand. Mon. II, 365. (Nossi-bé

senex Cand. Ann. Belg. 1895, 60.

Drasterius Eschscholtz 1829.

mimus Cand. Ann. Belg. 1895, 61.

tessellatus Künck. Hist. Madag. Col. t. 36, f. 7.

Elastrus Candèze Mon II, 1859, 433.

ampediodes Fairm. Ann. Fr. 1871, 38. (Nossi bé

anchastinus Cand. Mon. II, 434, t. 7, f. 8.

cardioderus Cand. Mon. II, 435, t. 7, f. 8.

rubricatus Cand. Ann. Belg. 1895, 61.

submurinus Fairm. Ann. Fr. 1871, 38 (Ste Marie

tepidus Cand. Mon. II, 435.

Elater Linné 1767.

ambraensis Cand. Ann. Belg. 1895, 62.

holosericeus Cand. Elat. nouv. V, 34.

insularis Cand. Elat. nouv. V, 34

monachus Cand. Ann. Belg. 1895, 61.

murinus Cand. l.c. 62.

ofella Cand. l.c. 62.

semilis Cand. l.c. 62.

Megapenthes Kiesenwetter 1858.

apicipennis Fairm [Melanoxanthus] Ann Fr. 1886, 39
Cand. Ann Belg. 1895, 64.

biplagiatus Cand. Elat. nouv. II, 37.

bistrigatus Cand. l.c. (Réunion

Coquereli Fairm. Ann. Fr. 1871, 41.
distractus Cand. Ann. Belg. 1895, 63.
extraneus Cand. l.c. 63.
flavescens Cand. Elat. nouv. II, 37.
umbilicatus Cand. Ann. Belg. 1895, 63.

Melanoxanthus Eschscholtz 1836.

binus Cand. Elat. Nouv. IV, 36.
imitator Cand. Elat. nouv. V, 38.
melanocephalus F. Spec. Ins. 1781, I, 272.
Thunb. Nov. Ins. Spec. III, 1784, 63.
Cand. Mon. II, 512, t. 7, f. 12. (Cosmopol. trop.
Künck. Hist. Madag. Col. t. 36, f. 6.
nigriventris Cand. Elat. nouv. IV, 36.

Anchastus Reconte 1853.

brevicollis Cand. Ann. Belg. 1895, 64.
morio Cand. Elat. nouv. IV, 32.
sylvanus Cand. Elat. nouv. IV, 32.

Cryptohypnus Eschscholtz 1836.

albitactus Cand. Ann. Belg. 1895, 64.
binodulus Germ. Abh. Berl. Acad. 1832, 68.
hova Cand. Elat. nouv. IV, 38.

Cardiophorus Eschscholtz 1829.

anax Cand. Mon. III, 179.
apicalis Cand. Ann. Belg. 1895, 65.
cruciatus Cand. Elat. nouv. IV, 41.
decretus Cand. Ann. Belg. 1895, 66.
fuscatus Er. Mon. Cardioph. Zeits. f. d. Ent. II, 1840, 304.
fuscovittatus Fairm. Ann. Fr. 1871, 42.
gultifer Cand. Elat. nouv. IV, 41.
junceus Er. l.c. 305.
Cand. Mon. III, 185.

liberatus Cand. i.l. (Mayotte.
ligneus Cand. Elat. Nouv. III, 82.
lutosus Cand. i.l. (Mayotte.
scriptus Cand. Elat. Nouv. IV, 41.
temperatus Cand. Ann. Belg. 1895, 65.
undans Cand. l.c. 65.

Cardiotarsus Eschscholtz 1836.

acuminatus Guér. Voy Coleb. 284 t. 2, f. 6.
Cand. Mon. III, 224, t. 4 f. 2. (Abyssinie
= Cand. Ann. Belg. 1895, 66. (Diego Suarez
= byssinus Bohem. Ins. Caffr. I, 2, 396. (Natal
brunneicollis Er. Germ. Zeitsch. II, 334,
Cand. Mon. III, 229.

grisescens Fairm. Ann. Fr. 1871, 40.
luridipes Fairm. Ann. Belg. 1893, 534.
plebejus Cand. Ann. Belg. 1895, 66.
punctatus Cand. Elat. Nouv. IV, 45.
vitellinus Klug. Ins. Madag. 155.
= difficilis Dej. Cat. 3 ed. 104.
= tabidus Er. Germ. Zeitschr. II, 1840, 334.
Cand. Mon. III, 227.

Psellis Candèze Mon. III, 1860, 289.

promiscua Er. Germ. Zeitschr. III, 112.
Cand. Mon. III, 289. t. 5, f. 1.

Melanotus Eschscholtz 1836.

madagascariensis Cand. Elat. Nouv. IV, 46.

Pyrapractus Fairmaire 1884.

sycophanta Fairm. Ann. Fr. 1884, 228.

Melantho Laporte-Castelnau 1836.

Klugi Lap.-Cast. Silb. Rev. Ent. IV, 10.
Cand. Mon. I, 186, t. 3, f. 8.
Jacobs. Gen. atlas, t. 41, f. 4.
= δ Candezei Fairm. Le nat. 1880, 175.
= costicollis Lap.-Cast. l.c.
= miles Dej. Cat. 3e ed. 103.
= Raffrayi Fairm. Ann. Fr. 1884, 287.
niger Cand. Ann. Belg. 1895, 67.
trisulcatus Cand. Elat. nouv. V, 50.

Morostoma Candèze 1879.

palpale Cand. Cat. Ent. III, 1879, 485, t. 10, fig.
testaceipenne Cand. Elat. nouv. V, 53.

Aphanobius Eschscholtz 1829.

austipennis Germ. Zeitschr. V, 187.
Cand. Mon. IV, 322.
Dej. Cat. 3e ed. 104.
bistrigatus Cand. Mon. IV, 324.
Dej. l.c. 105.

lucius Cand. Mon. IV, 324.
vanus Germ. Zeitschr. V, 187.
Cand. Mon. IV, 323.

Caldeonius Candèze Ann. Belg. 1895, 67.

suturalis Cand. Ann. Belg. 1895, 68.

Nomopleus Candèze

argentatus Cand. [Pleonomus] Mon. IV, 499.
insularis Cand. Elat. Nouv. V, 69.

Hemiopinus Candèze

Hildebrandti Fairm. Stett. Z. 1883, 365.
metallicus Cand. Elat. nouv. IV, 57.

Diplophaenicus Candèze 1895

Alluaudi Cand. Ann. Belg. 1895, 69.

RHIPIDOCERIDAE.

Callirhipis Latreille 1829.

Philiberti Fairm. Bull. Fr. 1891, LXX, ♂
id. l.c. 1893, CCCXXIII ♀ / Séchelles.

DASCILLIDAE

Daemon Laporte-Castelnau 1836.
= Colobodera Klug.

elongatus Klug. Wiegm. Arch. 1838, I, 69.

gigas Lap.-Cast. Silb. Rev. Ent. IV, 23.
= ovatus Klug, Wiegm. Arch. 1838, I, 69.

linearis Lap.-Cast. Silb. Rev. Ent. IV, 24.

madagascariensis Lap.-Cast. l.c. 23.

mucronatus Klug, Wiegm. Arch. 1838, I, 70.

nitidus Klug, l.c.

striatus Klug, l.c.

Nota: Eucinetus subaxillaris Fairm.
et " substriatus Fairm.
sont des Melandryidae du G. Eustrophus.
cf. Fairm. Ann. Fr. 1886, 39.

CANTHARIDAE.

Lycini

Cautires Waterhouse

nec Caenia, cf. Waterh. Ch. Ent. Soc. 1878, 110. — & Fairm. Ann. Fr. 1884, 229.

angulatus Klug. [Dictyoptera] Ins. Madag. 156, t. 3, f. 4
Fairm. ann. Fr. 1869, 225.

Baillyi Fairm. [Caenia] Ann. Fr. 1880, 331. (Nossibé.

Coquereli Fairm. Ann. Fr. 1869, 227. [Caenia]

dichrous Fairm. Ann. Belg. 1893, 535.

Dohrni Fairm. [Caenia] Ann. Fr. 1869, 227.

grandipennis Fairm. Ann. Belg. 1889, C.R. VIII.

holomelas Fairm. Ann. Fr. 1884, 229.

Klugi Fairm. Ann. Fr. 1869, 226.

reflexicollis Fairm. Le Nat. 1887, 57, f. 7.

torquatus Klug [Dictyoptera] Ins. Madag. 157, t. 3, f. 5.
Fairm. Ann. Fr. 1869, 226.

Lampyridini

Luciola Laporte-Castelnau 1833.

amplipennis Fairm. Le Nat. 1880, 246.
id. Ann. Fr. 1880, 330.

antica Voy. Astrol. II, 128.
cf. Fairm. Ann. de Fr. 1884, 229. (distincte de madagascariensis.)

costulata Fairm. Ann. Fr. 1886, 39.
‖ costipennis Fairm. Ann. Fr. 1884, 233.

cribricollis Klug [Lampyris] Ins. Madag. 157.
Fairm. Ann. Fr. 1884, 231.

fulvago Fairm. Ann. Fr. 1884, 232.

Goudoti Lap.-Cast. Essai, Ann. Fr. 1833, 150.
Fairm. Ann. Fr. 1884, 230.

maculiscutum Fairm. Ann. Fr. 1884, 231.

madagascariensis Guér. R. M. Z. 1830, t. 22.
Dupont. Sej. Cat. 2ed. 116.
Fairm. Ann. Fr. 1884, 230.

taeniaticollis Fairm. Ann. Fr. 1886, 39.
‖ vitticollis Fairm. Ann. Fr. 1884, 232.

transversicollis Fairm. Ann. Fr. 1884, 233.

Cantharini [Telephorini].

Cantharis Linné

expansicollis Fairm. [Telephorus] Ann. Fr. 1886, 39

Silis Latreille 1829.

aucta Klug Ins. Madag. 157.

madagascariensis Waterh. A. M. N. H. (5) III, 1879, 380. Fairm. Ann. Fr. 1886, 40.

Drilini

Malachiini,

Zaïus Guérin 1830.

anomalipus Fairm. Le Nat. 1880, 246.

id. Ann. Fr. 1880, 332, t. 11, f. 6.

nolitus Fairm. Le Nat. 1880, 246.

id. Ann. Fr. 1880, 331.

Dasytini

Amalthocus Fairmaire 1886.

tetraspilus Fairm. Ann. Fr. 1886, 41.

Melyrini

Phloeophilus Stephens 1830.

gracilicornis Fairm. Ann. Belg. 1893, 539.

Pelecophorus Latreille 1829.

marginalis Fairm. Le Nat. 1880, 293. (Réunion)
nigrolineatus Guér. Ic. R. Anim. 51, t. 11, f. 6, ad.
villatus Hope Cast. Hist. Nat. I, 283. (Maurice ad.

Xamerpus Fairmaire 1886.

vageguttatus Fairm. Ann. Fr. 1886, 41.

Malthacodes Ch. Waterhouse 1876.

pictus Ch. Waterh. A. M. N. H. (4) XVIII, 1876, 116.
id. Phil. Tr. R. Soc. CLXVIII, 1879, 526, t. 53, f. 7.
/ Rodrigue.

CLERIDAE

Klug, Mon. Abh. Berl. Akad. 1842
Spinola, Mon. 1844.

Cylidrus Latreille 1825.

cyaneus F. Mant. Ins. 126.
Latr. Règne Anim. IV, 476.
Klug, Mon. 262.
Spin. Mon. I, 85, t. 1, f. 3.
Fairm. Ann. Fr. 1886, 42.

= coeruleus Dej. Cat. 3e éd. 125.

= Vescoi Fairm. R. Z. 1849, 361.
id. Ann. Fr. 1886, 42.

fasciatus Lap.-Cast. Silb. Rev. Ent. IV, 35.
Klug, Mon. 263.
Spin. Mon. I, 88, t. 1, f. 2.
Fairm. Ann. Fr. 1886, 42.

= succinatus Dej. i. l.

V. abdominalis Klug. Mon. 262.
fasciatus Spin. Mon. II, 122.

V. bimaculatus Dupont i. l.
V. megacephalus Bug. i. l.

Cteniopachys Fairmaire 1889.

tenebrosus Fairm. Ch. Belg. 1889, XCII
id. Ann. Belg. 1893, 377.

Cladiscus Chevrolat. 1843

rugosus Waterh. Cist. Ent. 1881, 529.
Fairm. Ann. Fr. 1886, 42.

Tillus Olivier 1790.

multicolor Fairm. Ann. Fr. 1886, 43.

Achlamys Waterhouse 1879

= Macrotelus ??

uniformis Waterh. Cist. Ent. 1879, 531.
Fairm. Ann. Fr. 1886, 43.

Enoplioides Fairmaire 1886.

= Macrotelus ?

Oberthuri Fairm. Ann. Fr. 1886, 44.

Myrmecomaea Fairmaire 1886.

latesellata Fairm. Ann. Belg. 1893, 377.

Raffrayi Fairm. Ann. Fr. 1886, 45, t. 2, f. 4.

simplicipes Fairm. Ann. Fr. 1886, 46.

strangulata Fairm. Ann. Fr. 1886, 45.

Pallenis Lap.-Castelnau 1836.

anulipennis Lap.-Cast. Silb. Rev. Ent. IV, 39.
Klug. Mon. 278.
Spin. Mon. I, 108, t. 4, f. 1.
Fairm. Ann. Fr. 1886, 47.
= Joannisi Pettit Dej. Cat. 3.ed. 126.

angustiformis Fairm. Ann. Fr. 1886, 48.

apicalis Fairm. CR. Belg. 1889, XCI
id. Ann. Belg. 1893, 379.

araneipes Fairm. Ann. Belg. 1893, 382.

arcitenens Fairm. Ann. Fr. 1886, 55.

aulica Klug. Mon. 277.
Fairm. Ann. Fr. 1886, 50.

bicolor Spin. Mon. II, 127, t. 46, f. 7.
Fairm. Ann. Fr. 1886, 55.

biconigera Fairm. Ann. Fr. 1886, 52.

bifascis Fairm. Ann. Fr. 1886, 51

?V. digraphis Fairm. CR. Belg. 1889, XCI.
id. Ann. Belg. 1893, 382.

bipenicillata Waterh. Cist. Ent. 1879, 530.
Fairm. Ann. Fr. 1886, 52.

bipunctata Fairm. Le Nat. 1887, 57, f. 9.
id — Ann. Belg. 1893, 380.

cineritius Fairm. Ann. Belg. 1893, 536. (Comores)

cribellata Fairm. Ann. Belg. 1893, 381.

~~diversicollis Fairm. Ann. Fr. 1886, 53~~

diversiventris Fairm. Ann. Fr. 1886, 49.

divisicollis Fairm. Ann. Fr. 1886, 53.

ebenina Fairm. Ann. Belg. 1893, 382.

gibbersa Fairm. Ann. Belg. 1893, 381.

maculicollis Fairm. Ann. Belg. 1893, 378.
nigricollis Kuw. Soc. Ent. 1893 n.° 9.
nitidipes Fairm. Ann. Belg. 1893, 382. (Comores
pictidorsis Fairm. Ann. Belg. 1893, 380.
pleuralis Fairm. CR. Belg. 1889, VIII
plicata Fairm. Ann. Fr. 1886, 54. t. 2, f. 5.
[figurée sous le nom de Quadriplicata].

et l'étiquette porte aussi 4 plicata. qui est le nom qui seul peut faire comprendre.

quadrisignata Kuw. Soc. Ent. 1893, n.° 9.
rugulicollis Fairm. Ann. Fr. 1886, 47.
scabricollis Fairm. Ann. Belg. 1893, 381.
semiazurea Fairm. Ann. Fr. 1886, 48.
semiflava Fairm. Le Nat. 1887, 57. f. 8.
id. Ann. Belg. 1893, 378.

semigranosa Fairm. Le Nat. 1887, 57. f. 10.
id. Ann. Belg. 1893, 380.

semirufa Fairm. Ann. Belg. 1893, 380.
semisuturata Fairm. Ann. Belg. 1893, 378.
suturata Fairm. ibid. Liste p. 375 et non décrit.

nom à supprimer — ce nom n'existe pas dans les clérides nommés par M. Fairmaire.

tenuepicta Fairm. Ann. Belg. 1893, 378.
tricolor Lap.-Cast. Silb. Rev. Ent. IV, 40.
Klug. Mon. 276.
Spin. Mon. I, 110, t. 3, f. 6.
Fairm. Ann. Fr. 1886, 49.
id. Ann. Belg. 1893, 379.
tuberopilosa Fairm. Ann. Fr. 1886, 54.
unicolor Kuw. Soc. Ent. 1893 n.° 9.
vidua Klug. Mon. 278.
Fairm. Ann. Fr. 1886, 50.

Pseudopallenis Kuwert 1893.
humericallosus Kuw. Soc. Ent. 1893, n.° 9.

Stenocylidrus Spinola 1844 = Stenoclerus White

acuteserratus Fairm. Ann. Belg. 1893, 387.
atrocyaneus Fairm. Ann. Belg. 1893, 387.
azureus Klug. Ins. Madag. 158, t. 3, f. 6.
id. Mon.
Spin. Mon. I, 128, t. 7, f. 2. 8.
v. ♀ pulchellus Klug. Mon. 280.
consobrinus Fairm. Ann. Belg. 1893, 537. (Comores
cyaneoniger Fairm. Ann. Fr. 1886, 56.
dispar Fairm. Bull. Fr. 1890, ~~[illegible]~~ CCII.
id. Ann. Belg. 1893, 388.
elegans Spin. [Xylobius] Mon. I, 130, t. 6. f. 1.
Fairmaire [Pallenis] Ann. Belg. 1893, liste, 375.
id. [Stenocylidrus] ibid. 376.
fasciicollis Fairm. Ann. Belg. 1893, 386.
fastigiatus Klug. Mon. 280, t. 1, f. 1.
Fairm. Ann. Fr. 1886, 59.
flavilabris Kuw. Soc. Ent. 1893 n° 9.
geniculatus Fairm. Ann. Belg. 1893, 385.
gracilentus Fairm. Ann. Belg. 1893, 388.
griseo-caudatus Fairm. Ann. Fr. 1886, 56.
impressipennis Fairm. Ann. Fr. 1893, 537. (Comores
impressus Fairm. Ann. Belg. 1893, 538. (Comores
lividipes Fairm. Ann. Belg. 1893, 538 (Comores
longepunctatus Fairm. Ann. Fr. 1886, 57.
melaleucus Fairm. Ann. Fr. 1886, 58.
melanocrossus Fairm. Ann. Fr. 1886, 58.
minor Fairm. Ann. Fr. 1886, 58.
nigratus Fairm. Ann. Fr. 1886, 56.
notaticollis Fairm. Ann. Belg. 1893, 386.
novemguttatus Fairm. Le Nat. 1887, 71, f. 3.
obsoletus Thoms. Mus. sc. 1860, 48.
Fairm. Ann. Fr. 1886, 59. (genre ?).
pedator Fairm. Ann. Belg. 1893, 538. (Comores
rufocaudatus Fairm. Ann. Belg. 1893, 538. (Com.
rugicollis Fairm. Ann. Belg. 1893, 385.
semiopacus Fairm. Ann. Belg. 1893, 383.

type du G. Stenoclerus White.

= nigratus Fairm.

= flavilabris Kuw. sc. typ.

= Stenocylidrus undatus Co[illegible]

septempunctatus Kuw. Soc. Ent. 1893, n°9.

serricornis Fairm. Ann. Belg. 1893, 384.

simulator Fairm. Ann. Belg. 1893, 387.

strangulatus Fairm. CR. Belg. 1889, xci.
id. l.c. 1893, 384.

stricticollis Fairm. Ann. Belg. 1893, 383.

tenuestriatus Fairm. Ann. Belg. 1893, 385 (in Cat.)
[scripsit. tenuestrigatus.] (in. descr.)

truncatulus Fairm. Ann. Belg. 1893, 388.
[scripsit truncatalus.]

undatus Cog. Ann. Fr. 1866, t.7.f.4.

venustus Klug Mon. 279.
Fairm. Ann. Fr. 1886, 55

v. frontalis Waterh. Ctl. Ent. 1879, 531. } cf. Fairm. Ann. Belg. 1893, 376. (catal.).
v. longulus Klug Mon. 279. }

le nom vrai est tenuestrigatus car tenuestriatus n'aurait pas de sens — nivistrigatus olim!

Rhopaloclerus Fairmaire 1886.

Coquereli Fairm. Ann. Fr. 1886, 60.

Tillocleras white

auricomus Klug. Mon. 281.
Fairm. Ann. Fr. 1886, 61.

aurosus Fairm. Ann. Fr. 1886, 62.
id. Ann. Belg. 1893, 389.

fulvoarcuatus Fairm. Ann. Fr. 1886, 62.

testaceipes Fairm. [Tilloderus erratim] CR. Belg. 1889, xci.
id. Ann. Belg. 1893, 389.

Aptinoclerus Kuwert. 1893

dezocolletoides Kuw. Soc. Ent. 1893, n°9.

Liostylus Fairmaire 1886.

anthicoides Fairm. Ann. Fr. 1886, 62.

stricticollis Fairm. Ann. Fr. 1886, 62

Phlococopus Guérin 1846.

suberosus Klug Mon. 324.
Fairm. Ann. Fr. 1886, 63 [scripsit tuberosus]

Opilo Latreille 1802.

biocellatus Fairm. Ann. Fr. 1886, 64.

brunneolinctus Fairm. Ann. Fr. 1886, 65, t. 3, f. 6.

callosus Fairm. Ann. Belg. 1893, 390.

coronatus Fairm. CR. Belg. 1889, xci.
id. ann. Belg. 1893, 391.

dorsoplagiatus Fairm. CR. Belg. 1889, xci.
id. Ann. Belg. 1893, 390.

fastuosus Fairm. Ann. Belg. 1893, 392

lignicolor Fairm. Ann. Fr. 1886, 64.

marmoreus Fairm. CR. Belg. 1889, xci.
id – Ann. Belg. 1893, 391.

tristis Klug. Mon. 324.
Fairm. Ann. Fr. 1886, 65
= funebris Spin. Mon. I, 215, t. 19, f. 2.

Platyclerus Spinola 1841.

communimacula Fairm. Ann. Fr. 1886, 68.

elongatus Spin. Mon. II, 145, t. 46, f. 2.
Fairm. Ann. Fr. 1886, 66.

Lacordairei Thoms. Mus. Sc. II, 1860, 58.
Fairm. Ann Fr. 1886, 66.

metallinus Fairm. Ann. Fr. 1886, 68.

pallidopictus Fairm. Ann. Belg. 1893, 393.

planatus Sap.-Cast. Silb. Rev. Ent. IV. 46.
Klug. Mon. 326.
Spin. Mon. I, 334, t. 28, f. 4.
Fairm. Ann. Fr. 1886, 66.

Raffrayi Fairm. Ann. Fr. 1886, 67.

Cleropiestus Fairmaire 1889

Oberthuri Fairm. CR. Belg. 1889, XCII.
id. Ann. Belg. 1893, 398.

Lissaulicus Waterhouse 1879.

compressicollis Fm. CR. Belg. 1889, XCII
id. Ann. Belg. 1893, 389 (confossicollis err.)

geniculatus Fairm. CR. Belg. 1889, XCII.
id. Ann. Belg. 1893, 389.

laevis Waterh. Cist. Ent. 1879, 532.

Larsostenus Spinola 1844-

univittatus Rossi et Syn. (Cosmopolite.

Enoplium Latreille 1804-

caerulans Fairm. Ann. Belg. 1893, 398.

Elurifera Spinola 1841

analis Kuw. Soc. Ent. 1893, nº9.

apicalis Fairm. Ann. Belg. 1893, 394.

basicrus Fairm. Ann. Belg. 1893, 395.

caerulea Kuw. Soc. Ent. 1893, nº9.

callosa Klug. Mon. 325.
Fairm. Ann. Fr. 1886, 70. = ~~[illegible]~~.
id. Ann. Belg. 1893, 395. = Klugi Kuwert
= Reichei Spin. Mon. I, 291, t. 20, f. 3.
? cf. Fairm. Ann. Belg. 1893, 395.

impunctata Kuw. l.c.

inclita Waterh. Cist. Ent. 1879, 533.

Klugeï (sic) Kuw. l.c.

laevicollis Waterh. Cist. Ent. 1879, 533.

longipennis Fairm. Ann. Belg. 1893, 393.

nitidicollis Fairm. Ann. Fr. 1886, 70.

obscuripes Kuw. l.c.

quadribullata Fairm. Ann. Belg. 1893, 394.

quadripunctata Kuw. Soc. Ent. 1893, n°9.
russata Fairm. Ann. Belg. 1893, 394.
semiaurantiaca Fairm. Ann. Belg. 1893, 396
semivirens Fairm. Ann. Belg. 1893, 396.
suturalis Fairm. Ann. Belg. 1893, 393.
tetrasticta Fairm. Ann. Belg. 1893, 394.
tuberculicollis Waterh. Cist. Ent. 1879, §32.
unifasciata Kuw. l.c.
variegata Kuw. l.c.
zonata Fairm. Ann. Belg. 1893, 395.

Spinolarius Kuwert 1893

bizonatus Kuw. l.c.

Sikorius Kuwert 1893.

Sikorai Kuw. l.c.

Evenus Lap.-Castelnau 1836

filiformis Lap.-Cast. Silb. Rev. Ent. IV, 42.
Klug. Mon. 315, t. 2, f. 9.
Spin. Mon. II, 30, t. 38, f. 2.
Fairm. Ann. Fr. 1866, 72.

Necrobia Latreille 1796.

rufipes De Geer. et Syn. (Cosmopolite.

LYMEXYLONIDAE

Atractocerus Palisot de Beauvois 1801

brevicornis F. Syst. nat. I, 2, 643. (Sierra Leone.
= abbreviatus F. mant. I, 164. (Madag.
Thunb. Götting. Gel. anz. 1805, 281.
= africanus Boh. Ins. Caffr. I, 2, 519.
= necydaloides Beauv. décod. philom. Ann. IX, ≠
1801, 6, t. 1.
Latr. Hist. nat. IX, 137.
Sap.-Cast. Hist. nat. I, 291.

madagascariensis Sap.-Cast. Silb. Rev. Ent. IV, 59.

Melittomma Murray 1867.

insulare Fairm. Bull. Fr. 1893, cccxxiii (Séchelles.

CUPESIDAE

Cupes Fabricius 1801

lugubris Fairm. Ann. Fr. 1895 Bull. CLXXI.

Raffrayi Fairm. Ann. Fr. 1884, 235.
id.- Ann. Fr. 1886, 72, t. 2, f. 7.

BRUCHIDAE [PTINIDAE olim]

Hedobia Latreille 1829.

nobilis Boïeld. Ann. Fr. 1854, Bull. 82. (Maurice.
id- Mon. 659.

Xylodes Ch. Waterhouse 1876.

alboviarius Ch. Waterh. A. M. N. H. (4) XVIII, 1876, 117.
id. Phil. Tr. R. Soc. CLXVIII, 1879, 527, t. 53, f. 8
(Rodrigue.

Bruchus Geoffroy
(Ptinus Linné 1767)

linodulus Bohem. Res. Eugen. 1858, 86. (Maurice).

BYRRHIDAE [ANOBIIDAE] olim.

SPHINDIDAE

LYCTIDAE

Lyctus Fabricius 1792.

rugicollis Walker [Ditoma] A.m.n.H. ( )II, 1858, 206.
Ch. Waterhouse A.m.n.H. (4) XVIII, 1876, 117. (Ceylan
id — Phil. Tr. R. Soc. CLXVIII, 1879. 527. /Rodrigue.

CIIDAE Mellié, Mon. Ann. Fr. 1848.

Xylographus Mellié 1847.

anthracinus Mellié Mon. 222, t. 1, f. 17.

hypocritus Mellié Mon 221, t. 1, f. 16.

Cis Latreille 1796.

Guerini Mellié, Mon. 250, t. 2, f. 12 /Maurice

insularis Ch. Waterh. A.m.n.H (4) XVIII, 1876, 117.
Phil. Tr. R. Soc. CLXVIII, 1879. 527. /Rodrigue.

interpunctatus Mellié, Mon. 263. /Maurice.

quadricornis Klug. Im. Madag. 203.
Mellié Mon. 390.

sexcarinatus Ch. Waterh. A.m.n.H. ibid. 118.
id. Phil. Tr. R. Soc. ibid. 527. /Rodrigue

ustulatus Mellié Mon. 250.

BOSTRYCHIDAE.

Dinoderus Stephens 1830.

minutus F. et syn. [Xylopertha in Cat. Gem. & Har.] Cosmopol. tropic.

Rhizopertha Stephens 1830.

pusilla F. et syn. Cosmopol. tropic

Bostrychus Geoffroy 1762.

brunneus Murr. Coleopt. old Calab. (115) (Guinée

= Grayanus Woll. Col. Hesp. 1867, 109. (I. Cap-Vert

confossus Fairm. [Apate] & Nat. 1880, 308. (Nossi-bé' sec. Lesne.

id. Ann. Fr. 1880, 332.

cornutus ol. (~~et syn.~~) Ent. IV, 77, 7. t. 1, f. 5

Kunckeli Lesne Bull. Fr. 1895, CLXXVIII.

unicornis Waterh. A. M. N. H. ( ) 1879, 361.

Fairm. Ann. Belg. 1893, 539.

Sinoxylon Duftschmidt 1825.

diaspis Fairm.

> Brancsik Jahr. Erencsén 1893, (Nossi-bé.

Xylopertha Guérin 1845.

adusta Fähr (Caffrerie

= Pierroni Fairm. & Nat. 1880, 246. (Nossi bé

id. Ann. Fr. 1880, 333, t. 11, f. 7. a-b.

affinis Brancsik l.c. 235. (Nossi bé

castaneipennis Fähr.

dominicana F. et syn.

Cf. Lesne Bull. Fr. 1895, CLXXVIII.

= iracunda Voll. [Bostrychus] Rech. faune Madag. 10, t. 1, f. 7 (Nossi bé.

eremita ol. Ent. IV, 77, 13, t. 2, f. 11, a-b. (Coromandel.

(Madag. & Nossi bé sec. Lesne-

nicea ol. l.c. 14, t. 2, f. 10 a-b. (Senég, Cayenne, Madag.

= cultrata Thoms. Arch. Ent. II, 83. (Gabon.

> Brancsik l.c. (Nossi bé.

plagiata Fähr. Acad. Sc. Stockholm. XXVIII, 1871, 666.

(Caffrerie & Madag.

Apate Fabricius 1775.

cylindrus Gerst. Monatsb. Berl. Acad. 1855, 268.

id. Peters Reise, 1862, 270, t. 15, f. 13. (Mozambiq. (Madag. sec. Lesne.)

femorata Klug. Ins. Madag. 115.

lignicolor Fairm. (Abyssinie & Nossi bé.

monacha F. et syn. (toute l'Afrique.

> Waterh. (anjouan-

TENEBRIONIDAE.

Zophosini

Zophosis Latreille 1807 -

madagascariensis Deyr. Mon. 1867, 121.

Epitragini

Himatismus Erichson 1843.

emarginifrons Fairm. Ann. Belg. 1894, 141.

Justi Fairm. Le nat. 1880, 246.
id- ann. Fr. 1880, 333, t. 11, f. 8.

luctuosus Fairm.

Zopherini

Scoriaderma Fairmaire 1894.

Comoriense Fairm. Bull. Fr. 1894, cl.

Asidini

Suarezius Fairmaire 1895

gibbosulus Fairm. Ann. Belg. 1895, 22.

Asidobothrys Fairmaire 1886.

clathrata Fairm. Ann. Fr. 1886, 72.

Scotinus Kirby 1818.

antavarus Anccy Nat. Sicil. 1883, 118.
Fairm. Ann. Belg. 1895. 21.

Scotinesthes Fairmaire 1895

acuticosta Fairm. Ann. Belg. 1895. 19.

costulatus Fairm. Ann. Belg. 1895, 20.

Pseudasida Fairmaire 1895

obesa Fairm.

Pedinini.

Opatrinus Latreille 1829.
insularis Muls. Mém. Ac. Lyon 1852, 320.
madagascariensis Muls. l.c. 319.

Selinus Mulsant & Rey 1852.
Menouxi Muls. Mém. Ac. Lyon 1852, 322 (Incert. sed.
> Brancsik Jahr Erencsén 1893, (nossi bé.

Opatrini

Anomalipus

Melanocratus Fairmaire 1895
validipes Fairm. Ann. Belg. 1895, 21.

Caedius Blanchard 1845
coriaceus Muls. Mém. Ac. Lyon, 1860, 35.
madagascariensis Muls. l.c. 37.

Eurycaulus Fairmaire 1868.
Levassorii Fairm. Ann. Belg. 1893, 539. (Comores

Mesogenus
villiger Blanch. Voy. Pôle Sud. IV, 154 (Australie
> Fairm. Ann. Belg. 1893, 524, (Mayotte. Ind. or. australie

Coxelinus Fairmaire 1869.
impressipennis Fairm. Ann. Fr. 1869, 204.
stricticollis Fairm. l.c. 203.

Lichenum Blanchard 1845
variegatum Klug. Ins. Madag. 176. [Opatrum]

Opatrum Fabricius 1775.

Steven "Opatra" in Nouv. Mém. Moscou I, 1829. —

attenuatum Klug. Ins. Madag. 176.

caesum Steven "Opatra" 96. (Réunion.

micans Germ. Ins. spec. nov. 1824 (et syn.) (cap.

= aequale Er. Wiegm. Arch. 1843, I, 247. (id. Angola.

> Fairm. Bull. Fr. 1893, cccxxiv (Séchelles.

micantiperne Fairm. Bull. Fr. l.c. (Séchelles.

verrucosum Germ. (et Syn.) (Dalmatie, Illyrie.

> Fairm. Ann. Belg. 1893, 544 (Comores.

Trachyscelini

Phaleria Latreille 1804.

attenuata Fairm. (Séchelles.

Batesi Fairm. Bull. Fr. 1875, 33. (31).

cadaverina F. var. bimaculata Herbst (& Syn.)

> Fairm. Ann. Belg. 1893, 540 (Comores.

*

cistelina Klug. Ins. Madag. 180. — probablement un Alphitobius ?

[crenata Klug. l.c. 180 = Alphitobius luctuosus Fairm. — ex. Fairmaire.

[prolixa Fairm. indiquée à tort de Madagascar ds la Catal. Gem.-Har. — (Aden.

Bolitophagini

Bolitophagus Illiger 1798.

borbonicus Fairm. le Nat. 1880, 293. (Réunion.

Bradymerus Perroud 1864.

aspericollis Fairm. [Bolitophagus] Ann. Fr. 1858, 798.

> Fairm. [Bradymerus] Ann. Belg. 1893, 524. (Comores, Nossibé, Madag.

Diaperini

Platydema Laporte-Castelnau & Brullé 1831.

aterrima Chevrol. [Holocephala] Pet. Nouv. Ent. 1877, 170

atra Motsh. B. M. 1873, 469.

cercyonoides Fairm. Le Nat. 1880, 308.
id. Ann. Fr. 1880, 335 [Holocephala em.]

fronticornis Klug. [Diaperis] Ins. Madag. 180.

inaequidens Fairm. Le Nat. 1880, 308.
id. Ann. Fr. 1880, 334.
> id. Ann. Belg. 1893, 524 (Comores.

melanocephala Chevrol. Pet. Nouv. Ent. 1878, 209.

palliditarsis Lap.-Cast & Br. Mon. 354.

picipes Lap.-Cast & Br. Mon. (29) (Maurice
= vicina Gemm. Col. Heft. VI, 1879,
(le nom avait été changé par Gemminger a cause de picipes Say qui est une Phaleria).

scriptipennis Fairm. Ann. Fr. 1875, Bull. 33. (31).

spadicea Motsh. B. M. 1873, 468.

tricornis Klug. [Diaperis] Ins. Madag. 181.

variipennis Gemming. Col. Heft. VI, 1870.
= variegata Klug (nec Cast.) [Diaperis] Ins. Madag. 181.

Mon. des Diapérides Lap.-Cast & Brullé Ann. Sc. Nat. 1831, 350.

Ceropria Lap.-Castelnau & Brullé 1831.

Coquereli Fairm. Ann. Fr. 1868, 797.
> id. Ann. Belg. 1898 (Comores

Romandi Lap.-Cast. & Br. Mon. (79) (Sénégal
Prov. malgache très douteuse — et Madag. (Goudot).

Hemicera Lap.-Castelnau & Brullé 1831.

arcuata Lap.-Cast. & Br. Mon. 1831 (71) (Maurice.

Heterophyllus Lap.-Castelnau 1840.

approximatus Dupont Dej. Cat. 3.e ed. 217
= atrorufus Dupont. l.c.

chrysomelinus Klug, Ins. Madag. 179, t. 4, f. 4.
Sap.-Cast. Hist. Nat. II, 226.

curtus Fairm. Ann. Fr. 1869, 229.

Goudoti Fairm. Ann. Fr. 1869, 229.

minutus Brancsik, Jahr. Erencsén 1893, 236.

punctatissimus Fairm. Ann. Fr. 1869, 229.

Phrenapatini

Pycnochilus Ch. Waterhouse 1879.

adversus Ch. Waterh. Tr. Ent. Soc. 1879, 264.

Ulomini

Gnathocerus Thunberg 1814.

vicinus Dej. Cat. 3.ed. 222 (Maurice
Pacord. Gen. V, 323, nota 4.

Tribolium

ferrugineum F. (et syn.) (Cosmopolite

Pycna Fairmaire 1894

aphodina Fairm. Ann. Belg. 1894, 142.

cavifrons Fairm. Ann. Belg. 1893, 540 (Comores.
(sub Pycna, qui n'a été décrit que en 1894.)

Uloma Sap.-Castelnau 1840.

crenato-striata Fairm. Ann. Fr. 1868, 799.

intrusicollis Fairm. Ann. Fr. 1868, 798.
> id. Ann. Belg. 1893 (Comores.

Alphitobius Stephens 1832.

diaperinus Panz. (et syn.) (Cosmopolite

distinguendus Fairm. Ann. Fr. 1869, 230 (Comores.

luctuosus Fairm. [Calophronetis] Ann. Fr. 1869, 230.
= crenatus Klug. [Phaleria] Ins. Madag. 180.

piceus Ol. (et syn.) > Fairm. Ann. Belg. 1893 (Comor.

striatulus Fairm. id. (id.

Martianus Fairmaire 1893.
castaneus Fairm. Ann. Belg. 1893, 541. (Comores.

Holaniara
distincta Brancsik Jahr Irenosén 1893, 237.
vidua Fairm. Ann. Fr. 1871, 43
Brancsik l.c. 237.
> Fairm. ann Belg. 1893 (Comores.

Leptoscapha Fairmaire 1886. (‖?)
‖ Stenoscapha id. 1884.
spissicornis Fairm. [Stenoscapha] Ann. Fr. 1884, 335.
id. - [Leptoscapha] Ann Fr. 1886, 73.
> id. [Chiloscapha] ann. Belg. 1893, 524 (Comoros

? an Chiloscapha Fairmaire 1893.

Hypophloeus Fabricius 1791.
dimidiatipennis Fairm. Ann. Fr. 1880, 335.
ebeninus Fairm. Ann. Belg. 1893, 541 (Comores
longevittatus Fairm. Ann. Belg. 1893, 541. (id.
(err. typ. bivittatus id. ibid. 524, Piste)
rufosellatus Fairm. Ann Fr. 1880, 335.
validus Fairm. Ann. Belg. 1893, 541 (Comores

Loxicum Latreille 1807.
uries Klug, Ins. Madag. 177.
Lap.-Cast. Hist. nat. II, 217.
> Fairm. ann. Belg. 1893 (Comores
capreolus Fairm. Ann. Fr. 1869, 228 (Comores.
> Fairm. Bull. Fr. 1893, cccxxiv (Seychelles.

Eutelini
Eutelonotus Fairmaire
‖ Eutelus Solier 1844.
(nec Walker 1834 Hymenopt.)

decurtatus Fairm. Le Nat. 1880, 308.

Coelometopini

Dyscelabus Ch. Waterhouse 1875.

tuberculatus Ch. Waterh. A. m. n. H. (4) XV, 1875, 412
(Ile Ronde de Maurice

Tenebrionini

Nyctobates Guérin 1834.

sulcator Klug Ins. madag. 179.

Derosphaerus Thoms 1858.

globulicollis Fairm. [Nyctobates] Ann. Fr. 1868, 807.

Tenebrio Linné 1758.

libanatus Fairm. Bull. Fr. 1875, 33.

obscurus F. (et syn.) (Cosmopolite.

Ozaenimorphus Fairmaire 1882.

costulipennis Fairm. Le Nat. 1882, 127.
id. Ann. Fr. 1886, 73. (Nossi bé.

Arthrodactyla Laporte-Castelnau 1840.

attenuata Klug, Ins. madag. 179.
Lap.-Cast. Hist. nat. II, 212.
Fairm. Ann. Fr. 1868, 807.

elongata Klug. Ins. madag. 178, t. 4, f. 8.
Lap.-Cast. Hist. Nat. II, 212.
Fairm. Ann. Fr. 1868, 806.

intermedia Fairm. Ann. Fr. 1868, 806.

Nycteropini

Dolichoderus Laporte-Castelnau 1840.

acuminatus Klug Ins. madag. 175, t. 4 f. 1, a, b.
Guérin R. M. Z. 1837, 203, f. 1.
Solier Studi Ent. 1848, 279.

= Duponti Sol. Ann. Fr. 1834, 497, nota 4.

ambiguus Fairm. Ann. Belg. 1895, 24.

approximatus F. Bates Tr. Ent. Soc. 1879, 283.

atro-aenescens Fairm. Set. Nouv. Ent. 1877, 173.
F. Bates. l.c. 286.

connexus F. Bates Tr. Ent. Soc. 1879, 284.

dimidiatus Waterh.

distinctus F. Bates, l.c. 283

gibbipennis F. Bates, l.c. 285

heterocerus F. Bates, l.c. 281

Klugi Sap.-Cast. Hist. Nat. II, 1840, 202.
Solier Studi Ent. 266, t. 12, f. 1–5.

laticornis Fairm. Le Nat. 1883, 385. St. Ent. Zeit. 1884, 135

longicornis Fairm. Ann. Fr. 1875, Bull. XXXIV.
F. Bates l.c. 282.

Lucifugus F. Bates l.c. 281

V.? tumidicollis F. Bates l.c. 282.

mucronatus F. Bates l.c. 279.

opaculus Fairm. Ann. Belg. 1895, 24.

pectoralis F. Bates l.c. 284.

polilipennis F. Bates l.c. 280

pulchripes F. Bates l.c. 285

puncticeps F. Bates l.c. 280

rugulicceps Fairm. Ann. Belg. 1895, 23.

striatus Sap.-Cast. Hist. Nat. II, 1840, 202.

Nycteropus Saporta-Castelnau 1840.

abbreviatus Fairm. Ann. Fr. 1875 Bull. 34.

aeneovirens Fairm. Ann. Belg. 1893, 542 (Comores)
(cm. sor. aeneus id. l.c. 524 liste)

anthracinus Klug. Ins. Madag. 178.
Fairm. Ann. Fr. 1868, 802.
F. Bates Tr. Ent. Soc. 1879, 287.

bicolor Fairm. Ann. Belg. 1895, 25.

caeruleipes Fairm. Ann. Belg. 1894, 142.

coelestinus Fairm. Ann. Fr. 1868, 802.

confusus F. Bates l.c. 287.

Coquereli Fairm. Ann. Fr. 1868, 804.

ebeninus Klug, Ins Madag. 177, t. 4, f. 2, c. d.
Guér. R. M. Z. 1837, t. 203, f. 2.
Fairm. Ann. Fr. 1868, 801.

laevisternus Fairm. Pet. Nouv. Ent. 1877, 137.
F. Bates Tr. Ent. Soc. 1879, 286.

ovalis Lap.-Cast. Hist. Nat. II, 203.
Fairm. Ann. Fr. 1868, 805.

resplendens Lap.-Cast. l.c. 203

rufipes Lap.-Cast. l.c. 202
Fairm. Ann. Fr. 1868, 805

seriatoporus Fairm. Ann. Fr. 1868, 803.
> id. Ann Belg. 1893 (Comores)

splendidus Fairm. Ann. Belg. 1894, 142.

subcyaneus Fairm. Ann. Fr. 1868, 800.

suturatus Fairm. l.c. 804.

virescens Fairm. l.c. 801.

Cnodalonini

Damatris Laporte Castelnau

(réuni à tort à Tetraphyllus).

acerba Coq. R. Z. 1851, 88.
id. Mon. 386.
Ann. Soc. Ent. Fr. 1852

acidifera Coq. R. Z. 1851, 88.
id. Mon. 386. [err. scr. acidiperus].

alternicolor Fairm. Ann. Belg. 1895, 26.

balteata Coq. R. Z. 1851, 88.
id. Mon. 387. Nombe (Coq)

cuprina Coq. R. Z. 1851, 89.
id. Mon. 392.

cyanipennis Fairm. Ann. Belg. 1895, 26.

Deyrollei Coq. R. Z. 1851, 88.
id. Mon. 385.

Fairmairei F. Bates Tr. Ent. Soc. 1879, 295.

formosa Lap.-Cast. & Br. Mon. 406.
Coq. Mon. 383.
= brevis Klug [Camaria] Ins. Madag. 182.
[= globosa Petit [Hybonotus] Dej. Cat. 3e od. 233.

Mon. (Diapérides) Lap.-Cast. & Brullé Ann. Sc. Nat. 1831, 404.
Mon (G. Tetraphyllus) Coq. Ann. Fr. 1852, 382.
cf. F. Bates Tr. Ent. Soc. 1879, 293.
cf. Fairm. Ann. Belg. 1895, 26.

Buqueti Coq. R. Z. 1851 89.
Mon. 389.

laminata Fairm. Ann. Belg. 1895, 27.

mirifica Cog. R.Z. 1851, 88.
id. Mon. 384, t. 9. f. 8. (hb. Cog.)

purpurata Cog. R.Z. 1851, 89.
id. Mon. 390.

pyroptera Fairm. Pet. Nouv. Ent. 1877, 137.
F. Bates Tr. Ent. Soc. 1879, 391.

smaragdina Cog. R.Z. 1851, 89.
id. Mon. 391.

splendida, Lap.-Cast. & Br. Mon. 407.
Cog. Mon. 386.

tuberculipennis F. Bates Tr. Ent. Soc. 1879, 295.

Horacius Cog. RZ 1851, 89
Mon 4. 394.

Amarsenes F. Bates 1879. (Tr. Ent. Soc. 297)

chalcophanus Fairm. Ann. Belg. 1894, 145.

interstitialis Fairm. l.c. 1895, 29.

modestus Fairm. l.c. 1895, 29.

oblongo-cameles Fairm. [Tetraph.] Sel. Nouv. Ent. 1877, 137.
(sp. typ.)

Charianus F. Bates 1879 (Tr. Ent. Soc. 297)

purpuratus Cog. [Tetraph.] R.Z. 1851, 89.
id. Mon. 390 (Ann. Fr. 1852.)

Chemolanus F. Bates 1879 (Tr. Ent. Soc. 296)

Fairmaire Ann. Fr. 1884, 236 [Chremolamus errat.]

consobrinus Fairm. [Tetraph.] Ann. Fr. 1868, 808.
(sp. typ.)

Coquereli Fairm. [Tetraph.] l.c. 808.

episcopalis Fairm. [err. Chremolamus] Ann. Fr.
1886, 74.

villosipes Fairm. [err. Chremolamus] Ann. Fr.
1884, 236.

Porphyrhyba Fairmaire Pet. Nouv. Ent. 1877, 137.
F. Bates Tr. Ent. Soc. 1879, 292.

Buqueti Cog. R.Z. 1851, 89.
id. Mon. [Tetraph.] 389.
Fairm. Ann. Belg. 1895, 26.

cyaneo-cuprea Fairm. Ann. Belg. 1894, 144.

grandis Fairm. CR. Belg. 1889, VIII.

obscurata Fairm. Ann. Belg. 1894, 144.

Raffrayi Fairm. Ann. Fr. 1884, 235

= chalybeata Fairm. l.c. 236.
cf. id. l.c. 242, note-

violaceicolor Fairm. Pet. Nouv. Ent. 1877, 137.
F. Bates. Tr. Ent. Soc. 1879, 293.
(Sp. typ.).

Hybocaulus Fairmaire Ann. Belg. 1895, 27.

laticornis Fairm. Ann. Belg. 1895, 27.

Camariodes Fairmaire Ann. Fr. 1869, 232.

helopioides Klug. Ins. Madag. 188.

= Coquereli Fairm. Ann. Fr. 1869, 232.

v gracilicornis Fairm. [Tinophyllus] Ann. Fr. 1869. 234.
cf. id. Ann. Fr. 1886, 75.

thoracicus Cog. [Tetraphyllus] R.Z. 1851, 89.
id. Mon. [Tetraph.] 394.
Fairm. Ann. Belg. 1895

Holobrachys Fairmaire Ann. Fr. 1869, 233.

heterocerus Fairm. Ann. Fr. 1869, 233.

Callimaria Fairmaire Le Nat. 1888, 12.

impressipennis Fairm. Le Nat. 1888, 12, f. 4.
id. Ann. Belg. 1895, 29.

Ackanorie F. Bates Tr. Ent. Soc. 1879, 289.

undaticollis Fairm. [Camaria] Bull. Fr. 1875, XXXIII.

Ebellea F. Bates Tr. Ent. Soc. 1879, 290.

tenuitarsis F. Bates Tr. Ent. Soc. 1879, 290.

Pseudocamaria F. Bates l.c. 1879, 287.

alternata Fairm. [Camaria] Bull. Fr. 1875, XXXIII
F. Bates, l.c. 288.
(Sp. typ.)

consobrina F. Bates l.c. 288.

Drocleana F. Bates l.c. 291

chalcoptera Klug, Ins. Madag. 182 [Camaria]

parvicollis (Sp. typ.) Fairm. [Camaria] Bet. Nouv. Ent. 1877, 137.
F. Bates l.c. 291.

violaceipennis Ch. Waterh. Cist. Ent. II, 1878, 365.

= gloriosa Fairm. St. E. Z. 1884, 135. [Camaria]
cf. Fairm. l.c. 277 et 136.

Camaria Serville 1825.

haemorrhoidalis Klug. Ins. Madag. 184.

obscura Klug. Ins. madag. 183
Lacord. Gen. V, 424, Nota 1.

Passeti Fairm. Bull. Fr. 1894, LXXXVIII.

purpurata Klug, Ins. Madag. 183.

rufitarsis Klug, Ins Madag. 184.

trapezicollis Fairm. Ann. Belg. 1894, 143.

Hypocalis Lacord.

arcuata Lap.-Cast. et Br. Ann. Sc. Nat. 1831, 395.
Lap.-Cast. Hist. Nat. II, 223. (Maurice-

Helopini [Strib. Misolampini].

Piloxys Fairmaire Ann. Belg. 1895, 83

foveatus Fairm. Ann. Belg. 1895, 83.

Sphaerocaulus Fairmaire 1869

graniger Fairm. Ann. Fr. 1869, 236.

? = Camaria sec Fairmaire.

Asididius Fairmaire 1869.

Coquereli Fairm. Ann. Fr. 1869, 237.

Meracanthini

Hoplobrachium Fairmaire 1886.

asperipenne Fairm. Ann. Fr. 1886, 74, t. 2, f. 9.

Amarygmini

Amarygmus Dalman 1823.

funerarius Fairm. Ann. Fr. 1868, 800.

Strongylini

Strongylium Kirby 1818.

cupripenne Mäkl. Mon. 261
Fairm. Ann. Fr. 1868, 809.

rudicolle Fairm. Ann. Fr. 1868, 810.

semipurpureum Fairm. Ann. Belg. 1895, 30.

Praogena Lap.-Castelnau 1840.

longipennis Fairm. CR. Belg. 1889, VIII.
id. Ann. Belg. 1895, 32.

Nesogena Mäklin Act. Fenn. VII, 1863, 557.

aculipennis Fairm. Ann. Fr. 1869, 237.

aencipennis Fairm. Ann. Fr. 1868, 813.

Batesi Fairm. St. E. Z. 1875, 190.

castaneipes F. Bates Tr. Ent. Soc. 1879, 302

Coquereli Fairm. Ann. Fr. 1868, 813.

Croesus F. Bates l.c. 304.

Fairmairei F. Bates l.c. 301

fastidiosa Fairm. Ann. Belg. 1894, 146.

fuscoaenea Fairm. Ann. Belg. 1894, 145.

geniculata F. Bates, Tr. Ent. Soc. 1879, 299.

Goudoti Fairm. Ann. Fr. 1868, 811.

Guerini Coq. R.Z. 1851, 88.
id. Ann. Fr. 1852, 381.
Fairm. Ann. Fr. 1868, 814.

Haagi F. Bates, Tr. Ent. Soc. 1879, 304.

humerosa Fairm. Ann. Belg. 1894, 145.

iodolimbata Fairm. Ann. Fr. 1868, 814.

[=purpureolimbata Dupont Sej. Cat. 3ed. 230.
cf. F. Bates Tr. Ent. Soc. 1879, 307.

lucida F. Bates Tr. Ent. Soc. 1879, 300.

lucidicollis Fairm. St. E.Z. 1884, 136.

obscuripes Fairm. Ann. Belg. 1894, 146.

purpurina Fairm. [Praogena] Ann. Fr. 1868, 810.

rutila F. Bates Tr. Ent. Soc. 1879, 300.

speciosa F. Bates l.c. 299.

suturata Fairm. Bull. Fr. 1895

testaceipes Fairm Ann. Fr. 1868, 814.

varians Fairm. St. E.Z. 1875, 190

varicolor F. Bates. Tr. Ent Soc. 1879, 303.

venusta F. Bates l.c. 301

viridicuprea Fairm. Ann. Fr. 1868, 813.

Hyperchalca Fairmaire 1869.

aenescens Fairm. Ann. Fr. 1869, 238.

Humboldti Fairm. Ann. Belg. 1894, 146.

Psilonesogena F. Bates 1879

hybrida F. Bates. Tr. Ent. Soc. 1879, 306.

Stenogena Fairmaire 1895

nadecassa Fairm. Ann. Belg. 1895, 33.

ALLECULIDAE

Allecula Fabricius 1801

brevicollis Klug. Ins. Madag. 186.
comorana Fairm. Ann. Belg. 1893, 543 (Comores
maculicornis Fairm. Ann. Belg. 1893, 542 (id.
sugillata Klug Ins. Madag. 186.

Stenerula Fairmaire 1875

subopaca Fairm. Bull. Fr. 1875, XLI.

Cistela Fabricius 1775.

brevior Fairm. Bull. Fr. 1875, XXXIX.
brunnea C. Waterh. A. M. N. H. (4) XVIII, 1876, 118.
id. Phil. Tr. R. Soc. CLXVIII, 1879, 528 (Rodrigue

convexiuscula Fairm. Bull. Fr. 1875, XLI.
crenatostriata Fairm. Ann. Fr. 1869, 240.
geniculata Klug. Ins. Madag. 185.
Lap.-Cast. Hist. Nat. II, 243.
Fairm. Ann. Fr. 1869, 240.
melanura Klug. Ins. Madag. 185.
Lap.-Cast. l.c. 243.
Fairm. l.c. 239.
micans Klug. l.c. 185
Lap.-Cast. l.c. 243
Fairm. l.c. 241
pubens Fairm. Ann. Fr. 1868, 815.
thoracica Lap.-Cast. Hist. Nat. II, 246
Fairm. Ann. Fr. 1869. 241.

Eubalia Lap.-Castelnau 1840.

ovalis Lap.-Cast. Hist. nat. II, 257 -
Fairm. Ann Fr. 1868, 817.

NILIONIDAE

Liochrinus Westwood

hemisphaericus Guér. Arch. Ent. I, 277 [Ades]
= vernicatus [Hades] Fairm. i.l. > Brancsik
Jahr. Trencsén, 1893, 238 (possibé.

} Lec. Fairmaire.

LAGRIIDAE

Lagria Fabricius 1775.

adusta Klug. Ins. Madag. 187.
Fairm. Ann. Fr. 1869, 242.

ampla Fairm. Le Nat. 1887, 71, f. 4.
id. Ann. Belg. 1895, 31.

Coquereli Fairm. Ann. Fr. 1869, 242 (Mayotte.

corticina Fairm. l.c. 245. (♂.

cribrata Fairm l.c. 246.

fuliginosa Fairm. l.c. 244.

hydropica Fairm. Ann. Belg. 1895, 30.

insignicornis Fairm. Ann. Fr. 1869, 243.

nigriceps Fairm. l.c. 244.

nitidiventris Fairm. St. E. Z. 1884, 137.

obscura F. Ent. Syst. I, 2, 79.
id. Syst. El. II, 70. (Guinée
Klug, Ins. Madag. 187.
Fairm. Ann. Fr. 1869, 241.

pallida Lap.-Cast. Hist. nat. II, 256.

pygmaea Brancsik, Jahr. Trencsin 1893, 238 (nossibé

tumidipennis Fairm. Ann. Belg. 1895, 31.

vittulata Fairm. l.c. 31.

Nemostira Fairmaire 1868.

Coquereli Fairm. Ann. Fr. 1868, 816.

flava Lap.-Cast. Hist. nat. II, 257 [Eubalia]
Fairm. Ann. Fr. 1868, 817.

gracilior Fairm. Ann. Belg. 1895, 33.

janthinipennis Fairm. l.c. 33.

metallica Fairm. Ann. Fr. 1886, 75.

Servillei Lap.-Cast. Hist. nat. II, 257.
Fairm. Ann. Fr. 1868, 816.

Lophophyllus Fairmaire 1887.

costipennis Fairm. Le Nat. 1887, 71, f. 5

rugicollis Fairm. Ann. Fr. 1890 Bull, CCIII.

MONOMMIDAE *Mon. Thomson Ann. Fr. 1860, 5.*

Monomma *Lap. Castelnau 1840.*

abstrusum Ch. Waterh. A. M. N. H. (5) III, 1879, 380.

angustatum Thoms. mon. 21, t. 2, f. 1.

brunnipes Guér. Ic. R. An. 314.
Thoms. mon. 21, t. 2, f. 4.

ferrugineum Thoms. mon. 15.

gibbosum Thoms. mon. 22, t. 3, f. 1.

grande Thoms. mon. 14, t. 1, f. 2, a-c.

gyrinoides Thoms. mon. 17, t. 1, f. 5.

indistinctum Thoms. mon. 19, t. 2, f. 3.

irroratum Klug. Ins. Madag. 94. t. 4, f. 6, g-i.
Thoms. mon. 16, t. 1, f. 3.
v. *Klugi* Guér. Ic. R. An. 313.

maculatum Guér. l. c. 313.
Thoms. mon. 16, t. 2, f. 2.

minutissimum Thoms. mon. 22, t. 3, f. 2.

nigritum Thoms. mon. 20.

pilosum Ch. Waterh. A. M. N. H. (5) III, 1879, 379.

proletarium Thoms. mon. 19, t. 1, f. 6.

pusillum Guér. Ic. R. An. 313.
Thoms. mon. 24.

sepultum Thoms. mon. 18, t. 1, f. 7.

triste Thoms. mon. 18, t. 1 f. 4

rubiginosum Fairm. Ann. Belg. 1893, 535. (Comores)

seriepunctatum Fairm. Ann. Belg. 1893, 535 (id.

MELANDRYIDAE

Eustrophus *Latreille 1817*

subaxillaris Fairm. Ann. Fr. 1869, 224 [Eucinetus]

substriatus Fairm. l. c. 224 [Eucinetus]

cf. Fairm. Ann. Fr. 1886, 39, sur les 2 espèces.

MORDELLIDAE

Mordella Linné 1758.

ornata Fairm. Bull. Fr. 1895

tetraspilota Fairm. l.c.

RHIPIPHORIDAE

Eumadia Lap.-Castelnau 1840.

sodalis Ch. Waterh. A.M.N.H. (5) XI, 1883, 279.

MELOIDAE

Meloe Linné 1758.

Chevrolati Cog. R.Z. 1851, 89.
id. Ann. Fr. 1852, 395, t. 9. f. 3.

compressipes Ch. Waterh. Cist. Ent. II, 53.

Coryna Billberg 1813.

mauritia Mars. Mon. (Maurice

Mylabris Fabricius 1775.

Thunbergi Bills. Mon. 18, t. 2, f. 3. (Mauric
Mars. Mon.

Sytta Fabricius

caerulea Fairm. Ann. Belg. 1895, 34. [Cantharis]

pyrrhodera Fairm. l.c. 35 [Cantharis].

Zonitis Fabricius 1775.

nigripes Waterh. Cist. Ent. II, 54.

PYROCHROIDAE

ANTHICIDAE

Laferté Mon. (in Guér. Sp. et Icon. Gén.) 1848.—

Anthicus Paykull 1798.
Andreae Laf. Mon. 1848, 169.
creberrimus Laf. l.c. 204.

OEDEMERIDAE

Ananca Fairmaire et Germain 1863.
maritima Coq. Ann. Fr. 1848, 177.
id. ‡ l.c. 179, t. 7 IV, f. 1, a-e.
Lacord. Gen. V. 695, nota 1.
=helvola Klug. Ins. Madag. 187 [Ditylus]
striola Fairm.
> Brancsik Jahr Trencsén 1893, 238.

Nacerdes Schmidt 1846.
foveicollis Fairm. Ann. Fr. 1868, 817.
nigrifrons Fairm. Ann. Fr. 1868, 817.

Pseudolycus Guérin 1833.
antennatus Brancsik Jahr Trencsén 1893, 238, t. 12, f. 11.

PYTHIDAE

Salpingus Gyllenhal 1810
[Coquereli Fairm., et sculptilis Fairm. Cap. cité à tort de Madag. ds le Catal. Gem. & Har.]
Ann. Fr. 1868, 818 et 819.

CURCULIONIDAE

Holonychus Schönherr 1840.

acanthosus Fåhrs. Sch. Gen. Curc. V, 1840, 834.
Cog. Ann. Fr. 1889, 242.
Fabr. & Imb. Gen. Cur. II, n°5X.

aeruginosus Fåhrs. l.c. 835
Cog. l.c. 243.

camelus Cog. l.c. 243, t. X, f. 4 a-d.

inaequicollis Fairm. St. E.Z. 1884, 138.

saxosus Cog. l.c. 244, t. X, f. 3, a-b.

viriditinctus Fairm. Le Nat. 1888, 32, f. 8.

Blosyrus Schönherr 1826.

globulipennis Fairm. Ann. Fr. 1871, 45 (Mayotte

nossibianus Fairm. Le Nat. 1880, 316.
id. Ann. Fr. 1880, 336.

trux Fåhrs. Sch. Gen. Curc. V, 908. (Comores

Sciaphilus Schönherr 1826.

sparsus Fåhrs. l.c. 925. (Comores
Lacord. Gen. VI, 1863, 54.

Sysygops Schönherr, 1826.

cinerea Guér. Ic. R. Anim. 1830, 142. (Maurice

cyclops Gll. Sch. Gen. Curc. I, 515. (Réunion
Guér. Ic. R. Anim. t. 37, f. 7 a-d.
Lacord. Gen. Atl. VII, t. 62, f. 3, a.

Desjardinsi Guér. Ic. R. Anim. 143. (Maurice

fuscipes Guér. l.c. 143. (Réunion

hystrix Rosensch. Sch. Gen. Curc. V, 832. (Maurice

prasina Guér. l.c. 143. (Réunion

tuberculata Guér. l.c. 142 (Maurice

Anemerus Schönherr, 1826.

variegatus Bohem. Sch. Gen. Curc. VI, 1, 212.

Polycleis Bohemann 1840.

Bohemani Bob. Sch. Gen. Curc. VI, 1, 219. (Mauricius

difficilis Dohrn. St. E. Z. 1884, 180.

[*Suturalis* Fairm. Ann. Fr. 1871, 45
id. l.c. 1886, 76.

var. a *Bohemani* Fairm.

Pamphaea Pascoe 1886.

deficiens Pasc. Tr. Lin. Soc. 1886, 332 (Comores.
Fairm. ann. Belg. 1893, 545.

Stigmatotrachelus Schönherr

alternans Waterh. Cist. Ent. II, 366, 1878.

chlorostomus Boh. Sch. Gen. Curc. VI, 1, 136.

cinctus Ol. Ent. V, 83, 343, t. 19. f. 242, a, b.
Bohem. l.c. 124.

concinnus Boh. l.c. 140.

fasciculatus Faust, St. E. Z. 1889, 81.

flexuosus Pasc. Journ. Lin. Soc. 1886, 324.

fucosus Boh. l.c. 136.

fuscosignatus Faust, St. E. Z. 1890, 167.

gemmifer Klug Ins. Madag. 197.

guttifer Waterh. Ent. M. M. 1877, 74.

humeralis Waterh. Cist. Ent. II, 366, 1878.

insubidus Faust E. E. Z. 1886, 338.

intermedius Faust l.c. 337.

isabellinus Bohem. l.c. 139.
Fabr. & Imh. Gen. Curc. II, n°41.

v. *subfasciatus* Faust. St. E. Z. 1890, 167.

lynceus Ol. Ent. V. 83, 341, t. 24, f. 334.
Boh. l.c. 129.

magicus Chevrol.

nubifer Faust,

ochreatus Boh. l.c. 134.

octomaculatus Ol. Ent. V, 83, 344, t. 19. f. 245, a-b.

ornatus Ol. l.c. 300, t. 19 f. 243.
Boh. l.c. 130.
Fabr. & Imh. Gen. Curc. II, n°41.

psittacinus Bob. Sch. Gen. Curc. VI, 1, 138.

ruptus Pasc. Journ. Lin. Soc. 1886, 323.

setulosus Faust, St. E.Z. 1890, 169.

Sikorai Faust

squamifer ol. Ent. V. 83, 353, t. 8, f. 96.
Bob. l.c. 133.

= *squamiger* Herbst, Käf. VI, 179, t. 72, f. 8.
= *squamosus* ol. Encycl. méthod. V, 339.

striatogonellatus Bobx. l.c. 137.

turbatus Bob. l.c. 128.

= *squamifer* ‡ Klug, Ins. madag. 197.

viridans Bob. ~~Sch.~~ l.c. 135.

villatus Pasc. Journ. Lin. Soc. 1886, 322.

Homoeonychus Faust 1890.

lepidus Faust, St. E.Z. 1890, 169.

Stiamus Pascoe 1886.

brachyurus Pasc. Tr. Lin. Soc. 1886, 325, t. 41, f. 6. (Comores
Fairm. ann. Belg. 1893, 544.

Cratopus Schönherr 1826.

alboscutellatus Bob. Sch. Gen. Curc. VI, 1, 416 (Réunion.

angustatus Bob. l.c. II, 54. — l.c. VI, 1, 410 (Réunion.

aurostriatus Fairm. Bull. F. 1892, CLI, (Séchelles.

brunnipes F. Ent. Syst. Suppl. 172. (Maurice
Bob. l.c. II, 53. — l.c. VI, 1, 407.

caliginosus Bob. l.c. VI, 1, 414. (Maurice

chrysochlorus Bob. l.c. II, 48. — l.c. (Réunion

circumcinctus Bob. l.c. VI, 1, 403. (id.

confusus Bob. l.c. 408. (Maurice.

Coquerelli Fairm. Le nat. 1880, 293 (Réunion

ditissimus Bob. l.c. 404. (Anjouan

exquisitus Bob. l.c. 405. (Réunion

Frappieri Deyr. Maill. hot. Réun. 1863, H, 13 (id.

fulvescens Bob. l.c. 412. (id.

herbaceus Deyr. Maill. notes Réun. H, 12 (Réunion

humeralis Bob. Sch. Gen. Curc. II, 52. (Réunion
> Fairm. Bull. Fr. 1891, XLVI (Séchelles

ictericus Bob. Sch. Gen. curc. VI, 1, 417 (Réunion

inornatus Ch. Waterh. a.m.n.H.(4)XVIII. 1876. Ro
id. Phil. Tr. R. Soc. CLXVIII 1879. 530. (Rodrigue

lepidopterus Deyr. l.c. 13. (Réunion

leucophaetus Bob. l.c. II, 56. — VI, 1, 418. (id

lotus Bob. l.c. VI, 1, 418. (id.

magnificus Ch. Waterh. l.c. — id. l.c. (Rodrigue

marginatus Bob. l.c. II, 49. (Réunion

marmoreus Bob. l.c. 47. (id.

melanocephalus F. Ent. Syst. Suppl. 167. (Maurice
Bob. l.c. II, 50.

Moreli Deyr. l.c. 10. (Réunion

murinus Bob. Res. Eugen. 1859, 123. (Maurice

nanus Bob. Sch. Gen. Curc. VI, 1, 413. (Réunion

parcesquamosus Fairm. Bull. Fr. 1893, CCCXXIV, (Séchel.

parvus Deyr. l.c. 11. (Réunion

punctum F. Ent. Syst. Suppl. 172. (Maurice
Ol. Ent. V, 83, 411, t. 26, f. 382.
Bob. Sch. Gen. Curc. II, 53.

roralis F. Ent. Syst. Suppl. 173. (id.
Ol. Ent. V, 83, 405 t. 26, f. 373.
Bob. Sch. Gen. Curc. II, 50. — VI, 1, 404

Sandi Deyr. l.c. 6, t. 20, f. 4. (Réunion

scapularis Deyr. l.c. 9. (id.

septemvittatus Deyr. l.c. 5, t. 20 f. 3, (id

striga F. Ent. Syst. Suppl. 173. (Maurice
Ol. Ent. V, 83, 405, t. 26, f. 372.
Bob. Sch. Gen. Curc. II, 50.

sumptuosus Bob. l.c. II, 50. (Réunion

virescens Ch. Waterh. l.c. — id. l.c. — (Rodrigue

Cratopopsis Deyrolle 1863.

bistigma Deyr. Maill. not. Réun. H, 15

nitidifrons Deyr. l.c. 17, t. 20, f. 5.

Catalalus Schönherr 1843.

madagascariensis Boh. Sch. Gen. Curc. VII, 1, 100.

Brachycyrtus Fairmaire 1886.

setofasciatus Fairm. Ann. Fr. 1886, ??, t. 2, f. 10.

Brachyleptops Fairmaire 1886.

murex Fairm. Ann. Fr. 1886, ??.

Homaleptops Faust 1889

benignus Faust St. E. Z. 1889, 83.

Ostra Pascoe 1886

nodulosa Pasc. Journ. Linn. Soc. 1886, 329.

Brachycerus Olivier 1790.

Lapsterus L. et syn. (Caps.

V. ferrugineus Ol. Ent. V, 83, 45, t. 3, f. 28 (Madag.* — *Erreur probable sec. Fairmaire.
Gyll. Sch. Gen. Curc. I, 389.

crenatus Ol. Encycl. Méthod. V, 186.
id. Ent. V, 82, 66, t. 2, f. 17.
Herbst Käf. VIII, 96.

Lafertei Péring. CR. Belg. 1888, LXXVII (Madag. ?

maculatus Ol. Encycl. Method. V, 1790, 183.
id. Ent. V, 82, 45, t. 2, f. 8.

= madagascariensis Schönh. Gen. Curc. V, 613.

Madecassus Péring. l.c.

ocellatus F. Syst. Ent. 154.
Herbst. Käf. VII, 89.

Byrsops Schönherr 1834

bisignatus Fairm. Ann. Fr. 1871, 46.

Catastygnus Pascoe 1871

costulipennis Fairm. Le Nat. 1880, 175.

Rhytidophloeus Schönherr 1842.

albipes F. Ent. Syst. I, 2, 477.
Ol. Ent. V, 83, 395, t. 9, f. 102.
Bob. Sch. Gen. Curc. VI, 2, 291.
Cog. Ann. Fr. 1859, 253, t. 7, f. 7. a
Fairm. Ann Fr. 1871, 47.

nigroperlatus Fairm. Le Nat. 1880, 175.
id- Ann. Fr. 1886, 78.

nodosus Fairm. Ann. Fr. 1871, 47.

parcegranatus Fairm. Ann. Belg. 1893, 543 (comor.

robustus Faust Novit. Zool. I, 1894, 569.

Rothschildi Faust l.c. t. 13, f. 5.

Lithinus Klug. 1833

Révis. Cog. Ann. Fr. 1859, 246.

compressituber Fairm. St. E. Z. 1884, 138.

Hildebrandti Faust St. E. Z. 1889, 84.

humeralis Cog. Révis. 248, t. 7, f. 5, a-c.

ludiosus Bob. Sch. Gen. Curc. VI, 2, 236.
Cog. Révis. 248.

nigrocristatus Cog. Révis. 250.
mimétisme : Fairm. Bull. Fr. 1891, LXXI.

niveus Cog. Révis. 249, t. 7, f. 6, a-b.

penicillatus Ch. Waterh. A. M. N. H. (5) III, 1879, 381.

Pipitzi Faust St. E. Z. 1889, 86.

planus Cog. Révis. 251.

rufopenicillus Fairm. St. E. Z. 1884, 138.

superciliosus Klug. Ins. Madag. 196, t. 4, f. 9.
Bob. Sch. Gen. Curc. VI, 2, 234.
Cog. Révis. 247.

= pipa Guérin [Aterpus] R. M. Z. 1883, Cl. IX, n° 98 t. 98.

Lixosomus Faust 1889

Fairmairei St. E. Z. 1889, 87.

Lanyrrhynchus Schönherr 1826.

pusillus Faust [Lanyrrhynchus ?] St. E. Z. 1889, 144.

Cycloteres Schönherr 1843.

aranea Faust St. E. Z. 1889, 89.

Audouini Boh. Sch. Gen. Curc. VII, 2, 384
Fairm. Ann. Fr. 1871, 51.

bipartitus Fairm. l. c. 52.

Brullei Boh. l. c. 385.
Lacord. Gen. Atl. VII, t. 69, f. 3. a.
Fairm. l. c. 51.

? = contractus Klug. ? sec Fairm.

contractus Klug [Trachodes] Ins. Madag. 199 t. 4, f. 10.
Lacord. Gen. VI, 1863, 375, note 2.

Ceeractes Schönherr 1840.

argenteus Fahrs Sch. Gen. Curc. VI, 1, 303.

Onychogymnus Quedenfeldt

= acroteriasus Roelofs 1866.

ursulus Roelofs Not. Leyd. Mus. XIV, 1892, 50.

Chloropholus Capiomont 1867

Révis des Hypérides Ann. Fr. 1867, 446.

bioculatus Waterh. Cist. Ent. II, 534, 1879.

nigropunctatus Gory R. M. Z. 1834, Cl. IX, t. 120, f. 1
Boh. Sch. Gen. Curc. VI, 2, 341.
Capiom. Révis. 448, t. 11, f. 4.

orichalceus Faust St. E. Z. 1890, 184.

rubrovittatus Gory l. c. t. 120, f. 2.
Capiom. Révis. 448.

trifasciatus Capiom. Révis. 449.

Tetragonothorax Chevrolat Mem. Sc. Liège, (2) V, 62.

Badeni Faust St. E. Z. 1888, 288.

Neocleonus Chevrolat l. c. 66.

Coquereli Chevrol. l. c. 69.

Ileomus Schönherr 1826

Bohemani Faust, St. E. Z. 1890, 189.

Lixus Fabricius 1801.

angulicollis Faust St.E.Z. 1889, 95.

anthracinus Faust l.c. 92.

barbiger Bohrn
Faust l.c. 92.

coarctatus Klug. Ins. Madag. 198.
Gerst. Wiegm. arch. 1871, I, 73.

= compressicollis Thoms. Arch. Ent. II, 1858, 181 (Gabon

= rhomboidalis Boh. Sch. Gen. Curc. VII, 1, 462. (Guinée

deflloratus Ol. Ent. V, 83, 178, t. 22, f. 293.
Faust. St. E.Z. 1892, 44.

Bohrni Faust. St.E.Z. 1889, 90.

encaustus Faust St.E.Z. 1890, 188.

madagassus Faust St.E.Z. 1889, 93.

pica F. Ent. Syst. Suppl. 167. (Maurice

= irroratus Boh. Sch. Gen. Curc. III, 53 (Java.

sejugatus Faust St.E.Z. 1889, 94.

Sturmi Boh. l.c. III, 94
Faust St.E.Z. 1892, 44.

subcuneatus Faust St.E.Z. 1889, 96.

tibialis Faust St.E.Z. 1890, 187.

uniformis Boh. Sch. Gen. Curc. VII, 1, ~~XXXIII~~ 475.

[— nota: Lixus vechiformis Woll. et Cheiranthi Woll. sont de Madère et non de Madagascar ~~comme~~ d'où ils sont cités par erreur à la fin de la mon. de Lixus par Capiomont: Ann. Fr. 1875, 466.]

Eutichesus Schönherr 1843.

antiquus Boh. Sch. Gen. Curc. VII, 2, 161.

Cnemopachus Schönherr 1843.

castaneus Fähræ, Sch. Gen. Curc. VII, 2, 295.

Alcides Schönherr 1826.

Coquereli Fairm. Ann. Fr. 1871, 48.

costipennis Fairm. l.c. 49.

curtirostris Fairm. l.c. 50.

excavatus Ol. Ent. V, 83, 149. t. 8, f. 94

= gibbus F. Ent. Syst. I, 2, 431. [Curculio]. — id. Syst. El. II, 1801, 471 [Rhynchaenus].
Bob. Sch. Gen. Curc. VIII, 1, 55.
Fairm. Ann. Fr. 1871, 48.

Fairmairei Gemming. Col. Heft. VIII, 1871
‖ olivaceus Fairm. ann. Fr. 1871, 50.

fallax Bob. l.c. VIII, 1, 62.
Fairm. Ann. Fr. 1871, 51.

fasciger Faust St. E.Z. 1889, 101.

granicollis Fairm. Ann. Fr. 1886, 79.

subfasciatus Bob. l.c. VIII, 1, 67.
Fairm. Ann Fr. 1871, 49.

Zantes Pascoe 1888.

limbatus Pasc. A.M.N.H. (6) II, 1888, 414, fig.

Desmidophorus Schönherr 1837.

cf. An. Mus. Civ. Gen. (2) II, 248.

brunneopilosus .....

encaustus Pasc. Journ. Lin. Soc. 1886, 338.

fasciicularis Chevr. Ann. Belg. 1881, 91.
Faust. St. E.Z. 1889, 102.

! an F. Ent. Syst I, 2, 424.

= penicillatus Ol. Ent. V, 83, 166, t. 1, f. 9.
Lacord. Gen. VII, 1866, 56 note 1.

galericulus Fairm. CR. Belg. 1889, XCII.

infernalis Faust St. E.Z. 1889, 103.

Lacordairei Faust St. E.Z. 1889, 101

lanosus Pasc. A.M.N.H. (6) II, 1888, 415.

luteovestis Fairm. Le Nat. 1880, 316.
id. Ann. Fr. 1880, 336.

Satanas Pasc. Journ. Lin. Soc. 1886, 332, t. 41, f. 8.

senex Chevr. Ann. Belg. 1881, 91.
Faust, St. E.Z. 1889, 101.

ursus Roelofs Ann. CR. Belg. XVIII, ... , XXXVIII.

Haplocorynus Faust 1889

excellens Faust St.E.Z. 1889, 104.

Ithyporus Schönherr 1836.

albescens Fåhrs Sch. Gen. Curc. VIII, 2, 67.
Fairm. Ann. Fr. 1886, 79.

fasciatus Fåhrs l.c. 69
Fairm l.c. 79.

gracilirostris Fairm. Ann. Fr. 1886, 80.

inflatus Fairm. Ann. Fr. 1886, 80.

madagascariensis Fåhrs l.c. 66.
Fairm. l.c. 79.

petrosus Gerst. St.E.Z. 1860, 388.
Fairm. l.c. 80.

transversus Fairm Ann Fr. 1886, 80.

Craphecorynus Schönherr 1845

anxius Boh. [Coelosternus] Sch. Gen. Curc. IV, 214.
Fairm. Ann. Belg. 1893, 548.

dorsopictus Fairm. l.c. 547 (Comores

inaequalis Boh. [Coelosternus] l.c. 203.
Fairm. l.c. 547.

Ocladius Schönherr 1826.

Coquereli Fairm. Ann. Fr. 1871, 53.

costulatus Fairm. Ann. Fr. 1886, 81.

Costulipennis Fairm. l.c. 82.

maculosus Fairm. l.c. 81.

plicicollis Fairm. l.c. 80.

Camptorrhinus Schönherr, 1826.

Brullei Boh. Sch. Gen. Curc. ~~VIII~~, IV, 174.

brunneocaudatus Fairm. Ann. Fr. 1886, 82.

dorsalis Boisd. Voy. Astrol. II, 1835, 434 (australie

= artensis Montr. Ann. Fr. 1860, 895 (I. art

[= madagascariensis Dej.

dorsiger Fairm. Ann. Fr. 1871, 53.

? = ♂ transversus inflatus Fairm.

Aedemonus Schönherr. 1837.
Erichsoni Boh. Sch. Gen. Curc. IV. 244.

Macraulacus Fairmaire 1893
subcucullatus Fairm. Ann. Belg. 1893, 547.

Cryptorrhynchus Illiger 1807
mangiferae F. Syst. Ent. 139. (Maurice, Ind.
Hübner Naturf. Gen. Curc. IV, 91. (Madag.

Saphicus Pascoe 1886.
variegatus Pasc. Journ. Lin. Soc. 1886, 335, t. 41, f. 4.

Metialma Pascoe 1871
Pascoei Faust St. E.Z. 1883, 486.

Sphadasmus Schönherr 1844.
granocostatus Fairm. Bull. Fr. 1893, cccxxv, (Séchelles.

Panoptes Gerstäcker 1860
notatus Gerst. St. E.Z. 1860, 386.

Strabus Gerstäcker 1860.
melaleucus Gerst. St. E.Z. 1860, 382.
pilula Gerst. l.c. 383.

Sympiezopus Schönherr 1838.
liguttulus Fairm. Ann. Fr. 1886, 83.
pentaspilotus Fairm. l.c. 83.
rufovittatus Fairm. Ann. Belg. 1893, 546 (Comoren

Balaninus Germar 1817
melaleucus Boh. Sch. Gen. Curc. VII, 2, 281.

Pseudobalaninus Faust 1889.

Bohemani Faust. St. E. Z. 1889, 98.

pulcher Faust l.c. 100

semifasciatus Faust l.c. 99.

Lobotrachelus Schönherr 1838.

litigiosus Rosensch. Sch. Gen. Curc. IV, 713.

Arthrotomus Schonherr 1844.

depressus Klug. Ins Madag. 201, t. 4 f 12
Boh. Sch. Gen. Curc. VIII, 1, 39.

Diacritus Pascoe 1882

pinguis Pasc. A.M.n.H(5)X, 1882, 455, t. 18, f. 9a & 9 f.l.

Baris Germar. 1824.

acutesculpta Fairm. Ann. Fr. 1886, 84.

pertusicollis Fairm. [Baridius] Ann. Fr. 1871, 54 (Mayotte

Phacelocarus Schönherr 1844

singularis Gyll. Sch. Gen. Curc. IV, 462.

Epiphylax Schönherr 1845

aurolineatus Fairm. Ann. Fr. 1886, 84.

binodulus Boh. Sch. Gen. Curc. VIII, 2, 204.

ephippiger Boh. l.c. 203.

Macrochirus Schönherr 1838.

longipes Drury Ins. II, 61, t. 33, f. 3; Index 1743. (anjouan

= colossus Herbst Käf. VI, 19, t. 60, f. 10.

= Druryi Guér. Ic. R. Anim. 175

Cylindrocephalus Faust 1893

Helleri Faust W. E. Z. XII, 1893, 300.

Aphiocephalus Sacordaire

= Conocephalus Schönherr 1838

castanescens Fairm. Le Nat. 1888, 12, f.s.
id. Ann. Belg. 1895, 36.

Guerini Klug. Ins. Madag. 112.
Chevrol. Guér. Ic. R. Anim. 170, t. 39 bis, f. 3.
Gyll. Sch. Gen. Curc. IV, 842.

Gyllenhali Gyll. l.c. 840.
Guér. Ic. R. Anim. 170.

limbatus Ol. Enc. méth. V, 473 (Maurice.
id. Ent. V, 83, 81, t. 3, f. 32.
F. Ent. Syst. I, 2, 397.
Gyll. l.c. 841.

Crepidotus Schönherr 1838

variolosus Klug. [Calandra] Ins. Madag. 201, t. 4, f. 11 ♂
Guér. Ic. R. Anim. 171.
= ♀ Audouini Gyll. l.c. 860.

Perissoderes Ch. Waterhouse 1879.

ruficollis Ch. Waterh. A.M.N.H. (5) III, 1879, 363. (Anjouan
Fairm. Ann. Belg. 1893, 549.

Sphenophorus Schönherr 1838.

striatus Fahrs Schh. Gen. Curc. VIII, 2, 231. (Brésil.
Woll. A.M.N.H. (4) XX, 1877, 334 (Madère.
(Madagascar, Séchelles: bananiers.

Dichthorrinus Ch. Waterhouse 1878

bicornis Ch. Waterh. Cist. Ent. 1878, 294.

Eugnoristus Schönherr 1838.

latevittatus Fairm. Ann. Belg. 1893, 548 (Comores

monachus Ol. Ent. V, 83, 90, t. 28, f. 411.
Gyll. Sch. Gen. Curc. IV, 849.

niger Pasc. A.M.N.H. (5) XII, 1883, 100.

tristis Pasc. A.M.N.H. (5) XIX, 1887, 377.

Cactophagus Leconte 1876.

stigmaticollis Gyll. [Calandra] Sch. Gen. Curc. IV, 972. (Maurice

Calandra Clairville 1798.

exarata Boh. Sch. Gen. Curc. IV, 970. (Réunion Madag.
[= quadrimaculata Sahl. Dej. Cat. (Madag.
granaria L. & Syn. (Cosmopolite
linearis Herbst. et Syn. (Cosm. tropic
> Waterh. (Rodrigue-
oryzae L. et Syn. (cosmopolite
taïtensis Guér Ic. R. Anim. 171, t. 39 bis, f. 4 a-b. (Taïti
> in Maillard (Madag. (Séchelles, allmand)

Coxorrhinus Lacordaire 1866.

viduus Guér. Ic. R. Anim. 171 (Réunion.

Strombocerus Schönherr 1838.

Schüppeli Gyll. Sch. Gen. Curc. IV, 815.

Rhina Latreille 1802

nigra Drury Ill. II, 63, t. 34, f. 2; Index.
Föhrs Sch. Gen. Curc. IV, 798.
Cog. Ann. Fr. 1848, 181, t. 7 n° 4 f. 4. b.

Dryophthorus Schönherr 1826.

atomus Fairm. Ann. Belg. 1893, 550 (Comoro
crenatus Fairm. Ann. Fr. 1871, 55.
excavatus Boh. Sch. Gen. Curc. IV, 1092.
Fairm. Ann. Fr. 1871, 56.

Pentarthrum Wollaston 1854.

Rodriguezi Ch. Waterh. A. M. N. H. (4) XVIII, 1876, 120. (Rodrigue
id. Phil. Tr. R. Soc. CLXVIII, 1879, 531.

Melarhinus Wollaston 1873.

nigritulus Woll. Tr. Ent. Soc. 1873, 614. (Mon. Cossonid.)

Catoletheus Schönherr 1838

humilis Fairm. Ann. Belg. 1893, 549. (Comores
subcaudatus Fairm. R. Z. 1849, 556 (Taïti- Réunion.

Gloeoxenus Wollaston 1873.

armatus Woll. Tr. Ent. Soc. 1873, 620.

Proëces Schönherr 1838.

macer Boh. Sch. Gen. Curc. IV, 1082.

nigrifrons Boh. l.c. 1081.

Cossonus Clairville 1798.

Coquereli Fairm. Le Nat. 1880, 293 (Réunion

elongatulus F. Ent. Syst Suppl. 168. (cap.
Boh. Sch. Gen. Curc. IV, 1022.
[= sulcifrons Dej. Cat. (Maurice.

fasciolatus Fairm. Ann. Fr. 1871, ss.

impressicollis Fairm. Ann. Belg. 1893, 549 (Comores

maculosus Fairm. Le Nat. 1880, 293, (Réunion

marginalis Boh. Sch. Gen. Curc. IV, 1021. (id.

tenellus Klug Ins. Madag. 202.

Rhyncholus Germar 1824.

angustatus Boh. l.c. 1063.

encaustus Boh. l.c. 1059.

procer Boh. l.c. 1058. (Java
[= filiformis Fabr. in Dej. Cat. (Maurice

teretirostris Klug. Ins Madag. 202.

Cybebus Schönherr 1839.

castaneus Klug Ins Madag. 194. [Apion].
= bistigma Sch. Gen. Curc. V, 449.

dimidiatus F. Ent. Syst. I, 2, 403.
Herbst. Käf. VI, 443, t. 94, f. 6.
= rufipennis Boh. Sch. Gen. Curc. V, 448.
Fabr. & Imhs Gen. Curc. I, n° 71.

Cladobius Chevrolat Dict. d'Orbigny III, 729.

apioides Dej. .....
= suturalis Bug. [Apion] .....

Sispotherium Faust 1890

Hildebrandti Faust, St. E.Z. 1890, 194.

Cyphus Thunberg

= Attelabus Auct. cf. Bedel, Faune.

Coquereli Fairm. Ann. Fr. 1871, 44.

dentipennis Gyll. Sch. Gen. Curc. V, 315.

Pagenoderus White 1841

gnomoides White Ins Entom. 1841, 183, c fig.

Attelabus Linné 1758

= Apoderus Samouelle 1819 et auct.
cf. Bedel, Faune-

abdominalis Gyll. Sch. Gen. Curc. V, 291.

ardea Gyll. l.c. 295

camelus Ol. Ent. V, 81, 15, t. 1, f. 19.

= dromas Klug. Ins. madag. 193. Gyll. l.c. 291

castaneus Jekel Ins. Saund II, 240.

= camelus Fabr. & Imh. Gen. Curc. I, n°77.

dromas Ol. Ent. V, 81, 14, t. 1, f. 17.

enoplus Brancsik Jahr Trencsén 1893, 239, t. 12, f. 12. Gyll. l.c. 293.

femoralis Jekel l.c. 160, t. 3, f. 1, b.

festivus Klug Ins. madag. 193.

flavicornis Gyll. l.c. V, 285.

humeralis Ol. Ent. V, 81, 17, t. 1, f. 22.

V. ater Faust. St. E.Z. 1890, 166. Gyll. l.c. 298.

inaequalis Gyll. Sch. Gen. Curc. V, 297.

limbatus Faust St. E.Z. 1889, 81.

uniformis Gyll. l.c. 293.

s.g. Trachelophorus Jekel Ins. Saundersiana II. 161

filicollis Fairm. Ann. Belg. 1895, 35.

giraffa Jekel Ins. Saund. II, 161, t. 3, f. 2 b.

Cylas Latreille 1802.

turcipennis Boh. Sch. Gen. Curc. I, 369.
Fabr. & Imh. Gen. Curc. I, nº 25
(Madag. Java. Inde. Bourbon.

Euops Schönherr 1839

Goudoti Jekel [Ophthalmolabus] Im. Saund. II, 222, note.

Genus incertae sedis:

Agathorrinus indescr.

vittulatus Fairm. Ann. Belg. 1893, 545. (Comores.

ANTHRIBIDAE.

Phlocotragus Schönherr 1833.

albicans Fåhrs Sch. Gen. Curc. V, 176.

Cophoderes Schönherr 1839.

annulatus Ch. Waterh. A. M. N. H. (4) XV, 1875, 412.

ferrugatus Klug, Im. Madag. 191.
Fåhrs l.c. 153.

frenatus Klug Im. Madag. 190, t. 4, f. 7.
Fåhrs, l.c. 151.

= ♀ funebris Klug l.c. 191.
Fåhrs l.c. 152.
Fabr. & Imh. Gen. Curc. I, nº 58.

stigma Klug Im. Madag. 192, t. 4, f. 8.

thoracicus Fåhrs l.c. 205.

verrucosus Ol. Ent. IV, 80, 6, t. 1, f. 5 a-b.
Fåhrs, l.c. 204
Fabr. & Imh. l.c. nº 53.

= scoparius Klug. Im. Madag. 192.

Litocerus Schönherr 1833.

madagascariensis Faust St. E. Z. 1889, 105.

Salazia Coquerel 1866 (i.f.)
(erratim scr. Palazia)
aranea Cog. Ann. Fr. 1866, t.7, f.6 (Réunion.

Cedus Pascoe 1860.
Audouini Fähr. Sch. Gen. Curc. V, 184.
Lacord. Gen. Col. VII, 516, note 1.

Mecotarsus Schönherr 1839.
Rosenschoelái Fähr. l.c. 188.

Diastatropis Lacordaire 1866.
crassicornis Ch. Waterh. A.M.N.H.(5)X, 1882, 43.
irroratus Lacord. Gen. Col. VII, 520, note 2.
id. atl. VIII, t.79, f.4, a.

nitidipennis Ch. Waterh. l.c. 45.
olivaceus Ch. Waterh. Tr. Ent. Soc. 1877, 11.
aid. t.171, f.2.

planifrons Ch. Waterh. A.M.N.H.(5)X, 1882, 44.
tigrinus Lacord. Gen. Col. l.c.

Eczesaris Pascoe 1859.
leucosticta Klug, Ins. Madag. 189, [Xanthribus].

Vitalis Fairmaire 1892
rubricollis Fairm. Bull. Fr. 1892, CLXXI.

Tropidoderes Schönherr 1826.
Coquereli Fairm. Le Nat. 1880, 300. (Réunion.
= tessellatus Cog. in Ann. Fr. 1866. t.7, f.5.

Cenchromorphus Fairmaire 1892.
curticornis Fairm. Bull. Fr. 1892, CLXX.

Litotropis Fairmaire 1880.

lateritius Fairm. & bat. 1880, 316 (Nossi-bé.
id. Ann. Fr. 1880, 337.

Phlocobius Schönherr 1826.

alboguttatus Fährs. Sch. Gen. Curc. V, 243.
(Scrips. albiguttatus)

nigroungulatus Gyll. Sch. Gen. Curc. I, 133.
Fährs. l.c. 241. (Inde-

=cervinus Klug Ins. Madag. 188.

sugillatus Fährs. l.c. 242.

Cratoparis Schonherr 1839.

proceridus Fährs. Sch. Gen. Curc. V, 222.

Balanodes Ch. Waterh. 1876.

tomentosus Ch. Waterh. A.M.N.H. (4) XVIII, 1876, 119.
id. Phil. Tr. R. Soc. CLXVIII, 1879, 529, t. 53, f. 10. (Rodrig.

Caranistes Schönherr 1839.

annulipes Ch. Waterh. A.M.N.H. (4) XVIII, 1876, 119.
id. Phil. Tr. R. Soc. l.c. 529. (Rodrigue

Dionysius Cog. (if Ann. Fr. 1866, t. 7, f. 7 (Réunion

languidus Fährs. Sch. Gen. Curc. V, 272. (id.

lineatus Fährs. l.c. 271.

variegatus Boh. Res. Eugen. 1859, 116. (Maurice

Holomecus Fairmaire i. l.

tenuelineatus (Fairm.) Brancsik Jahr. Trencsén. 1893, 241, t. 12, f. 13.

MYLABRIDAE [Bruchidae olim.]

Mylabris Geoffroy
= Bruchus Linné 1767

graphicus Fähræ. Sch. Gen. Curc. V, 104.

nigricornis F. Syst. El. II, 400. (Maurice
Fähræ. Sch. Gen. Curc. V. 65

jandani Blanch. Ann. Fr. 1844, Bull. IV.
id. Hist. Nat. II, 1845, 114, t. 10, f. 6-7 ♂ ♀

serratus Ol. Enc. méth. V, 1790, 199. (Senegal
id. Ent. IV, 79, 10, t. 1, f. 8 a-b.
Gyll. Sch. Gen. Curc. I, 94.

[= gleditsiae Dej. Cat. 1ère éd. 78 (Maurice.

Caryoborus Schönherr

[Nota. Genre réuni à tort à Bruchus par Gemming. et Harold - Il est probable que certaines des espèces citées dans le G. Bruchus sont des Caryoborus.]

Alluaudi Allard Bull. Fr. 1895, CLIV.

denticulatus Klug. Ins. Madag. 187.

BRENTHIDAE

Sclasius Lacordaire 1866.

Deyrollei Lac. Gen. Col. VII, 409, note 2.
id. Gen. Atl. t. 77, f. 2, a.
Senna [Zenioses] Bull. Soc. Ent. Ital. 1892,

Cyphagogus Parry 1849.

appendiculatus Fairm. C.R. Belg. 1889, XCII.
id. Ann. Belg. 1895, 37.

costipennis Fairm. C.R. Belg. 1889, XCIII.
id. Ann. Belg. 1895, 37.

sculptilis Fairm. C.R. Belg. 1889, XCIII.
id. Ann. Belg. 1895, 36.

Anchisteus Kolbe 1883.

peregrinus Kolbe B.E.Z. 1883, 186.

Ischnomerus Schönherr 1840.

immotus Chevrol. [Aulacoderes] R.Z. 1839, 182.
= linearis Boh. Sch. Gen. Curc. V, 372.

Trachelizus Schönherr 1840.

populeus Boh. Sch. Gen. Curc. V, 495.

Eupsalis Lacordaire 1866.

anthracina Klug, Ins. Madag. 194 [Arrhenodes]
Gyll. Sch. Gen. Curc. V, 481.
= bipunctata Gory, R.Z. 1839, 328.

coracina Kolbe Sitz. Ges. Nat. Fr. Berl. 1883, 76.

Brenthus Fabricius 1787.

Coquereli Fairm. Ann. Fr. 1871, 43. (rossi bé.

Rhytidocephalus Chevrolat 1839

aulaconotus Chevr. R.Z. 1839, 175.

brevicornis Chevr. R.Z. 1839, 174.
Boh. Sch. Gen. Curc. V, 521.
(=madagascariensis Fähr. & Imh. [Tschyromerus] Gen. Curc. I, nº14.

madagascariensis Perroud Ann. Soc. Lin. Lyon 1853, 427.

Pterygostomus Lacordaire 1866.

opacus Chevr. R.Z. 1839, 179.
Lac. Gen. Atl. VIII, t. 77, f. 4, a, b.

Nothogaster Lacordaire 1866.

paradoxa Lacord. Gen. Col. VII, 450, note 2.
id. Gen. Atl. VIII, t. 77, f. 6 a.

Ceocephalus Schönherr 1833.

curvirostris Chevr. R.Z. 1839, 181,
Boh. Sch. Gen. Curc. V, 516.

fraterculus Kolbe Sits. Ges. Nat. fr. Berl. 1883, 77.

juicipes Ol. Ent. V, 84, 442, t. 2, f. 18 ♀.
Cyl. Sch. Gen. Curc. I, 356.
Gerst. Wiegm. Arch. 1871, I, 76.

Reichei Chevr. R.Z. 1839, 178.
Boh. Sch. Gen. Curc. V, 514.

Piazocnemis

‖ Centrophorus Chevrolat. 1839.
cf. Senna Bull. Soc. Ent. Ital. 1892.

1º Piazocnemis 3. str.

assiduus Kolbe St. E.Z. 1883, 382.

compressipes Chevr. R.Z. 1839, 181
Boh. Sch. Gen. Curc. V, 1840, 553.
Kolbe Sitz. Ges. Nat. Fr. Berl. 1883, 81
id. St. E.Z. 1883, 383.
Senna Bull. Soc. Ent. Ital. 1892,

(Striatulus Ol. de l'Inde or. est une espèce distincte
cf. Kolbe & Senna -

encaustes Boh. l.c. 552.
Kolbe St. E.Z. 1883, 384.

nigritus Klug [Brenthus] Ins. Madag. 196.
Kolbe l.c. 384.

picicornis Klug [Brenthus] l.c. 195.
Kolbe l.c. 385.

validirostris Kolbe St. E.Z. 1883, 383.

2e Synhomales Kolbe 1883.
Senna 1892.

aeneolus Kolbe St. E.Z. 1883, 387.

atratus Klug [Brenthus] Ins. Madag. 195.
Chevr. R.Z. 1839, 180.
Kolbe, St. E.Z. 1883, 386.

dives Fac. Gen. Col. VII, 1866, 454 note -
Kolbe St. E.Z. 1883, 387.

V. cylindricus Kolbe l.c. 388 -
V. striatopunctatus Kolbe l.c. 388.

rectirostris Kolbe, St. E.Z. 1883, 385.

[metallicus Chevr. [Centrophorus] = Amerismus convicau-
-datus Chevr.
cf. Kolbe St. E.Z. 1883, 388 & Senna Bull. Soc. Ent. Ital.
1892,

Stercosomus Lacordaire 1866.

decollatus Chevr. R.Z. 1839, 179.
Fac. Gen. Col. VII, 454, note 2.

Uropterus Lafreille 1825.

appendiculatus Boh. Sch. Gen. Curc. I, 358. (Réunion)
Fac. Gen. Col. VII, 458, note 2.

caudatus Latr. R. anim. 1817, IV, 188, t. 13, f. 7 - 1829, t. 3. f. 7.
Boh. l.c. V, 511. (Maurice (Réunion

codicillus Boh. Sch. Gen. Curc. V, 512 (Réunion.

Phacecerus Schonherr 1840

olivaceus Bob. Sch. Gen. Curc. V, 554.

planicaudatus Chevr. R.Z. 1839, 179.
Lac. Gen. Col. VII, 459 note 1.

Lemnolaemus Chevrolat 1839.

aeneicollis Chevr. R.Z. 1839, 177.

Zetojobloeus Lacordaire 1866

guttifer Bob. Sch. Gen. Curc. V, 548.
Lac. Gen. Col. VII, 461, note 2

pygionatus Chevr. R.Z. 1839, 178.
Lac. Gen. Col. VII, 461, note 1.

Amerismus Lacordaire 1866.

convicaudatus Chevr. R.Z. 1839, 176.

= metallicus Chevr. [Centrophorus] l.c. 177
Kolbe St. E.Z. 1883,
Senna Bull. Soc. Ent. Ital. 1892,

Hildebrandti Kolbe Sitz. Ges. nat. fr. Berl. 1883, 79.

Ozodeocerus Chevrolat 1839.

forficulatus Chvr. R.Z. 1839, 176.

pygmaeus Senna Bull. Soc. Ent. Ital. 1893, t 1, f. 5

rugicollis Chevr. l.c. 176

tricuspidatus Chevr. l.c. 176.

Pholidochloamys Lacordaire 1866.

madagascariensis Lac. Gen. Col. VII, 474, note 1.

Homales Kolbe 1883.

glaber Kolbe Sitz. Ges. nat. fr. Berl. 1883, 81

metallicus Kolbe l.c. 82.

SCOLYTIDAE

Hylurgus Latreille 1807.

amoenus C. Schauf. Tijdschr. 1891, 10.

Diamerus Erichson 1836.

hispidus Klug Ins. madag. [Hylesinus] 202.
chap. Syn. 106

Eutomus Lacordaire 1866.

madagascariensis Lac. Gen. Col. VII, 570, note 1.

Cryphalus Erichson 1836.

pallidus Eichh. B.E.Z. 1871, 131.

Cryphalomorphus

communis C. Schauf. Tijdschr. 1891, 12, t. 1, f. 4, 5.

Stephanoderes Eichhoff 1871.

communis C. Schauf. l.c. 11.

elephas Eichh. B.E.Z. 1871, 132 (Maurice

Triarmocerus Eichhoff

cryphaloides Eichh. Mém. Liége (2) VIII, ~~XXX~~ 119.

Xyleborus Eichhoff 1864.

armatus C. Schauf. Tijdschr. 1891, 30.

badius Eichh. B.E.Z. 1868, 280 (Maurice

cornutus C. Schauf. l.c. 17, t. 1 f. 6.

Eichhoffi C. Schauf. l.c. 25

madagascariensis C. Schauf. l.c. 23.

neptunus C. Schauf Tijdschr. 1891, 22, t. 1, f. 7.
spiculatus C. Schauf l.c. 28.
spinosus C. Schauf. l.c. 27, t. 1, f 8.

Coccotrypes Eichhoff

pygmaeus Eichh. Mém. Liége (2) VIII, 310
(Senég., manille, madag.

Pityophthorus Eichhoff 1864.

deprecator C. Schauf. Tijdschr. 1891, 15.
obtusus C. Schauf. l.c. 17.

Tomicus Latreille 1810.

Duponti Montrouz. Ann. Fr. 1861, 265 [Gen. dub.] (Nelle Calé.
[= badius et minutus Dej. Cat. (Madag.

Scolytoplatypus C. Schaufuss 1891

permirus C. Schauf. Tijdschr. 1891, 31

Platypus Herbst 1793.

madagascariensis Chap. Mon. 161 f. 74.
Roberti Chap. Mon. 183, f. 94.
truncatus Chap. Mon. 269 f. 161.

Mitosoma Chapuis 1866.

crenulatum Chap. Mon. 324, 197.
nigrum C. Schauf. Nung. Ot. III, 1890, 621.
robustum C. Schauf. l.c. 623.

CERAMBYCIDAE

Prionini

Parandra Latreille 1802.

comoriana Fairm. Bull. Fr. 1895, CCV.

Hoplideres Serville 1832.

+ aquilus Coq. Ann. Fr. 1859, 254, t. 7, f. 2.
Fairm. Ann. Fr. 1871, 57.

Grandidieri Fairm. Ann. Belg. 1894, 146.
Künck. Hist. Madag. t. 46, f. 2.

laevicollis Pasc. A. M. N. H. (3) XIX, 1867, 412.

+ rugicollis Waterh. Cist. Ent. II, 289.
Künck. l. c. t. 53, f. 6.

+ spinipennis Serv. Ann. Fr. 1832, 148.
Klug Ins. Madag. 205 ♀
Coq. Ann. Fr. 1859, 254.
Künck. l. c. t. 46, f. 1.
Fairm. Ann. Fr. 1871. 57.

Macrotoma Serville 1832

Waterh. A. M. N. H. (5) XIV, 1884, 376.

x = senegalensis

asperata C. Waterh. A. M. N. H. (5) V, 1880, 411.

castanea Ol. Ent. IV, 66, 23, t. 8, f. 28, 29.x (Maurice. xx

xx l'espèce de Maurice a bien des rapports

Olivier a figuré sous ce nom 2 espèces sans localités!

corticina Schön. Syn. Ins. I, 3, 345. (Guinée
Klug. Ins. Madag. 204.
* Coq. Ann. Fr. 1862, 107, t. 3, f. 4, a.
= jejuna Kunckel l. c. t. 45 f. 1. 2.
= cinnamomea Ol. Ent. IV, 66, 20, t. 5. f. 18. avec noir d. ~~ex~~ Oliv.
Fairm. Ann. Fr. 1868. 819.

Gowani C. Waterh. A. M. N. H. (5) XIV, 1884, ~~[illegible]~~ 384.

crassa Fairm. Ann. Fr. 1868, 820.
Künck l. c. t. 45, f. 3.

gracilicornis C. Waterh. A. M. N. H. (5) IX, 1882, 47.

jejuna Klug Ins. Madag. 204, t. 5, f. 2.
Fairm. Ann. Fr. 1868, 819.
~~Künck. l. c. t. 45, f. 1, 2.~~

laeta C. Waterh. A. M. N. H. (5) V, 1880, 410.

laevis Fairm. Ann. Fr. 1868, 820.
Künck. l. c. t. 45, f. 4.

mutica C. Waterh. A. M. N. H. (5) V, 1880, 414.

obscura C. Waterh. A.M.N.H. (5) V, 1880, 410.

palmata F. Ent. Syst. I, 2, 249. (Sénégal
Lap.-Cast. Hist. Nat. II, 400.
Künck Hist. Madag. t. 47, f. 1, 2.
= senegalensis Ol. Ent. IV, 66, p. 22, t. 7, f. 25. a ♂, b ♀.
= spinipes Ill. Mag. IV, 107.

Pfeifferae C. Waterh. l.c. 412.

rudis Fairm. Ann. Fr. 1868, 820.

simplex C. Waterh. A.M.N.H. (4) XVIII, 1876, 121 (Rodrigue
id. Phil. Tr. R. Soc. CLXVIII, 1879, 531.

sodalis C. Waterh. A.M.N.H. (5) V, 1880, 413.
id. l.c. (5) IX, 1882, 48.
tenuelimbata Nonfried Ent. Nachr. 1892, 139. (? = Hoploderes aquilus)

vicina C. Waterh. l.c. 412.

Watersi C. Waterh. A.M.N.H. (5) XIV, 1884, 385.

Wrighti C. Waterh. A.M.N.H. (5) V, 1880, 414 (Séchelles.
Lameere Bull. Fr. 1893, CV.

Mallodon Serville 1832.

Downesi Hope A.M.N.H. ( ) XI, 1843, 366. Guinée
(et syn.)
> Brancsik nossi bé

+ proximus Thoms. Révis. 97. (? = Downesi sec. Fairmaire). ça n'est pas exact. je possède 2 espèces de Madag.

Platygnathus Serville 1832

+ octangularis Ol. Ent. IV, 66, 1795, p. 33, t. 6, f. 19 ♀;
t. 13, f. 54 a ♂, b ♀. (Maurice
Künck. l.c. t. 45 f. 5, 6.

+ parallelus Serv. Ann. Fr. 1832, 151. (Maurice
Lac. Gen. Col. 1869, 142, note 2.

Closterus Serville 1832.

+ flabellicornis Serv. Ann. Fr. 1832, 194.
Klug, Ins. Madag. 205
Fairm. Ann. Fr. 1871, 56.
Lucord. Gen. Atl. IX, t. 82, f. 2.
Künck l.c. t. 45 f. 7, 8.

= ♀ Gerrandi Pasc. [Prionus] A.M.N.H. (3) XIX, 1867, 411.

+ Janus Thoms. R.Z. 1877, 263.

longiramis Gahan A.M.N.H. (6) VI, 1890, 458.

major C. Waterh. A.M.N.H. (4) XV, 1875, 413
Künck. Hist. Madag. t. 53, f. 11.

+ oculatus Gahan Tr. Ent. Soc. 1890, 297.

+ serraticornis Gahan l.c. 298.

Megopis Serville 1832.

Coquereli Fairm. Le Nat. 1880, 300 (Réunion.

Lacordairei Lameere Ann. Belg. 1885, CR XII. (Maurice

modesta White [Pachypleura] Cat. Longic. 27. +
Fairm. Ann. Fr. 1871, 56. (Natal & Madag.
thoms où?

Tereticus Waterhouse Cist. Ent. II, 534.

antennalis Gah. A.M.N.H. (6) VI, 1890, 459.

pectinicornis Waterh. Cist. Ent. II, 535.

+ rufulipennis Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. 1889.

Cerambycini

Xystrocera Serville 1834

globosa Ol. Ent. IV, 67, p. 27, t. 12, f. 81. (Maurice
Coq. Ann. Fr. 1848, 180, t. 7, IV, f. 2 a-b.
Künck. l.c. t. 47, f. 5.
= vittata F. Ent. Syst. I, 2, 323. (Sénégal.

Teraschema Thomson 1860

Menalcas Thoms. Class. Longic. 199.
Lac. Gen. Col. 1869, 254, note 1.

Opsamates Ch. Waterhouse 1879.

dimidiatus Ch. Waterh. Tr. Ent. Soc. 1879, 265.
aid, t. 171, f. 7.
Künck. l.c. t. 53, f. 3.

purpureipennis Ch. Waterh. l.c. 1880, 60.
aid, t. 171, f. 8.

J. fonde une espèce Comores –

(? = Coquereli sec Fairm.)

mutica Serv. Ann. Fr. 1832 p. 162
Cast. Hist. Nat. II p. 399
Latr. Dej. Cat. 3. ed. p. 343 Maurice.

+ L'espèce de White et celle de Thomson ne sont probabt pas les mêmes.

cf. Lameere Bull. Fr. 1893, CV.
l'espèce du Sénégal n'est pas celle de Maurice, par plus que celle de l'Inde c'est archifaux!

Arrhythmus Waterhouse 1878.

† pallimembris Fairm. Le Nat. (2) II, 1888, 22, f. 1.
Künck. Hist. Madag. t. 52, f. 5
† punctatus Gahan A. M. N. H. (6) VI, 1890, 461.
† rugosipennis Waterh. Cist. Ent. II, 289, 1878.
Künck. l.c. t. 47, f. 9.

Stromatium Serville 1834.

barbatum F. (et syn.) (Inde or., Siam, Maurice

Anisogaster Deyrolle 1862.

flavicans Deyr. Maill. Note Réun. 19, t. 20, f. 6. (Réunion
= pilicornis Ol. Ent. IV, 70, 68, t. 8, f. 99 (Soie)
luteosparsus Fairm. Le Nat. 1880, 300. (Réunion.
myrmido Fairm. Ann. Fr. 1871, 60. (Mayotte
signifer Fairm. Le Nat. 1880, 300 (Réunion.
unicolor Deyr. l.c. 20 (Maurice.

Ceresium Newman 1842.

albopubens Fairm. Bull. Fr. 1891, CLXXXII. (Séchelles.
> Sameere Bull. Fr. 1893, CV. (Séchelles.
simplex Gyll. (et syn.) (Océanie, Australie, etc.
Künck. l.c. t. 47, f. 6, 7.
> Sameere l.c. CV. (Séchelles, etc.

Obrium Serville 1834.

[obsoletum Dej. Cat. 3e ed. 358 (Maurice.

Smerinus Gahan 1890

granuliferus Gahan A. M. N. H. (6) VI, 1890, 460.

Myacopterus Fairmaire 1893.

† rufosericans Fairm. Ann. Belg. 1893, 521.

Erichromia Fairmaire 1892.

† Oberthuri Fairm. Bull. Fr. 1892, XXI.

Anthribola Bates 1879.

+ decorata Bates Ent. M. M. 1879. 251.
Ch. Waterh. A. M. N. H. (5) IX, 1882, 49.
Dohrn, St. E. Z. 1890, 198.

+ femorata Ch. Waterh. A. M. N. H. (5) IX, 1882, 49.
Künck. Hist. madag. t. 52 f. 8.

Sagridola Thomson 1860.
Fairmaire Ann. Fr. 1871, 77.

+ flavicollis Ch. Waterh. Cist. Ent. II, 367. = anthribola
id. A. M. N. H. (5) IX, 1882, 50.
Künck. Hist. Madag. t. 52, f. 7.
Fairm. Ann. Belg. 1893, 511.

+ luctifera Fairm. Ann. Belg. 1893, 510. (anthribola) = anthribola

- maculosa Guér. Ic. R. Anim. 252 [Toxotus].
Fairm. Ann. Fr. 1871, 77.
Künck. l.c. t. 49. f. 10, 11.
Dohrn. St. E. Z. 1890, 196.

- plagiaticollis Fairm. Ann. Belg. 1893, 510. (anthribola) = anthribola

quinquemaculata Ch. Waterh. A. M. N. H. (4) XV, 1875, 414.
[id. A. M. N. H. (5) IX, 1882, 49.
id. A. M. N. H. (5) V, 1880, 214 (sans citer descr. anter.)
Künck. l.c. t. 49. f. 9.

- sulphurata Fairm. Ann. Belg. 1893, ~~XXII~~ 509.

Eccrisis Pascoe 1888.

abdominalis Pasc. Tr. Ent. Soc. 1888, 499, t. 14, f. 3.

Leptura Linné 1758.

nobilitata Nonfried D. E. Z. 1891, 274.

Mastodontodera Thomson 1857.

anticipes Fairm. Ann. Belg. 1893, 513 [Mastodera]

coccinea Bates Ent. M. M. XV, 1879, 252.
Künck. l.c. t. 49. f. 5.

difformipes Bates Ent. M. M. 1879, 252.

Jansoni Ch. Waterh. A. M. N. H. (5) IX, 1882, 50.
Künck l.c. t. 54, f. 5.

lateralis Guér. Ic. R. Anim. 252.
Thoms Class. Longic. 158.
Dohrn. St. E. Z. 1890, 196.
Künck. l.c. t. 49, f. 7

= nodicollis in Cat. Gemm. Har.

la sépare de nodicollis.
nodicollis var. lateralis.

+ nodicollis Klug Ins. Madag. 209. t. 5, f. 9. [Toxotus]
Fairm. Ann. Fr. 1871, 76.
Künck, Hist. Madag. t. 49, f. 6.

[= basalis d'Urk. Dej. Cat. 3e éd. 380
Thoms. Arch. Ent. I, 318. species distincta

+ rufosericans Fairm. Ann. Belg. 1893, 550. (Comores

simplicicollis Gahan A. M. N. H. (6) VI, 1890, 462.
+ Fairm. Ann. Belg. 1893, 513.

testaceipes Fairm. CR. Belg. 1889, XCV.
Künck. l.c. t. 49, f. 4.

+ tibialis Fairm. Ann. Belg. 1894, 148.

+ transversalis Fairm. CR. Belg. 1889, XCV.

vidua Künck. l.c. t. 54, f. 6. — Mastodontodera?

Toxotinus Fairmaire 1893.

+ russus Fairm. Ann. Belg. 1893, 513.
sericeus Guér. Ic. R. Anim. 253. [Toxotus]
Fairm. Ann. Fr. 1871, 77.
Dohrn, St. E. Z. 1890, 197.
Künck. l.c. t. 49, f. 1, 2. — les figures appartiennent à Lepéres.

stigmatipennis Fairm. Le Nat. (2) I, 1887, 71. [Toxotus]

subustus Fairm. Ann. Belg. 1893, 513.

+ vinosus Fairm. l.c. 512.

Artelida Thoms

~~Fairmaire Ann. Fr. 1871, 76.~~ c'est la copie exacte de Thomson pourquoi répéter?

aurosericea Ch. Waterh. A. M. N. H. (5) IX, 1882, 326.
Künck. l.c. t. 53, f. 13
asperata Ch. Waterh. l.c. (5) V, 1880, 415.
Künck. l.c. t. 53, f. 12.

crinipes Thoms. Syst. Ceramb. 143.
Fairm. Ann. Fr. 1871, 77.

diversitarsis Fairm. — Décrite?

+ pernobilis Neerv. Not. Leyd. Mus. XII, 1890, 8.

Scariotis Pascoe 1888.

fulvicornis Pasc. Tr. Ent. Soc. 1888, 498.

scapularis Pasc. l.c. 498, t. 14, f. 4

+ subsulcata Fairm. Ann. Belg. 1895, 514.

unicolor Pasc. l.c. 497.

Scopanta Fairmaire 1893.

+ rufula Fairm. Ann. Belg. 1893, 515.

Scariates Fairmaire 1894

+ basipennis Fairm. Ann. Belg. 1894, 148.

Logisticus Waterhouse 1878.

angustatus Ch. Waterh. A.M.N.H. (5) V, 1880, 417
Künck Hist. nodag. t 54, f. 2.

latesulcatus Fairm. & Nat. 1887, 71 f. 6.
Künck l.c. t. 52, f. 11.

modestus Ch. Waterh. A.M.N.H. (5) X, 1882, 45.
Künck. l.c. t. 54, f. 4.

nivosus Fairm. Ann. Fr. 1893, 516.

Oberthuri Fairm. CR. Belg. 1889, XCV.

obscurus Ch. Waterh. A.M.N.H. (5) V, 1880, 418.

pachydermus Fairm. Ann. Belg. 1893, 516.

rostratus G Waterh. Cist. Ent. II, 291, 1878.
Dohrn. St. E.Z. 1883, 160.
Künck. l.c. t. 47, f. 10.

sesquivittatus Fairm. & Nat. 1888, 23, f. 2.
Künck. l.c. t. 52, f. 12.

? = suturalis.

simplex Ch. Waterh. A.M.N.H. (5) V, 1880, 417.
Künck. l.c. t. 54, f. 3.

= Dysmathosoma picipes Waterh.

spinipennis Fairm. Ann. Belg. 1893, 515.

suturalis Ch. Waterh. A.M.N.H. (5) V, 1880, 416.

Pachysticus Fairmaire 1889.

- crassipes Fairm. CR. Belg. 1889, XCV.

Harimius Fairmaire 1889.

- atripennis Fairm. CR. Belg. 1889, XCVI.

Musius Fairmaire 1889

quadrinodosus Fairm. CR. Belg. 1889, XCV.
Künck t. 53, f. 5.

Apheledes Pascoe 1888

+ stigmatipennis Fairm. 1887

+ = velutinus Pasc. Tr. Ent. Soc. 1888, 500, t. 14, f. 9.

= stigmatipennis Fairm. sec Fairm. Higehan

guttulatus Fairm

Aedoeus Ch. Waterhouse 1880

geniculatus Ch. Waterh. A.M.N.H. (5) V, 1880, 416.
Künck. Hist. Madag. t. 52, f. 6.

Pseudogenes Fairmaire 1894

+ ornaticeps Fairm. Ann. Belg. 1894, 149.

Antigenes Pascoe 1888.

+ funebris Pasc. Tr. Ent. Soc. 1888, 500, t. 14, f. 1.
Künck. l.c. t. 53, f. 4.

+ morosus Fairm. Ann. Belg. 1894, 148.

+ Penthocaulus Fairmaire 1894

tenebrosus Fairm. Ann. Belg. 1894, 150.

Criocerinus Fairmaire 1894

+ corallinus Fairm. Ann. Belg. 1894, 151.

Euthymius Waterhouse 1878.

dubius Waterh. Cist. Ent. II, 294.

Dysmathosoma Waterhouse 1882.

+ picipes Ch. Waterh. A.M.N.H. (5) IX, 1882, 423.
+ Künck. l.c. t. 54 f. 7 [Dysmalliosoma err.]

= Logistiaus sesquivittatus Fairm

Tomobrachyta Fairmaire 1887.

+ nigroplagiata Fairm. Le Nat. 1887, 72, f. 7.
Künck. l.c. t. 52, f. 10.

Appedesis Ch. Waterhouse 1880.

vidua Ch. Waterh. A.M.N.H. (5) V, 1880, 418.

Nesopsebium Fairmaire 1894.

apicipenne Fairm. Ann. Belg. 1894, 151.

Anomoderus Fairmaire 1871

Coquereli Fairm. Ann. Fr. 1871, 60.

Hadimus Fairmaire 1889

cartalloides Fairm. CR. Belg. 1889, XCIV.

Mattania Fairmaire 1894

maculicollis Fairm. Ann. Belg. 1894, 147.

Philematium Thomson 1864.

femorale Ol. Encycl. méth. V, 1790, 297. (Maurice
id. Ent. IV, 1795, 67, p. 29, t. 7, f. 45.
Lap.-Cast. Hist. nat. II, 436.
Thoms. Syst. Ceramb. 171.
Künck. Hist. Madag. t. 48, f. 11.
=[albitarsum F. Syst. El. II, 267. (Caffrerie
Fåhrs Öfv. Vet. Ak. Förh. 1872, n° 1, 59.
=albotarsum Weber obst. Ent. 86. (Madag.
[V. leucodactylum Chevr. (Cuba.

Cheridamus Fairmaire 1889.

†hypargyreus Fairm. CR. Belg. 1889, XCIII. = Ochimus argentatus Thoms
Künck. l.c. t. 48, f. 9. cap. ~~Sénégal~~.

Euporus Serville 1834.

viridis Serv. Ann. Fr. 1834, 21.
Lacord. Gen. Col. IX, 1869, 29, note.
[= madagascariensis Dej. Cat.

Agada Fairmaire 1892

clavicornis Fairm. Bull. Fr. 1892, CLXXI.

Prionopsis Fairmaire 1886.

metallicolor Fairm. Ann. Fr. 1886, 85.

Callidium Fabricius 1775

subcostatum Fairm. Ann. Fr. 1871, 57.

Clytus Laicharting 1784. ou Xylotrechus Chevrolat)

Coquereli Fairm. [Xylotrechus] Ann. Fr. 1871, 58.

prolixus Fairm. [Xylotrechus] l.c. 59.

Chlidones Ch. Waterhouse 1879.

+ lineolatus Ch. Waterh. Tr. Ent. Soc. 1879, 321.

Septocera Serville 1834.
= Glaucytes Thomson } in Catal. Gem. Har.
= Iresioides Thomson }

basalis Gahan [Glaucytes] A.M.N.H. (6) VI, 1890, 462.

Beaumonti Desj. mon. 468 (Réunion.

coadunata Fairm. CR. Belg. 1889 XCIII.
(err. scrip. coadnata)
id. Ann. Belg. 1894, 152.
Künckel Hist. madag, t. 47, f. 3.

ferox Thoms. Arch. Ent. I, 1857, 423.
Fairm. Ann. Fr. 1871, 63 (forte). [Glaucytes (Iresioides Thoms?)]

flavovittata Waterh. Tr. Ent. Soc. 1880, 61
Künck. l.c. t. 52, f. 3.

humeralis Bug. Guér. Ic. R. Anim. 251.
Lap.-Cast. Hist. Nat. II, 490.
Fairm. Ann. Fr. 1871, 62 [Glaucytes].

interrupta Ol. Encycl. Méth. VII, 1872, 468. (Maurice.

= caelata Ol. Ent. IV, 67, 99. t. 11, f. 79, a, b, ♀.
t. 12. f. 79, b. ♂.

= scripta F. Ent. Syst. Suppl. 143
Lap.-Cast. Hist. Nat. II, 490
> Fairm. [Glaucytes] Ann. Fr. 1871, 62

lineatocollis Fairm. [Glaucytes] Ann. Fr. 1871, 62.
Künck. l.c. t. 51, f. 1.

lineatopunctata Ch. Waterh. A.M.N.H. (5) V, 1880, 419.
Künck. l.c. t. 52, f. 1.

+ Mezieri Desj. mon. 498.

pulchra Ch. Waterh. A.M.N.H. (5) IX, 1882, 327.
Künck. l.c. t. 52, f. 4.

rufofemorata Ch. Waterh. l.c. 327.
Künck. l.c. t. 52, f. 2.

sericeovittata Ch. Waterh. [Iresioides] A.M.N.H. (5) V, 1880, 215.
Künck. l.c. t. 47, f. 4.

Thaumasocerus Fairmaire 1871.

platycerus Fairm. Ann. Fr. 1871, 61.

Iresioides olim! Thomson a conservé ce genre pr des espèces de l'Inde

Desjardins Mon. A.M.N.H. 1838, 468.
ou Glaucites?

\+ **Zulphis** Fairmaire 1893.

subfasciata Fairm. Ann. Belg. 1893, 518.

Phelocalocera Blanchard 1845.

peregrina Thoms. Arch. Ent. I, 1857, 316 et 394.
Künck. Hist. Madag. t. 48, f. 8.

Apharsatus Fairmaire 1893.

fallaciosus Fairm. Ann. Belg. 1893, 519.
Künck. l.c. t. 47, f. 8.

Nethinius (voir à la fin des Cerambycidae) p. 214.

Lamiini

Cyepharus Pascoe 1868 — ? = Lophoptera sec Fairm.

signator Pasc. Proc. Ent. Soc. 1868, 13.

Lophoptera Perroud 1855.

tridentata Chevr. Silb. Rev. I, 1833, n° 9, t. 7 [Monohammus].
Fairm. Ann. Fr. 1871, 64.
Künck. l.c. t. 50, f. 1, 2.

[= signata Dej. Cat.

Batocera Laporte-Castelnau 1840.

rubus L. (et syn.) (Inde or, Réunion, etc. — cf. Ritzema Tijdschr. 1885, 104.
Künck. l.c. t. 50, f. 10.

Ancylonotus Laporte-Castelnau 1840.

hieroglyphicus Fairm. Ann. Belg. 1895, 38.

Lasiopezus Pascoe — sub Baraeus Thoms. 1858 in Cat. G. H.

insularis Fairm. Ann. Belg. 1893, 551 (Comores.

Sternotomis Westwood 1836.

cornutor F. Syst. Ent. 177.
Ol. Ent. IV, 67, p. 61, t. 17 f. 132.
Klug Ins. Madag. 205.
Künck. l.c. t. 50, f. 9. — et t. 50, f 8: maculata; 2 esp. distinctes.
= maculata Ol. Ent. IV, 67, p. 68, t. 22, f. 174, a, b, & ♀.
Lap.-Cast. [Stellognatha] Hist. Nat. II, 474.
= maculator Schönh. Syn. Ins. I, 3, 386.

Fairm. Ann. Fr. 1871. 6
[illegible] Pl. VI fig. 49.
67, 68
[illegible] olivier.

Levassori Fairm. Bull. Fr. 1894, CCLIII (Comores.

Thomsoni Bug. Ann. Fr. 1855, 77, t. 7, II.
id - Physis I. 6, p. 176.
Künck. Hist. Madag. t. 50, f. 7.

Psathyrus Gahan 1890.

longipennis Gahan Tr. Ent. Soc. 1890, 321.

Tragocephala Laporte-Castelnau 1840.

+ Alluaudi Lameere Bull. Fr. 1893, CVI. (Séchelles
White Pr. Z. S. 1856, 13 t. 40, f. 2 (natal
Chevrolati* Künck. l.c. t. 46, f. 8.
= Bowringi Thoms. Mon. 32, t. 5, f. 8; t. 6, f. 1-3.
+ citrinella Fairm. Ann. Belg. 1894, 153.
+ Freyi Brancsik Jahr. Trencsén. 1893, 242, t. 11, f. 4 a.
Fairm. Ann. Belg. 1894, 155.
+ Io Thoms. Ann. Fr. 1879 Bull. LVII.
= nobilis Kunckel l.c. t. 54. f. 10. var t. 46. f. 5.
+ jucunda Gory Ann. Fr. 1835, 139, t. 2, A, f. 1.
Thoms. Mon. Arch. Ent. I, 1857, 28, t. 4, f. 2-3.
Künck. l.c. t. 46, f. 3.

v. madagascariensis Künck. l.c. t. 46, f. 4.

+ nigropicta Fairm. Ann. Belg. 1893, 551 (Comores.

nobilis F. Mant. Ins. I, 138. (Sénégal
Ol. Ent. IV, 67, p. 87, t. 11, f. 76.
Lap.-Cast. Hist. nat. II, 473.
Thoms Mon. l.c. 30, t. 5, f. 3.
Künck. l.c. t. 54 f. 10. — var. t. 46, f. 5.

+ nubeculosa Fairm. Ann. Belg. 1894, 154.

+ ochreata Fairm. Ann. Belg. 1894, 153

+ oculicollis Fairm. Ann. Belg. 1894, 154

variegata Bertol. Nov. Comm. Ac. Bonon. X, 1849, 403, t. 3, f. 9. (Mozambique
Gerst. Peters Reise 1862, 327, t. 19, f. 11-12.
Künck l.c. t. 46, f. 6. — var. t. 46, f. 7.
= Venusta Thoms. Mon. 30, t. 5, f. 5.

t. 46 fig 7 n'est pas une variété de variegata c'est une espèce bien distincte.

Rhaphidopsis Gerstäcker 1855.

+ pulchra Ch. Waterh. A. M. N. H. (5) VI, 1880, 461.
Künck. l.c. t. 54, f. 9.

t. 46 f. 8 n'est pas chevrolati
ça a tout à fait apparence
d'une espèce de guinée.
que je possède sans nom,
ou c'est castnia Thomson.

+ heteroclita Thoms arch. ent. Pl. IV fig. 4.

est assurément une espèce bien distincte
je ne la connais pas.

n'est pas malgache

Callimation Blanchard 1845.

venustum Guér Ic. R. Anim. 238.
Fairm. Ann. Fr. 1871, 66.
Künck. Hist. Madag. t. 46, f. 9.

= *callipygum* Thoms. Arch. Ent. I, 37, t. 6, f. 7.

Cedemon Gahan 1890.

tristis Gahan a. M. N. H. (6) VI, 1890, 463.

Phymatosterna Saporte-Castelnau 1840.

cyaneoguttata Fairm. Ann. Fr. 1886, 86.

lacteoguttata Sap.-Cast. Hist. Nat. II, 473.
Fairm. Ann. Fr. 1871, 64.
Künck. l.c. t. 51, f. 9.

maculifrons Gahan Ann. Ent. Soc. 1890, 318. — an. G. Tanylamia ?

rufocastanea Fairm. CR. Belg. 1889, IX.

*

[*distincta*
humeralis
sexpunctata] } sont des Eumimetes sec. Fairmaire

Phryneta Saporte-Castelnau 1840.

atricornis Fairm. Ann. Belg. 1893, 551. (Comores)

marmorea H. Encycl. méthod. VII, 1792, 461.
id. Ent. IV, 67, 1795, p. 78, t. 2, f. 9.
Sap.-Cast. Hist. Nat. II, 1840, 477.
Künck. l.c. t. 51, f. 11.
Fairm. Ann. Fr. 1871, p. 66.

semicribrosa Fairm. Bull. Fr. 1894, CCLIII, (Comores.

Eigrana Fairmaire 1894.

lacturia Fairm. Ann. Belg. 1894, 157

lateritia Fairm. l.c. 157. — Coll. Fairmaire

nervulata Fairm. l.c. 157. — Coll Fairmaire

Chaumasesthes Fairmaire 1894.

penicillus Fairm. Ann. Belg. 1894, 156.

Acmocera Thomson 1858.

inaequalis Thoms. Syst. Cerambc. 1864, 47.
Fairm. Ann. Fr. 1871, 72.

Protorrhopala Thomson 1860.

sexnotata Klug. Ins. Madag. 206. t. 5, f. 3 [Lamia]
Fairm. Ann. Fr. 1871, 66.
Künckl. Hist. Madag. t. 50, f. 3.

= cretacea Cog. R. Z. 1851, 89.
id. Ann. Fr. 1852, 397.

elegans Künckl. l.c. t. 46, f. 10.

Olenecamptus Chevrolat 1835.

bilobus F. (et syn.) (Australie, Ceylan, Java)
Fairmaire Bull. Fr. 1893, CVII. (Séchelles.

Idactus Gahan 1890.

Elliotí Gah. Tr. Ent. Soc. 1890, 312

Tropidema Thomson 1864.

chrysocephala Cog. R. Z. 1851, 90.
id. Ann. Fr. 1852, 400. [Sphenura]
Thoms. Syst. Cerambc. 89.

Eumimetes Lacordaire 1872.

albisparsus Gahan A. M. N. H. (6) VI, 1890, 464.

bioculatus Fairm. CR. Belg. 1889, XCVI.
id. Ann. Belg. 1894, 152.

distinctus Fairm. Ann. Fr. 1871, 65 [Phymasterna]

fulvovestitus Fairm. Ann. Belg. 1893, 552 (Comores.

humeralis Vollenh. Rech. Faune Madag. 1869, 10, t. 2, f. 1. [Phymasterna ?]

= sexpunctatus Fairm. Ann. Fr. 1871, 65
Künckl. l.c. t. 51, f. 5.

Johannae Gahan Tr. Ent. Soc. 1890, 322.
Fairm. Ann. Belg. 1893, 552. (Comores.

sparsus Klug Ins. Madag. 207, t. 5 f 5 [Tamia]
Fairm. Ann. Fr. 1871, 66.
Künck Hist. Madag. t. 51, f. 3. – var. t. 51, f. 4.

= vagepictus Fairm. Ann. Fr. 1871, 65. [Phymasterna]

v. fasciatus Brancsik Jahr. Trencsén. 1893, 242, t. 12, f. 17.

Solymus Lacordaire 1872.

pictor Lacord. Gen. Col. IX, 2, 508, note 2.
Fåhrs, Öfvers. Vet. Ak. Förh. 1872, n° 2, 39.

(est une espèce Cap. mais non de Madag. comme l'a faussement dit Lacordaire.

Geteuma Thomson 1864.

= Orica Pascoe 1888 (sec. Fairmaire).

quadridentata Coq. R. Z. 1851, 89. [Phymasterna] × type obv.
id. Ann. Fr. 1852, 398.
Thoms. Syst. Ceramb. 66.
Fairm. Ann. Fr. 1871, 64.

+ albovirgulata Fairm. Le Nat. * 1888, 23, f. 3. [Zygocera?] species distincta!
Künck [Zygocera] l. c. t. 52, f. 9.

nota: Pascoe (Tr. Ent. Soc. 1888) met encore dans son G. Orica, l'Eumimete Johannae Gahan.

Brachytatus Fairmaire 1894.

+ limbolarius Fairm. Ann. Belg. 1894, 159.

+ niviplagiatus Fairm. l. c. 159.

Ranova Thomson 1864

fuscosignata Fairm. Ann. Fr. 1886, 86.

pictipes Thoms. Syst. Ceramb. 64.
Fairm. Ann. Fr. 1871, 71.
Künck. l. c. t. 53, f. 7.

= lineigera Fairm. CR. Belg. 1889, VIII.
(sec. Fairm.) –

Metretes Thomson 1864

[inaequalis Thoms. etc (cf. Acmocera p. 208)

= acmocera in Cat. Gem. Har.
erreur grossière,
insecte de guinée.
pas de rapports avec acmocera.

Leucographus Waterhouse 1878

albovarius waterh. Cist. Ent. II 295, 1878.
Kunck. Hist. Madag. t. 51, f. 8.

= pyramidalis Fairm. [Coptops] St. E. Z. 1884, 139.
cf. Fairm. Ann. Fr. 1886, 86.
Künck. l.c. t. 53, f. 8 (comme variété de variegatus. err.)

variegatus Waterh. Cist. Ent. II, 368, 1878.
Künck. l.c. t. 51, f. 7.

?= nigropictus Fairm. [Coptops] Ann. Fr. 1886, 85.

Coptops Serville 1835.

bidens F. Syst. Ent. 177 (Inde or.

= aedificator F. Ent. Syst. I, 2, 275.
Lap.-Cast. Hist. Nat. II, 467.
Fairm. Ann. Fr. 1871, 68. (Madag. etc.

chlorotica Fairm. Ann. Fr. 1871, 68.
Künck. l.c. t. 53, f. 2. (var. de bidens)

dentata ol. Encycl. Méthod. VII, 1792, 469. (Réunion.

= spinipes ol. Ent. IV, 67, p. 103, t. 10, f. 66. (id.

humerosa Fairm. Ann. Fr. 1871, 69 (Séchelles.
Sameere Bull. Fr. 1893, CVI.

liturata Klug. Ins. Madag. 206, t. 5, f. 4 [Tamia]
Fairm. Ann. Fr. 1871, 67.
Künck. l.c. t. 51, f. 6. (var. de bidens).

nigropunctata Fairm. Ann. Fr. 1871, 68 (Mayotte.

*

[nigropicta Fairm.
pyramidalis Fairm } ♀ Leucographus Lac. Fairm.

Madecops Fairmaire 1871

† albostrigosus Fairm. Ann. Belg. 1893, 552 (Comores. 120

pruinosus Fairm. Ann. Fr. 1871, 70 (Mayotte.

Pasiocercis Ch. Waterhouse 1882.

† fasciata Ch. Waterh. a. m. n. H. (5) IX, 1882, 420.
Künck. l.c. t. 54, f. 11.

Dioristus Ch. Waterhouse 1882.

albolateralis Ch. Waterh. A.M.N.H. (5) X, 1882, 47.
Künck. Hist. Madag. t. 50, f. 6.

Praonetha Pascoe 1865

biangulata Fairm. [Oopsis] Ann. Belg. 1893, 553 (Comores.

ephippiata Fairm. [Oopsis] Ann. Fr. 1871, 72. (Mayotte

geminata Klug Ins. madag. 208, t. 5, f. 7 [Saperda].
Fairm. Ann. Fr. 1871, 74. [Oopsis].

nervosa Fairm. Ann. Fr. 1871, 72. [Oopsis] (Mayotte.

obsoleta Fairm. Ann. Fr. 1871, 67. (Mayotte.
Künck. l.c. t. 50, f. 4.

*

[distigma Fairm. G. Apomecyna (nec Fairm.) p. 212.

[Oopsis Fairmaire 1850.]

[biangulata Fairm. G. Praonetha.

[ephippiata Fairm. G. id.

[Geminata Klug. G. id.

[guttulata Fairm. G. Apomecyna, p. 212.

[nervosa Fairm. G. Praonetha.

Micracantha Montrouzier 1861.

Desjardinsi Fairm. CR. Belg. 1889, XCVI.

madecassa Künck. l.c. t. 50, f. 3.

Atybe Pascoe 1864.

nigritarsis Pasc. Tr. Ent. Soc. 1888, 504.

Plantei Pasc. Journ. Ent. II, 1866, 281, t. 13, f. 6.
Künck. l.c. t. 51, f. 12.

Stenosoma Mulsant 1839

apicalis Gahan A.M.N.H. (6) VI, 1890, 464.

Apomecyna Serville 1835.

+ adspersa Thoms. Phys. I, 6, 1868, 160. (Mauria.

+ distigma Fairm. [Praonetha] Ann. Belg. 1893, 553. (Comores.

guttulata Fairm. [Oopsis] Ann. Fr. 1871, 73.
Künck. Hist. Madag. t. 53, f. 9.

+ obliquata Klug. Ins. Madag. 207, t. 5, f. 6.

Sechellarum Fameere Bull. Fr. 1893, CVI.

Diadelia Ch. Waterhouse 1882

† biplagiata Ch. Waterh. A.M.N.H. (5) IX, 1882, 421.
Künck. l.c. t. 54, f. 8.

X-fasciata Gahan A.M.N.H. (6) VII, 1890, 465.

Sulenus Lacordaire 1872.

X humeralis Lacord. Gen. Col. IX, 2, 639, note 1.
Künck. l.c. t. 51, f. 2.

Mythergates Thomson 1867

X divaricatus Coq. [Centrura] R.Z. 1851, 90.
id. Ann. Fr. 1852, 402.
Thoms. Physis I, 1, 19, note 1.

Auxa Pascoe 1860

X armata Coq. R.Z. 1851, 90. [Centrura]
id. Ann. Fr. 1852, 401, t. 9, f. 9.
Fairm. Ann. Fr. 1871. p. 64.
= amplicollis Pasc. Journ. Ent. I, 130, t. 6, f. 2.

Styne Lacordaire 1872

divaricata Lac. Gen. Col. IX, 2, 648, note 2.

Coedomaea Thomson 1868.

madagascariensis Thoms. Physis I, 6, 164.

Hippopsis Serville 1825

quadricollis Fairm. Ann. Fr. 1871, 75.

Tanylamia Pascoe 1886

melanura Pasc. A. M. N. H. (5) XVII, 1886, 244.

Nicarete Thomson 1864

brunnipes Thoms. Syst. Ceramb. 329.
Fairm. Ann. Fr. 1871, 75. — Boj. 143 —

Goephanes Pascoe 1862

luctuosus Pasc. Journ. Ent. I, 1862, 334. t. 17. f. 8.
Künck. Hist. Madag. t. 51, f. 10.

Ancylistes Chevrolat 1863.

bellus Gahan A. M. N. H. (6) VI, 1890, 465.

bicuspis Chevrol. Arch. Ent. I, 1857, 417. — coll. [illegible]
id. R. Z. 1858, 82.
id. Mém. Liège, 1863, 347.
Künck. l. c. t. 54, f. 12.

Omoderisus Lacordaire 1872.

Deyrollei Lacord. Gen. Col. IX, 2, 804, note 1. — j'ai le type [illegible] de Natal pas de Madagascar.

Exocentrus Mulsant 1839

madecassus Fairm. Ann. Fr. 1880, 338.
Künck. l. c. t. 53, f. 10.

Sphenura Laporte-Castelnau 1840.

guttulata Coq. R. Z. 1851, 90. — lapsus

guttula Coq. Ann. Fr. 1852, 399.
Lacord. Gen. Col. IX, 1872, 586, note 2.

[illegible] Boj. 155

chrysocephala Coq. R. Z. 1851. 90
Ann. Fr. 1852. 400
qu'est ce? type unique.

Ajouter à la fin des Cerambycini p. 205 :

Nethinius Fairmaire 1889.

près Phelocalocera -

dimidiatipennis Fairm. Ann. Belg. 1889, 5.

+ dimidiatipes Fairm. CR. Belg. 1889, XCIV.
Künck. Hist. Madag. t. 48, f. 7.

fulvescens Fairm. CR. Belg. 1889, XCIV
Künck. l.c. t. 48, f. 5.

+ fulvipes Fairm. l.c. XCIV
Künck. l.c. t. 48, f. 1.
id var. t. 48, f. 2.

+ obscuripes Fairm. l.c. XCIV.
Künck. l.c. t. 48, f. 6.

+ pallipes Künck. l.c. t. 48, f. 4

+ sanguinicollis Fairm. l.c. XCIV.
Künck. l.c. t. 48, f. 3.

CHRYSOMELIDAE.

Sagrini

Rhagiosoma Chapuis 1878.

fraternum Duv. CR. Belg. 1891, CCXXXVIII.

madagascariense Chapuis CR. Belg. 1878, CXLIV.
Hegd. Ber. Senckenberg naturf. Ges. 1877-78, 105
Preud. de Borre CR. Belg. 1880, CLII, fig.
Dohrn St. E.Z. 1881, 448.
Fairm. [Mecynodera] .....
Duv. CR. Belg. 1891, CCXXXIX

Sagra Fabricius 1792.

caeruleata Lacord. Mon. Phytoph. 57.

Oberthuri Duv. CR. Belg. 1891, CCXXXIX.

Urania Lacord. Mon. 58.

Criocerini

Lema Fabricius 1798.

aenea Lacord. Mon. 353.

crassipes Ol. Ent. VI, 94, p. 729, t. 1, f. 1 a-b.
Guér Ic. R. Anim. 259, t. 47, f. 9.
Lacord. Mon. 310.

glyptodera Lacord. Mon. 331.

grandis Klug Ins. Madag. XXIII 209
Lacord. Mon. 309.

haematodera Lacord. Mon. 380.

lacertina Lacord. Mon. 333.

madagascariensis Jacoby Pr. Zool. Soc. 1892, 565.

microcephala Lacord. Mon. 313.

mossibiana Brancsik Jahr Erencsén 1893, 243.

porosa Lacord. Mon. 314.

purpurascens Jacoby Pr. Zool. Soc. 1876, 808.

rufula Lacord Mon. 332.

rugicollis Jacoby Fr. Zool. Soc. 1892, 565.

strangulata Lacord. Mon. 380.

suturata Lacord. Mon. 347.

vexilla Duv. CR. Belg. 1891, CCCCXXII.

virididorsata Duv. CR. Belg. 1891, CCCXIV.

Crioceris Geoffroy 1762.

antennalis Lacord. Mon. 565.

dimidiaticornis Lacord. Mon 566.

inaequalis Fairm. Le Nat. 1880, 316.
id. Ann. Fr. 1880, 338.

Brachydactyla Lacordaire 1845.

microdera Lacord. Mon. 601.

Megalopodini

Lemnaspis Lacordaire 1845.

lugubris Westw. Tr. Ent. Soc. 1864, 377.

Poecilomorpha Hope 1840.

flabellicornis Jacoby Col. Novit. 1895. 1.

Clytrini.

Cryptocephalini

Cryptocephalus Geoffroy 1762.

betsileo Duv. CR. Belg. 1891, cccLxv.

caeruleomaculatus Jacoby Nov. Zool. I, 1894, 515.

costipennis Duv. CR. Belg. 1891, cccLxiv.

discissus Dohrn, St. E.Z 1884, 280.

Dohrni Jacoby Pr. Zool. Soc. 1892, 566. t. 39, f. 1.

euchlorus Dohrn St. E.Z. 1884, 182.

eximius Chap. Sl. E.Z. xciii — indic. incompt. in Suppl. Donckier.

fasciatopunctatus Suffr. Mon. XI, 91
Sturm Cat. 1843, 302.
Dohrn St. E.Z. 1884, 280.

impressipennis Suffr. Sl. E.Z. xxxvi, 258.

iridicolor Duv. CR. Belg. 1891, cccLxiv.

jucundus Dohrn St. E.Z. 1880, 367.

ll) marginicollis Duv. CR. Belg. 1891, cccLxv. — nec marginicollis Suffr. - de Cuba -

mutilatus Suffr. Mon. XI, 71.

Oberthuri Duv. CR. Belg. 1891, ccxL.

parenthesis Dohrn St. E.Z. 1884, 279.

Perroti Duv. C.R. Belg. 1891, cccLxv.

profundesulcatus Duv. l.c. cccLxiv.

scutellatus Jacoby Pr. Zool. Soc. 1892, 566.

tridentatus Klug Ins. Madag. 123.
Suffr. Mon. XI, 73.

Eumolpini

Sybriacus Harold 1877.

Lefevrei Har. Mitth. Münch. Ent. Ver. 1877, 106.
Fairm. Ann. Belg. 1895, 40.

magnificus Baly Tr. Ent. Soc. 1877, 38 [Nodostoma]
Har. l.c. 106.
Fairm. Ann. Belg. 1895, 40.

parvulus Jacoby Col. Novit. 1895, 2.

viridimicans Fairm. Le Nat. 1887, 72, f. 9.
id. Ann. Belg. 1895, 40.

Sybriacosoma Jacoby 1895

ornata Jacoby Col. Novit. 1895, 3.

Trichostola Chapuis 1874.

vestita Chap. Gen. Col. X, 294, note 1. (Réunion.

Metachroma Lacordaire 1858.

pulchella Klug Ins. madag. 123 [Colasposoma].

Rhyparida Baly 1861.

striaticollis Jacoby Pr. Zool. Soc. 1892, 571, t. 39, f. 7.

Colasposoma Laporte-Castelnau 1833.

breviusculum Fairm. Le Nat. 1887, 83, f. 3.

episcopale Fairm. l.c. 83, f. 1.

foveipenne Jacoby Tr. Ent. Soc. 1888, 192.

humerale Jacoby l.c. 193.

lucubense Brancsik Jahr. Erencsén. 1893, 244

madagassum Har. Mitth. Münch. Ent. Ver. 1877, 106

rutilans Klug Ins. madag. 123.
Fairm. Ann. Fr. 1869, 349.
Brancsik l.c. 243.
v. coeruleum Brancsik l.c. 244.
v. viride " "
v. auratum " "
v. chalceum " "

subsericans Fairm. Ann. Fr. 1886, 87.

viridicolle Fairm. Le Nat. 1887, 83, f. 2.

[vestitum Bohem. Res. Eugen. 1860, 164 (Maurice — Sp. excludenda, sed. gen. ignoti sec Lefèvre.

[**Eumolpus**

[argopoides Fairm.
[ultramontanus Fairm.
[impressicollis Fairm.
[janthinipennis Fairm.

} sec Lefèvre sont des Syagrus p. 220.

Pachnephorus Redtenbacher 1848.

testaceipes Fairm. & Mat. 1880, 316 (Nossi-bé.
id. Ann. Fr. 1880, 338.

Eulychius Jacoby 1882

dorsalis Duv. CR. Belg. 1891, CCXL

madagascariensis Jacoby Pr. Zool. Soc. 1882, 52.

nigritarsis Jacoby Cr. Zool. Soc. 1892, 567.

Pheloticus Harold 1877.

aeneicollis Jacoby [Pheloticus ?] Pr. Zool. Soc. 1892, 567, t. 39, f. 4.

affinis Brancsik Jahr. Trencsén. 1893, ~~XXX~~ 245.

bifasciatus Jacoby [Pheloticus ?] l.c. 567, t. 39, f. 3.

brunneus Jacoby l.c. 567, t. 39, f. 2.

dorsalis Har. Mitth. Münch. Ent. Ver. 1877, 104.

fumatidorsis Fairm. Ann. Fr. 1886, 92.

Haroldi Duv. C.R. Belg. 1891, CCXL.

rufus Brancsik l.c. 244.

semistriatus Fairm. Ann. Fr. 1886, 91

seriepunctatus Fairm. Ann. Fr. 1886, 91.

Neomenius Duvivier 1891.

rufipennis Duv. CR. Belg. 1891, CCXLII.

Menioporus Duvivier 1891.

thoracicus Duv. [Menius] CR. Belg. 1891, CCXLI.
id. l.c. CCCXIV.

Menius Chapuis 1874

fulvipennis Duv. CR. Belg. 1891, CCXLI.

Eurydemus Chapuis 1874.

amabilis Brancsik Jahr. Erencsén. 1893, 245.

madagassus Har. mitth. Münch. Ent. Ver. 1877, 101.

metallicus Jacoby Pr. Zool. Soc. 1892, 570.

plicipennis Fairm. .....

punctatosulcatus Fairm. Ann. Fr. 1886, 87.

Hemyloticus Jacoby 1892.

geniculatus Jacoby Pr. Zool. Soc. 1892, 572, t. 39, f. 6.

Syagrus Chapuis 1874.

argopoides Fairm. [Eumolpus] Ann. Fr. 1869, 247. Ref. Ann. Fr. 1877, 320.

atramentarius Fairm. Ann. Fr. 1869, 248 [Eumolpus].

attelaboides Fairm. Ann. Fr. 1886, 88.

bipartitus Fairm. Ann. Fr. 1886, 88.

costatipennis Jacoby Pr. Zool. Soc. 1877, 513.

dilutus Ref. Ann. Fr. 1877, 20.

impressicollis Fairm. Ann. Fr. 1869, 248 [Eumolpus].

janthinipennis Fairm. l.c. 1869, 249 [Eumolpus]

madagascariensis Jacoby Pr. Zool. Soc. 1877, 512.

nigricollis Jacoby l.c. 513.

pallidipennis Jacoby Col. Nouv. 1895, 6.

Perroti Jacoby Col. Novit. 1895, 5

pulchellus Klug Ins. Madag. 133 [Colasposoma].

strigicollis Fairm. Ann. Fr. 1886, 88.

[Pour plusieurs espèces décrites comme Syagrus voir Rhembastus p. 221.]*

Pseudosyagrus Fairmaire 1886.

grossepunctatus Fairm. Ann. Fr. 1886, 88.

Rhembastus Harold 1877-

antennatus Jacoby Pr. Zool. Soc. 1892, 569.

atomarius Lef. Ann. Fr. 1877, 332 [Syagrus]

dimidiaticornis Jacoby l.c. 569.

geniculatus Har. Mitth. Münch. Ent. Ver. 1877, 102.

= Mniszechi Lef. [Syagrus] Ann. Fr. 1877, 322.

madagascariensis Lef. l.c. 322 [Syagrus].

nanulus Har. l.c. 103.

= Goudoti Lef. [Syagrus] l.c. 322.

pubilus Har. l.c. 103.

pusillus Har. l.c. 103.

striatus Har. l.c. 102.

suturalis Har. l.c. 102.

= geniculatus Lef. [Syagrus] l.c. 321.

tantillus Lef. l.c. 323 [Syagrus].

tibialis Lef. l.c. 322 [Syagrus].

Ivongius Harold 1877.

antennarius Har. Mitth. Munch. Ent. Ver. 1877, 104.

inconstans Lef. Eumolp. Catal. 1885, 141, note 1.

nigromaculatus Jacoby, Pr. Zool. Soc. 1892, t. 39. f. 5.

rufinus Har. l.c. 104.

rufipes Har. l.c. 104.

Nossioecus Harold 1877.

Lefevrei Har. l.c. 105

[Colaspis

[puberula Boh. Res. Eugen. 171 (Mauric.

Sp. excludenda sed Gen. ignoti
sec. Lefèvre cat. p. 35.

Chrysomelini

Melasoma Stephens 1831.

madagascariensis Vogel Nung. Ot. I, 1871, 138

Plagiodera Redtenbacher 1849

tursata Suv. C.R. Belg. 1891, cccLXVI.

Chrysomela Linné 1758.

hova Suv. C.R. Belg. 1891, cccLXVI

madagascariensis Jacoby [s.g. Polysticta] Tr. Ent. Soc 1888, 193, t.7, f. 6; 6a.

Entomoscelis Chevrolat 1843.

rossibiana Brancsik Jahr. Trencsén 1893, 245.

Cvamela Fairmaire 1887.

ornatipennis Fairm. Fe Nat. 1887, 83, f. 4.

Halticini

Nisotra Baly 1864.

Goudoti Har. Col. Heft. XVI, 1879, 230.

Klugi Jacoby Pr. Zool. Soc. 1892, 572.

nigritarsis Jacoby l.c. 572.

signatipennis Suv. St. E.Z. 1885, 241.

Podagrica Foudras 1860.

madagussa Baly Tr. Ent. Soc. XXIII, 1881, 58.

Crepidodera Chevrolat 1844.

analis Har. Milth. Münch. Ent. Ver. 1877, 107.

Goudoti Har. l.c. 108.

* madagassa Har. / picticornis Har. / varicornis Har. } sont des Neodera sec. Duv. C.R. Belg. 1891, CCCXIV.

Neodera Duvivier 1891.

emarginata Duv. C.R. Belg. 1891, CCCXV.

fraterna Duv. l.c. CCCXIV.

imitatrix Duv. l.c. CCCXV.

madagassa Har. [Crepidodera] Milth. Münch. Ent. Ver 1877, 107.

picticornis Har. [id.] l.c. 107.

varicornis Har. [id.] l.c. 108.

Haltica Geoffr. 1762.

hova Duv. [s.g. Graptodera] C.R. Belg. 1891, CCCCXXIII.

madagascariensis Allard Ie Nat. 1889, 43. [Graptodera]

[olivacea Klug s. Myrcina sec Harold.

Halticotropis Fairmaire 1886.

multiplicata Fairm. Ann. Fr. 1886, 95.

Lactica Erichson 1847.

Oberthuri Duv. C.R. Belg. 1891, CCCCXXIII.

Sphaerophysa Baly 1876.

clavicornis Baly Er. Ent. Soc. 1876, 382.

Diphaulacosoma Jacoby 1892.

laevipenne Jacoby Proc. Zool. Soc. 1892, 574, t. 39. f. 8.

Myrcina Chapuis 1875.

limbata Duv. CR. Belg. 1891, CCXLII.

olivacea Klug [Haltica] Ins. Madag. 125.

picea Baly Tr. Ent. Soc. 1875, 26.

spectabilis Baly A.M.N.H. (5) II, 1878, 232

v. quadrimaculata Duv. CR. Belg. 1891, CCCLXVI.

*

[Balyi Har. G.? Sebaethe sec Duv. l.c.

Sanckia Duvivier 1891.

Johanna Duv. CR. Belg. 1891, CCCXVI.

Venusta Duv. l.c. CCCXVII.

Phyllotreta Foudras 1860.

coccinellina Klug, Ins. Madag. 126.

Pseudadorium Fairmaire 1884

vernicatum Fairm. Ann. Fr. 1884, 239.

Sebaethe Baly 1864.

Balyi Har. mitth. Münch. Ent. Ver. 1877, 109. [Myrcina].
cf. Duv. CR. Belg. 1891, CCCLXVI.

Chaetocnema Stephens 1831

fraterna Har. Col. Heft. XVI, 1879, 232.

Madagascariensis Baly Tr. Ent. Soc. 1877, 309.

rugiceps Baly l.c. 308.

Blepharida Rogers 1856.

multiguttata Duv. C.R. Belg. 1891, CCXLII.

Asphaera Chevrolat 1842.

brevicornis Jacoby Proc. Zool. Soc. 1892, 573.

madagascariensis Jacoby l.c. 573.

melanarthra Fairm. Ann. Fr. 1886, 93.

Oedionychis Latreille 1829.

apicata Duv. CR. Belg. 1891, cccLxv.

atripes Fairm. Ann. Fr. 1886, 92.

cavifrons Fairm. ~~Ann.~~ C.R. Belg. 1889, lx.

clypeata Jacoby Tr. Zool. Soc. 1892, 574.

diversipes Fairm. Ann. Fr. 1886, 92

fascialis Har. Mitth. Münch. Ent. Ver. 1877, 108.
Fairm. Ann. Fr. 1886, 93.

Goudoti Har. l.c. 108.
Fairm. l.c. 93.

grossepunctata Duv. CR. Belg. 1891, cccxv.

kora Duv. l.c. ccccxvi.

madagascariensis Jacoby Tr. Ent. Soc. 1888, 194, —
— t.7, f3.

Physonychis Chapuis 1875

varicornis Duv. CR. Belg. 1891, ccccxxiv.

Sphaeroderma Stephens 1834

dorcatomoides Fairm. Le Nat. 1880, 316.
id. Ann. Fr. 1880, 339.

Galerucini

Aulacophora Chevrolat 1842.

aeneoguttata Fairm. St. E. Z. 1884, 276.

cavicollis Fairm. Le Nat. 1880, 315.
id. Ann. Fr. 1880, 339, t. 11, f. 9.

hexaspilota Fairm. Le Nat. 1887, 83, f. 5.

insignita Fairm. C.R. Belg. 1889, IX.

madagascariensis Jacoby [Idacantha] the Ent. 1891 suppl. 40.

undecimpunctata Klug, Ins. madag. 124
Fairm. [Idacantha] Ann. Fr. 1869, 252.

unifasciata ol. Ent. VI, 622, t. 2, f. 20.
Fairm. [Idacantha] Ann. Fr. 1869, 252.

Idacantha Chevrolat

syn. d'Aulacophora in Cat. G. H.
Distinct see Jacoby, the Ent. 1891, p. 40, suppl.

[madagascariensis · Idacantha see. Jacoby
[undecimpunctata " " Fairm.
[unifasciata " " "
} cf. Aulacophora.

Phyllobrotica Redtenbacher 1849.

Jacobyi C. Schauf. Nunq. Ot. III, 1890, 623.

Diabrotica Chevrolat 1843.

quatuordecimnotata Fairm. C.R. Belg. 1889, IX.

Hyperacantha Chapuis ann. mus. Civ. Gen. XV.

abdominalis Duv. CR. Belg. 1891, CCC XVII.

elegantula Duv. l.c. CCCXVII.

Malacosoma Chevrolat 1846.

aterrimum Jacoby Pr. Zool. Soc. 1892, 575.

flavicorne Jacoby l.c. 575.

madagascariensis Duv. CR. Belg. 1891, CCCXVII.

Sikorai Jacoby l.c. 575.

Aelianus Jacoby 1892.

scutellatus Jacoby Pr. Zool. Soc. 1892, 577, t. 39, f. 9.

Ootheca Chapuis 1875

cyaneovittata Fairm. Le Nat. 1880, 316.
id. Ann. Fr. 1880, 340.

Galerusoma Jacoby 1892.

apicicorne Jacoby Pr. Zool. Soc. 1892, 578.

Alaotra Duvivier 1891

bipunctata Duv. CR. Belg. 1891, CCCXVIII.

Luperus Geoffroy 1762.

quaternus Fairm. Le Nat. 1880, 316.
id. Ann. Fr. 1880, 340.

Luperolophus Fairmaire 1884.

tenuecostatus Fairm. Ann. Fr. 1884, 241.

Mimastroides Jacoby 1892

madagascariensis Jacoby, Pr. Zool. Soc. 1892, 578, t. 39, f. 11.

Galerucella Crotch 1873.

costulata Fairm. Ann. Fr. 1869, 250. [Galeruca]

Humbloti Duv. CR. Belg. 1891, CCXLIV.

pruinosa Fairm. Ann Fr. 1869, 251 [Galeruca]

Alphidia Clark 1865

= Hovalia Fairmaire 1884.
fec Jacoby Pr. Ent. Soc. 1888, 205.

comitata Klug, Ins. madag. 212. [Galeruca]
Fairm. [Galeruca] Ann. Fr. 1869, 253.
id. [Hovalia] Ann. Fr. 1884, 240.

magnifica Duv. CR. Belg. 1891, CCXLIII.

purpurina Fairm. CR. Belg. 1889, IX.

Monocestoides Duvivier 1891.

Perroti Duv. CR. Belg. 1891, CCXLIII.

Candezoides Duvivier 1891.

hova Duv. CR. Belg. 1891, CCXLIV.

Metopoedema Duvivier 1891

paradoxum Duv. CR. Belg. 1891, CCCXIX.

Antsianaka Duvivier 1891.

elongatula Jacoby Pr. Zool. Soc. 1892, 576, t. 39, f. 10.

longicornis Duv. CR. Belg. 1891, CCCXIX.
Jacoby l.c. 576.

pulchella Duv. CR. Belg. 1891, CCXLV.

rufipennis Duv. l.c. CCCXIX.

viridis Jacoby l.c. 576.

Cynortella Duvivier 1891.

scutellaris Duv. CR. Belg. 1891, CCCXX.

Malaconida Fairmaire 1886.

indecora Fairm. Ann. Fr. 1886, 94.

Otacilus Jacoby 1888.

fulvus Jacoby Tr. Ent. Soc. 1888, 200, 201.

Monolepta Erichson 1843.

albiventris Allard Ent. Nat. 1888, 270.

Hispini

Cephalolia Blanchard 1845.

microdonta Fairm. Ann. Fr. 1869, 257.

Cryptonychus Gyllenhall 1817.

limbatus Ch. Waterh. A. M. N. H. (4) XVIII, 1876, 121
id. Phil. Tr. R. Soc. CLXVIII, 1879, 532 (Rodrigue

Xiphispa Chapuis 1878.

Coquereli Fairm. [Oxycephala] Ann. Fr. 1869, 254.
Chap. ~~Ann.~~ CR. Belg. 1878, CXLVI.

centrolineata Fairm. Bull. Fr. 1890, CCIII.

lugubris Fairm. Bull. Fr. 1890, CCIII.

Coelaenomenodera Blanchard 1845.

campestris Fairm. Le Nat. 1887, 72, f. 8.
id. Ann. Belg. 1895, 39.

coccinea Fairm. Bull. Fr. 1890, CCIII.

Coquereli Fairm. Ann. Fr. 1869, 255.

cucullata Guérin Ic. R. Anim. 271.
Baly Cat. 119, t. 8, f. 6.

femorata Fairm. Bull. Fr. 1890, CCIII.

Le Royi Fairm. Le Nat. 1880, 316.

praeusta Guér. Ic. R. Anim. 272.
Baly Cat. 119.

pulchella Coq. Ann. Fr. 1851, 404. Coq. Rev. Zool. 1851. p. 90
Fairm. Ann. Fr. 1869, 257.

sculptilis Fairm. Ann. Belg. 1895, 39.

suturalis Guér. Ic. R. Anim. 272.

tarsata Baly Cat. 119.

tristicula Fairm. Bull. Fr. 1890, CCIII.

Trichispa Chapuis 1875

sericea Guérin Ic. R. Anim. 268.
Fairm. Ann. Fr. 1869, 258.

Parallelispa Fairmaire 1884

quadraticollis Fairm. Ann. Fr. 1884, 339.

Platyprria Guérin 1840

abdominalis Chap. Ann. Belg. 1877, 50.

Hispa Linné 1767.

aeneipennis Duv. CR. Belg. 1891, CCCLXVII.

apicata Fairm. Ann. Fr. 1869, 258.

Gestroi Chap. Ann. Belg. 1877, 58.

hystrix Duv. CR. Belg. 1891, CCCLXVII.

lividipes Fairm. Ann. Belg. 1893, 554. (Comores.

longespinosa Fairm. Ann. Fr. 1869, 259.

Ritzemai Chap. Ann. Belg. 1877, XIII. 55.

Sikorai Duv. CR. Belg. 1891, CCCLXVI.

subkirta Chap. l.c. 52.

tristis Duv. l.c. CCCLXVII.

Cassidini

Boheman Monogr. I, 1850; II, 1854; III, 1855; IV, 1862. —

Hoplionota Hope 1840.

armigera ol. Ent. VI, 97, p. 962, t. 5, f. 85.
Bohem. Mon. I, 19.

biaculeata Bohem. Cat. Brit. Mus. IX, 1856, 3.

bispinosa Bohem. Mon. I, 22.

erythrocata Bohem. Mon. I, 31.

gemmata Klug Ins. Madag. 122, t. 5. f. 11.
Bohem. Mon. I, 39.

horrida Bohem. Mon. I, 25.

luctuosa Bohem. Mon. I, 30.

marginata Bohem. Mon. I, 33.

nigra Duv. CR. Belg. 1891, CCCLXVIII.

ochracea Bohem. Mon. I, 29.

pallens Bohem. Mon. I, 32.

pallescens Guér Ic. R. Anim. 287.
Bohem. Mon. I, 21.

paradoxa Bohem. Mon. I, 26.

permira Fairm. Ann. Belg. 1895, 39.

plicata Klug Ins. Madag. 1833, 122, t. 5, f. 10.
Bohem. Mon. I, 27.

pulchella Guér. Ic. R. Anim. 288.
Bohem. Mon. I, 24.

quadricornis Bohem. Mon. I, 24.

quadrituberculata Guér. Ic. R. Anim. 287.
Bohem. Mon. I, 23.

semiviridis Guér. Ic. R. Anim. 287.
Bohem. Mon. I, 20.

viridinotata Boh. Cat. Brit. Mus. IX, 1856, 4.

viridipicta Boh. Mon. IV, 13.

viriditincta Boh. Cat. Brit. Mus. IX, 1856, 4.

Aspidomorpha Hope 1840.

apicalis Klug Ins. Madag. 210.
Bohem. Mon. II, 257.

madagascarica Bohem. Mon. II, 275.

obovata Klug Erman Reis. Atl. 48. (Maurice.
Bohem. Mon. II, 340.

pontifex Bohem. Mon. II, 286.

Cassida Linné 1758.

atripennis Fairm. Ann. Fr. 1869, 253.

Coquereli Bohem. Mon. IV, 308. (Mayotte.

coronula Bohem. Mon. II, 365.

decolorata Bohem. Cat. Brit. Mus. IX, 1856, 144.
(Anjonama = anjouan?

frontalis Bohem. l.c. 143.

insularis Bohem. Mon. II, 433.

pallescens Bohem. mon. IV, 334.

rimosa Bohem. mon. II, 290.

taediosa Bohem. Cat. Brit. Mus. IX, 1856, 143.

Laccoptera Boheman 1855.

spectrum Bohem. mon. III, 63.

Coptocycla

discolor Bohem. mon. III, 412.

dulcis Bohem. mon. IV, 430.

Goudoti Bohem. mon. III, 264.

leopardina Bohem. mon. III, 255.

rubroornata Bohem. mon. III, 413.

rugipennis Bohem. mon. III, 405.

verrucata Bohem. mon. III, 265.

COCCINELLIDAE

Halyzia Mulsant 1846.

marginenotata Muls. [Psyllobora] Spec. 172.

v. impunctcollis Fairm. Ann. Belg. 1893, 555 (Comores.

variegata F. Spec. Ins. I, 1781, 99. (Cap.
Ol. Ent. VI, 1026, t. 2, f. 20, a, b.
Muls. Sp. 206 [Thea]. (et syn.) (Australie, St. Hélène
> Fairm. Ann. Belg. 1893, 555 (Comores.

Chilomenes Chevrolat 1843.

lunata F. (et syn.) (St. Hélène, Cap, Java.

v. vulpina F. Suppl. Ent. Syst. 1798, 80 (Réunion.

rufipennis Crotch. Revis, 181.

trianguliferа Muls. Spec. 438.

Elpis Mulsant 1851

dolens Muls. Spec. 450.

Cyrtocaria Crotch 1874.

inflata Muls. sp. 244.

regalis Ol. Ent. VI, 1020, t. 6. f. 77.
Muls. Spec. 238.

=gibbipennis Muls. Mon. 176.

vigintisexpunctata Fairm. Ann. Belg. 1893, 554 (Comores.

Coelophora Mulsant 1851.

simulans Crotch. Révis. 156.

Leis Mulsant 1851.

coryphaea Guér. Ic. R. anim. 1845, 320.
Muls. Spéc. 249.
Crotch. Révis. 118.

genus Stictoleis Weise

Alesia Mulsant 1851.

basicollis Fairm. [alexia] Ann. Belg. 1893, 555 (Comores

pentas Muls. Opusc. Ent. III, 1853, 58 (Anjouan.

suturata Fairm. [Verania] l.c. 555. (Comores.

oberthuri Weise Deutsch Ent. Zeit. 1895 p. 325.

Chilocorus Leach 1815.

Midas Klug Ins. Madag. 214.
Muls. Spéc. 461.

Exochomus Redtenbacher, 1843.

hypomelas Crotch, Révis., 194.
> Fairm. Ann. Belg. 1893, 556. (Comores.

flavipes Thunb. Ins. spec. nov. 1781. p. 21. Muls. Spec. p. 483. (see Weise)

Hyperaspis Redtenbacher 1843

quadrilla Muls. Spec. 678. (Caffrerie
> Brancsik Jahr. Trencsén 1893, (Nossi bé.

Brumus Mulsant 1851.

frater Weise Deuts. Ent. Zeit. 1895 p. 325.

Scymnus Kugelann 1794

constrictus Muls. Spec. 971. (Maurice.

oblongosignatus Muls. Spec. 960 (id.

plutonus Muls. Op. Ent. III, 1853, 154.

Ortalia Mulsant 1851.

caffiops Guér. Ic. R. Anim. 320.
Muls. Spec. 894.

X variata Muls. Spec. 893.

Vedalia Mulsant 1851.

fumida Muls. (et Syn) (Bengal.

v. chermesina Muls. Spec. 905 (Madag.

Microrrhymbus Gerstäcker 1871.

X mesomelas Klug. Ins. Madag. 127.

= bisignatus Muls. Spec. 946.

Cyrtaulis Crotch 1874.

X puberula Crotch. Révis. 295.

Epilachna Chevrolat 1844.

argiola Muls. Spec. 742.

X Ellisi Crotch Révis. 71.

Geoffroyi Muls. Spec. 863.

Lacordairei Muls. Spec. 864.

lateripicta Fairm. CR. Belg. 1889, ix.

Macquarti Muls. Spec. 862.

margaritifera Muls. Spec. 737.

Meleagris Klug Ins. Madag. 127.
Muls. Spec. 738.

X obsoleta Ol. Ent. VI, 1058, t. 7, f. 116.
Muls. Spec. 759.

X pavonia Ol. Ent. VI, 1059, t. 7, f. 117.
Muls. Spec. 811.

Pierreti Muls. Spec. 865.

Spinola Muls. Spec. 740.

Dupouti Muls. Spec p. 897
floreola Klug Ins. Madag. 1833
p. 126 Muls Spec p. 895
funesta Muls Spec p. 896.

genus Platynaspis de Weise.

X bifaluata Weise Deut. Ent. Zeit.
1895 p. 321.

X excisa Weise do p. 322

X Oberthuri Weise do p. 322

X 18-signata Weise do p. 324.

X Ferroti Weise do p. 323

fini d'écrire à Paris le 29 Juin 1895

Table alphabétique des Genres

A

Abacetus — 18.
Ablabera — 86.
Achlamys — 139.
~~Acrocera — 208.~~
Acrilus — 66.
Actanorie — 160.
Actenodes — 121.
Actobius — 42.
Acupalpus — 15.
Acylopselaphus — 47
Adelocera — 125.
Adoretus — 92.
Aedemonus — 179.
Aedoeus — 202.
Aelianus — 227.
Aeolus — 130.
Aeschyntelus — 61.
Aethina — 57.
Aethriostoma — 64.
Agada — 203.
Agathorrhinus — 185.
Agnus — 71.
Agrilus — 122.
Agrypnus — 125.
Alaotra — 227.
Alaus — 129.
Alcides — 177.
Aleochara — 45.
Alesia — 233.
Alindria — 59.
Alleculа — 164.
Alphidia — 227.
Alphitobius — 154.
Amalthocus — 137.
Amarsenes — 159.
Amarygmus — 162.
Amerismus — 192.
Amneidus — 71.
Amphiops — 69.
Ananca — 168.
Anchastus — 132.
Anchisteus — 189.
Ancylistes — 213.
Ancylonotus — 205.
Anemerus — 169.
Anisodactylus — 14.
Anisogaster — 198.
Anisolinus — 43.
Ankareus — 122.
Anochilia — 100.
Anodochilus — 29.
Anodon — 80.
Anomala — 91.
Anomalipus — 151.
Anomoderus — 203.
Anoplogenius — 15.
Anoxia — 90.
Anthicus — 168.
Anthrenus — 64.
Anthribola — 199.
Antigenes — 202.
Antsianaka — 228.
Apate — 149.
Aphanistieus — 122.
Aphanobius — 134.
Apharsatus — 205.
Apheledes — 202.
Aphiocephalus — 181.
Aphodius — 76.
Apobletes — 65.
Apoderus — 184.
Apomecyna — 212.
Appedesis — 202.
Apristus — 20.
Aprostoma — 61.
Aptinoclerus — 143.
Arrhythmus — 198.
Artelida — 200.
Arthrodactyla — 156.
Arthrotomus — 180.
Articeropsis — 48.
Asaphomorpha — 88.
Ascomma — 60.
Asididius — 162.
Asidobothrys — 150.
Asphaera — 225.
Aspidomorpha — 231.
Astenus — 41.
Ataenius — 77.

Atheta – 44.
Atractocerus – 147.
Attagenus – 64.
Attelabus – 184.
Atyba – 211.
Aulacophora – 226.
Aulonocnemis – 74.
Aulonogyrus – 36.
Autoplectus – 47.
Auxa – 212.

B.

Bacanius – 66.
Badister – 11.
Balaninus – 179.
Balanodes – 187.
Baris – 180.
Batocera – 205.
Belionota – 121.
Bembidion – 10.
Berosus – 67.
Bidessus – 30.
Blepharida – 224.
Blosyrus – 169.
Bolitophagus – 152.
Bostrychus – 149.
Bothrorrhina – 94.
Brachycerus – 173.
Brachycyrtus – 173.
Brachydactyla – 216.
Brachygaster – 67.
Brachyleptops – 173.
Brachynus – 25.
Brachypelus – 9.
Brachytatus – 209.
Brady merus – 152.
Brenthus – 190.
Bricoptis – 103.
Bruchus [Ptinus] – 147.
Bruchus [Mylabris] – 188.
Byrsops – 173.

C.

Cactophagus – 181.
Caedius – 151.
Calius – 42.
Calandra – 182.
Caldeonius – 134.
Callida – 20.
Callidium – 203.
Callimaria – 160.
Callimation – 207.
Callipechis – 95.
callirrhipis – 135.
Calosoma – 7.
Camaria – 161.
Camariodes – 160.
Camptorrhinus – 178.
Candezoides – 228.
Cantharis [Sylla] – 167.
Cantharis [Telephorus] – 137.
Canthydrus – 29.
Caranistes – 187.
Carcinops – 65.
cardiophorus – 132.
Cardiotarsus – 133.
Carpophilus – 56.
Caryoborus – 188.
Casnonia – 24.
Cassida – 231.
Catalalus – 173.
Catastygnus – 173.
Catoletbrus – 182.
Cautires – 136.
cecractes – 175
Cedemon – 207.
Cedus – 186.
Celidota – 108.
Cenchromorphus – 186.
Centrophorus – 190.
centrophthalmus – 47.
Ccocephalus – 190.
Cephalodendron – 124.
Cephalolia – 229.
cerchanotus – 60.
Cercyon – 69.
Ceresium – 198.
Ceropria – 153.
Cerylon – 61.
Cetonia – 109.
Chaetocnema – 224.
Chalcophoropsis – 110.
charianus – 159.

Chemolanus — 159.
Cheridamus — 203.
Chilomenes — 232.
Chlaenius — 11.
Chlidones — 204.
Chloropholus — 175.
Chromoptilia — 95.
Chrysobothris — 121.
Chrysomela — 222.
Ciceronius — 72.
Cicindela — 2.
Cilea — 44.
Cillaeus — 55.
Cis — 148.
Cistela — 164.
Cladiscus — 139.
Cladobius — 183.
Cladognathus — 71.
Cleropicstus — 145.
Clivina — 9.
Closterus — 196.
Clytus — 203.
Cnemopachus — 176.
Coccotrypes — 194.
Coedomaea — 212.
Coelaenomenodera — 229.
Coelophora — 233.
Coelostoma — 69.
Colaspis — 221.
Colasposoma — 218.
Colpodes — 16.
commatoceropsis — 48.
Copurus — 44.
copelatus — 32.
Copris — 74.
Coptocycla — 232.
Coptodera — 20.
Coptomia — 104.
Coptops — 210.
Coresus — 130.
Coryna — 167.
Cossonus — 183.
Coxelinus — 151.
cratognathus — 14.
Cratoparis — 187.
Cratopopsis — 172.
Cratopus — 171.
Crepidodera — 223.
Crepidogaster — 25.
Crepidopterus — 8.
Crepidotus — 181.
Criocerinus — 202.
Crioceris — 216.
Cryphalomorphus — 193.
Cryphalus — 193.
cryptamorpha — 63.
Cryptocephalus — 217.
cryptohypnus — 132.
Cryptonychus — 229.
cryptorrhynchus — 179.
Ctenicera — 129.
ctenopachys — 139.
Cupes — 147.
Cybebus — 183.
cybister — 34.
Cycloteres — 175.
Cylas — 185.
cylidrus — 139.
Cylindrocephalus — 180.
Cymones — 53.
Cynortella — 228.
Cyphogogus — 189.
Cyphus — 184
Cyriodera — 107.
cyrtaulis — 234.
Cyrtocaria — 233.
Cyrtolophus — 93.
Cyrtoscydmus — 49.

D.

Dactylosternum — 69.
Daemon — 135.
Damatris — 158.
Demetrias — 20.
Dermestes — 64.
Derosphaerus — 156.
Desmidophorus — 177.
Diabrotica — 226.
Diacritus — 180.
Diadelia — 212.
Diamerus — 193.
Diastatopis — 186.
Dicentrines — 84.
Dicercomorpha — 120.
Dichotrachelus — 181.
Didimoides — 72.

Dilobitarsus – 126.
Dineutes – 35.
Dinoderus – 149.
Dioristus – 211.
Diphaulacosoma – 223.
Diplophaenicus – 134.
Diplotoma – 60.
Dirrhina – 103.
Discoderes – 122.
Ditoma – 60.
Dolichoderus – 156.
Dorygonus – 130.
Doryscelis – 95.
Drasterius – 131.
Drimostoma – 10.
Drocleana – 161.
Dromius – 20.
Dryophthorus – 182.
Drypta – 24.
Dyscelaeus – 156.
Dyscherus – 7.
Dysmathosoma – 202.

E.

Eburifera – 145.
Eccrisis – 199.
Ecesaris – 186.
Elaphoides – 94.
Elastrus – 131.
Elater – 131.
Eleusis – 39.
Elpis – 233.
Emenadia – 167.
Empecta – 88.
Emphania – 84.
Emus – 42.
Enaria – 88.
Encya – 87.
Endocoxelus – 60.
Enoplioides – 139.
Enoplium – 145.
Enthora – 90.
Entomogaster – 121.
Entomoscelis – 222.
Epiechinus – 66.
Epilachna – 234.
Epilissus – 73.
Epiphylax – 180.
Episcaphula – 52.
Epistalagma – 96.
Epixanthis – 97.
Epuraea – 57.
Eretes – 33.
Erionomus – 72.
Eucamptognathus – 17.
Eucatheta – 98.
Euchilia – 98.
Euchroea – 107.
Eudema – 13.
Eudromus – 16.
Eugnoristus – 181.
Euleptus – 16.
Eulychius – 219.
Eumimetes – 208.
Eumolpus – 218.
Eunectes – 33.
Eunostus – 24.
Euops – 185.
Euplectus – 47.
Euporus – 203.
Eupsalis – 189.
Eurycaulus – 151.
Eurydemus – 220.
Eurydera – 21.
Eurymorpha – 1.
Euryoda – 4.
Euryomia – 108.
Eustrophus – 166.
Eutelonotus – 155.
Eutelus – 155.
Euthymius – 202.
Eutichaeus – 176.
Eutomus – 193.
Eutrichesis – 86.
Evenus – 146.
Evimantius – 122.
Exocentrus – 213.

F.

Figulus – 71.
Flaminius – 72.
Fornax – 124.

G.

Galbella – 123.
Galerita – 23.

Galerucella – 227.
Galerusoma – 227.
Gauramba – 59.
Geteuma – 209.
Glaucites – 204.
Glischrochilus – 58.
Gloeoxenus – 183.
Glycyphana – 109.
Glyphodactyla – 21.
Gnathocerus – 154.
Goephanes – 213.
Graphoderes – 33.
Gymnogaster – 91.
Gyrinus – 36.

H.

Hades – 164.
Hadimus – 203.
Haltica – 223.
Halticotropis – 223.
Halyzia – 232.
Haplocorynus – 178.
Haploscelis – 33.
Haptoncura – 57.
Harimius – 201.
Harpalus – 14.
Hectarthrum – 62.
Hedobia – 147.
Helochares – 68.
Hemicera – 153.
Hemiteles – 10.
Hemitelestus – 10.
Hemilotus – 220.
Herophydrus – 28.
Hesperus – 42.
Heterocerus – 70.
~~Heterophyllus – 153.~~
Heteroderes – 131.
Heteronychus – 80.
Heterophana – 94.
Heterophyllus – 153.
Heterosoma – 94.
Heterydrus – 27
Hexagonia – 24.
Hexodon – 79.
Himatismus – 150.
Hippopsis – 213.
Hispa – 230.
Histor – 65.
Holaniara – 155.
Holobrachys – 160.
Holocephala – 63.
Holomecus – 187.
Holonychus – 169.
Holotrochus – 40.
Homaleptops – 173.
Homales – 192.
Homaloplia – 86.
Homoeonychus – 171.
Hopleidos – 82.
Hoplia – 82.
Hoplionota – 230.
Hoplopsis – 82.
Hoplobrachium – 162.
Hoplochelus – 90.
Hoplideres – 195.
Hoplolenus – 11.
Hovalia – 227.
Hybocaulus – 160.
Hybopterus – 53.
Hybosorus – 78.
Hydaticus – 32.
Hydraena – 67.
Hydrethus – 70.
Hydrobius – 68.
Hydrocanthus – 29
Hydrochus – 67.
Hydrocoptus – 29.
Hydrophilus – 68.
Hydrovatus – 28.
Hyliota – 62.
Hylurgus – 193.
Hyperacantha – 226.
Hyperchalca – 163.
Hyphydrus – 27.
Hypocalis – 161.
Hypolithus – 14.
Hypophloeus – 155.

I.

Icariotis – 200.
Idacantha – 226.
Idactus – 208.
Idosoronia – 57.
Ileonus – 175.

Imerinus – 198.
Ino – 62.
Inopeplus – 62.
Iresioides – 204.
Iridotaenia – 110.
Ischnomerus – 189.
Ithyporus – 178.
Ivongius – 221.

L.

Laccobius – 68.
Laccophilus – 30.
Lacoptera – 232.
Lachnodera – 90.
Lachnosterna – 90.
Lacon – 126.
Lactica – 223.
Laemophloeus – 63.
Lagenodrus – 184.
Lagria – 165.
Laius – 137.
Lasiocercis – 210.
Lasiopezus – 205
Lebia – 19.
Leis – 233.
Lema – 215.
Lepidiota – 89.
Leptacinus – 42.
Leptaulax – 72.
Leptocera – 204.
Leptochirus – 39.
Leptoscapha – 155.
Leptura – 199.
Leucocraspedum – 44.
Leucogrophus – 210.
Lichenum – 151.
Limnichus – 64.
Linotarsia – 96.
Liochrinus – 164.
Liostraca – 97
Liostylus – 143.
Lispinus – 39.
Lispotherium – 184.
Lissaulicus – 145.
Lithinus – 174.
Litocerus – 185.
Litotropis – 187.
Lixosomus – 174.
Lixus – 176.
Lobocephalus – 23.
Lobodontus – 21.
Lobotrachelus – 180.
Logisticus – 201.
Lonchotus – 80.
Lophocateres – 59.
Lophophora – 99.
Lophophyllus – 165.
Lophoptera – 205
Lordites – 58.
Luciola – 136.
Luperolophus – 227.
Luperus – 227.
Lycoreus – 129.
Lyctus – 148.
Lytta – 167.

M.

Macraulacus – 179.
Macrochilus – 23.
Macrochirus – 180.
Macrotoma – 195.
Madecassa – 21.
Madecops – 210.
Malacorida – 228.
Malacosoma – 226.
Mallodon – 196.
Malthacodes – 138.
Marronus – 81.
Martianus – 155.
Masoreus – 19.
Mastodontodera – 199.
Mattania – 203.
Mecedanum – 61.
Mecotarsus – 186.
Medon – 41.
Megalodacne – 52.
Megalomma – 3.
Megalonychus – 16.
Megapenthes – 131.
Megopis – 197.
Melanocratus – 151.
Melanotus – 133.
Melanoxanthus – 132
Melantho – 134.

Melarhinus – 182.
Melasoma – 222.
Meli'boeus – 121.
Melittomma – 147.
Meloe – 167.
Menioporus 219.
Menius – 219.
Mesogenus – 151.
Mesorrhopa – 104.
Metachroma – 218.
Metialma – 179.
Metopoedema – 228.
Metretes – 209.
Micracantha – 211.
Microchila – 13.
Micropeltis – 99.
Microplus – 84.
Microcosmus – 13.
Microporum – 57.
Microrrhymbus – 234.
Mimastroides – 227.
Miroclaviger – 47.
Mitosoma – 194.
Monocestoides – 228.
Monochelus – 82.
Monolepta – 228.
Monomma – 166.
Mordella – 167.
Morio – 9.
Morostoma – 134.
Murmidius – 62.
Musicus – 201
Myacopterus – 198.
Mychocerus – 61.
Mylabris [Bruchus] – 188.
Mylabris [Meloid.] – 167.
Myrcina – 224.
Myrmecomaea – 140.
Mystrops – 57.
Mythergates – 212.

N.

Nacerdes – 168.
Necrobia – 146.
Nemosoma – 59.
Nemostira – 165.
Neocerus – 48.
Neocleonus – 175.
Neodera – 223.
Neomenius – 219.
Neptosternus – 31.
Nesogena – 162.
Nesopsebium – 202.
Nethinius (205) 214.
Nicaretta – 213.
Nigidius – 71.
Nisotra – 222.
Nomopleus – 134.
Nossiocaus – 221.
Nothogaster – 190.
Notolister – 65.
Novofustiger – 48.
Nycteis – 21.
Nycteropus – 157.
Nyctobates – 156.

O.

Obrium – 198.
Ochodaeus – 78.
Ocladius – 178.
Odacantha – 24.
Oedichirus – 40.
Oedionychis – 225.
Olenecamptus – 208.
Omoderisus – 213.
Omophron – 7
Omosiphora – 57.
Oniticellus – 75.
Onthophagus – 75.
Onychogymnus – 175.
Oodes – 11.
Oodimorphus – 18.
Oopsis – 211.
Ootheca – 227.
Opatrinus – 151.
Opatrum – 152.
Opepharus – 205.
Opilo – 144.
Opsamates – 197.
Orectogyrus – 36.
Orica – 209.
Orphnus – 77.
Ortalia – 234.
Oryctes – 81.
Osorius – 40.
Ostra – 173.
Otacilus – 228.

Ovamela — 222.
Oxytelus — 39.
Oxythyrea — 108.
Ozaenimorphus — 156.
Ozodeocerus — 192.

P.

Pachycephala — 63.
Pachycolus — 91.
Pachycorinus — 42.
Pachysticus — 201.
Pachyteles — 9.
Pachnephorus — 219.
Paederus — 41.
Palazia (err.) — 186.
Pallenis — 140.
Pallodes — 58.
Pamphaea — 170.
Panoptes — 179.
Pantolia — 103.
Parachilia — 99.
Paracymus — 68.
Parallelispa — 230.
Parandra — 195.
Paraphrixia — 120.
Parastasia — 91.
Parisomorphus — 80.
Parmulus — 50.
Parnus — 70.
Paromalus — 66.
Passandrina — 62.
Paussiger — 48.
Paussus — 26.
Pegylis — 89.
Pelecophorus — 138.
Peliusa — 46.
Peltodytes — 37.
Pentarthrum — 182.
Penthelispa — 61.
Penthocaulus — 202.
Peridexia — 1.
Perigona — 19.
Perileptus — 11.
Peripristus — 21.
Perissoderes — 181.
Perissosoma — 91.
Phacecerus — 192.
Phaelobarus — 180.
Phaeochrous — 78.
Phaleria — 152.
Phedomenus — 130.
Phelocalocera — 205
Phelotieus — 219.
Pheropsophus — 25.
Philematium — 203.
Philocryptus — 54.
Philonthus — 43.
Philusina — 46.
Philydrus — 68.
Phlocobius — 187.
Phloeocopus — 144.
Phlocophilus — 138.
Phlocotragus — 185.
Phlocoxena — 23.
Pholidochlamys — 192.
Phryneta — 207.
Phyllobrotica — 226.
Phyllotreta — 224.
Phymatosterna — 207.
Physodeutera — 3.
Physonychis — 225
Piazocnemis — 190.
Piloxys — 161.
Pityophthorus — 194.
Plagiodera — 222.
Platyclerus — 144.
Platydema — 153.
Platygnathus — 196.
Platymetopius — 15.
Platypria — 230.
Platypus — 194.
Platysoma — 65.
Pleophylla — 84.
Plesiofornax — 124.
Pleurophorus — 77.
Podagrica — 222.
Poecilochrous — 124
Poecilomorpha — 216.
~~Polyclais — 170.~~
Pogoniotarsus — 106.
Pogonostoma — 4.
Pogonotarsus — 106.
Polybothris — 111.
Polycesta — 120.
Polycleis — 170
Porphyrhyba — 160.

Potamophilus – 70.
Praogena – 162.
Praonetha – 211.
Pria – 58.
Priolomus – 60.
Prionopsis – 203.
Pristacrus – 21.
Proagosternus – 89.
Probaenus – 57.
Proeces – 183.
Protorrhopala – 208.
Psammodes – 77.
Psammoecidius – 63.
Psathyrus – 206.
Psellis – 133.
Psephus – 130.
Pseudadorium – 224.
Pseudasida – 150.
Pseudobalaninus – 180.
Pseudocamaria – 161.
Pseudogenes – 202.
Pseudolycus – 168.
Pseudopallenis – 141.
Pseudosyagrus – 220.
Psilonesogena – 163.
Psilopstera – 110.
Psyllobora – 232.
Pterygostomus – 190.
Ptosima – 121.
Pycna – 154.
Pycnochilus – 154.
Pycnomerus – 61.
Pygora – 102.
Pyrapractus – 133.

R.

Radama – 47.
Ranova – 209.
Rhagiosoma – 215.
Rhantaticus – 31.
Rhantus – 31.
Rhaphidopsis – 206.
Rhechodes – 60.
Rhembastus – 221.
Rhina – 182.
Rhipidophloeus – 174.
Rhizopertha – 149.
Rhopalocerus – 143.
Rhynchocephala – 95.
Rhychoclaviger – 48.
Rhynchobolus – 183.
Rhyparida – 218.
Rhyparus – 77.
Rhysodes – 38
Rhysodiastes – 38.
Rhyssemus – 77.
Rhytidocephalus – 190.
Rutelini – 91.

S.

Sagra – 215.
Sagridola – 199.
Salazia – 186.
Salpingus – 168.
Sanckia – 224.
Saphicus – 179.
Saprinus – 66.
Scaphidium – 51.
Scaphisoma – 51.
Scarabaeus – 73.
Scariates – 201
Scarites – 8.
Schizonycha – 87.
Sciaphilus – 169.
Sirtes – 135.
Scolytoplatypus – 194.
Scopanta – 201.
Scoriaderma – 150.
Scotinesthes 150
Scotinus 150.
Scydmaenus – 49.
Scymnus – 234.
Scython – 124.
Sebaethe – 224.
Sebasius – 189.
Selinus – 151
Semiclaviger – 48.
Semicyclus – 72.
Serica 85.
Sikorius – 146.
Silis – 137.
Silpha – 49.
Silvanus – 63.

Sinoxylon – 149.
Solenocyclus – 72.
Solymus – 209.
Somoplatus – 19.
Somotrichus – 20.
Sosylus – 61.
Sphadasmus – 179.
Sphaericosoma – 66.
Sphaeridium – 69.
Sphaerocaulus – 161.
Sphaeroderma – 225.
Sphaerophysa – 223.
Sphaerostylus – 9
Sphenophorus – 181.
Sphenoptera – 121.
Sphenura – 213.
Spinolarius – 146.
Sponsor – 120.
Stelidota – 57.
Stenerula – 164.
Stenianthe – 123.
Stenidea – 24.
Stenocylidrus – 142.
Stenogena – 163.
Stenolophus – 15.
Stenoscapha – 155.
Stenosoma – 211.
Stenotarsia – 95.
Stenotarsus – 53.
Stenus – 40.
Stephanoderes – 193.
Steraspis – 110.
Stereosomus – 191.
Sternolophus – 67.
Sternotomis – 205.
Stethoxus – 68.
Stiamus – 171.
Stigmatotrachelus – 170.
Storthodontus – 7
Strabus – 179.
Strombocerus – 182.
Stromatium – 198.
Strongylium – 162.
Strongylus – 58.
Styne – 212.
Suarezius – 150.
Sulenus – 212.
Syagrus – 220.
Sybriacosoma – 218.
Sybriacus – 217.
Sympiezopus – 179.
Synarmostes – 79.
Synchortes – 29.
Synhomales – 191.
Syntarsus – 61.
Sysygops – 169.

T.

Taeniocerus – 72.
Taeniolobus – 8.
Tachys – 10.
Tanylamia – 213.
Tanygnathus – 44.
Tanyrrhynchus – 174.
Tarsostenus – 145.
Telephanus – 63.
Temnaspis – 216.
Temnolaemus – 192.
Temnorrhynchus – 81.
Tenebrio – 156.
Tenebroides – 59.
Teraschema – 197.
Tereticus – 197.
Teretrius – 66.
Termitochara – 46.
Tetragonoderus – 19.
Tetragonothorax – 175.
Tetralobus – 129.
Tetraphyllus – 158.
Tetrarhabdotis – 108.
Thaumasesthes – 207.
Thaumasocerus – 204.
Thea – 232.
Thettea – 161.
Thryptocerus – 11.
Thyrcopterus – 21.
Thysanotus – 21.
Tigrana – 207.
Tillocerus – 143.
Tillus – 139.
Tomicus – 194.
Tomobrachyta – 202.
Tophoderes – 185.

Toxicum – 155.
Toxorrhinus – 182.
Toxotinus – 200.
Trachelizus – 189.
Trachelophorus – 184.
Trachychlaenia – 98.
Trachys – 123.
Tragocephala 206.
Traphecocorynus – 178.
Triarmocerus – 193.
Tribolium – 154.
Trichispa – 229.
Tricholepis – 90.
Trichopteryx – 50.
Trichostola – 218.
Trichromia – 198.
Trigonostomum – 91.
Trionychus – 82.
Triplax – 52.
Tritomidea – 62
Trochalus – 86.
Trochoideus – 54.
Trogophloeus – 39.
Tropidodema – 208.
Tropidoderes – 186.
Trox – 79.
Tylotarsus – 128.

U.

Uloma – 154
Uropterus – 191.

V.

Valgus – 109.
Vedalia – 234.
Verania – 233.
Vitalis – 186.
Vitellinus – 72.
Volvulus – 67.

X.

Xamerpus – 138
Xantholinus – 42
Xiphispa – 229.
Xyleborus – 193.
Xylodes – 147.
Xylographus – 148.
Xylopertha – 149.
Xylotrechus – 203.
Xystrocera – 197.

Y.

Yola – 29.

Z.

Zantes – 177
Zebinus – 106.
Zetophloeus – 192.
Zonitis – 167.
Zophosis – 150.
Zulphis – 205.

Table alphabétique des familles

Alleculidae 164.
Anthicidae 168.
Anthribidae 185.
Bostrychidae 149.
Brenthidae 189.
Bruchidae [Ptinidae] 147.
Buprestidae 110.
Byrrhidae [Anobiidae] 148.
Cantharidae 136.
Carabidae 7.
Cerambycidae 195.
Chrysomelidae 215.
Cicindelidae 1
Ciidae 148.
Cistelidae 64.
Clambidae 50.
Clavigeridae 47.
Cleridae 139
Coccinellidae 232.
Colydiidae 60.
Corylophidae 50.
Cryptophagidae 54.
Cucujidae 62
Cupesidae 147.

Curculionidae 169.
Dascillidae 135.
Dermestidae 64.
Dytiscidae 37
Elateridae 125
Endomychidae 53.
Erotylidae 52.
Eucnemidae 124
Georyssidae 70.
Gyrinidae 35.
Heteroceridae 70.
Histeridae 65.
Hydrophilidae 67.
Lagriidae 165
Languriidae 52.
Lathridiidae 55.
Lucanidae 71.
Lyctidae 148.
Lymexylonidae 147.
Melandryidae 166.
Meloidae 167.
Monommidae 166.
Mordellidae 167
Mylabridae [Bruches] 188.
Nilionidae 164.
Nitidulidae 55
Oedemeridae 168.
Parnidae 70.
Paussidae 26.
Phalacridae 51.
Pselophidae 47.
Pyrochroidae 168
Pythidae 168.
Rhipidoceridae 135
Rhipidophoridae 167
Rhysodidae 38
Scaphidiidae 51.
Scarabaeidae 73.
Scolytidae 193.
Scydmaenidae 49
Silphidae 49
Sphindidae 148.
Staphylinidae 39.
Trichopterygidae 50
Tritomidae 55
Trogositidae 59.

BOUND BY
HM
9-94